

№ 40.



ОПЫТНОЙ ФИЗИКИ

(сост. 1881, вступив от 60 ₽ до)

— и —

ЭЛЕМЕНТАРНОЙ МАТЕМАТИКИ

ПОПУЛЯРНО-НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ,

Издаваемый Э. К. Шпачинскимъ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕМЪ УЧЕН. КОМИТ. МИН. НАРОДН. ПРОСВѢТ.

РЕКОМЕНДОВАНЪ
для приобрѣтения: а) въ фундаментальныя и ученическія библіотеки мужскихъ гимназій, прогимназій и реальныхъ училищъ; б)
въ библіотеки учительскихъ институтовъ, семинарій, женскихъ
гимназій и городскихъ училищъ.

IV СЕМЕСТРА № 4-й.



КІЕВЪ.

Типографія И. Н. Кушнерева и Ко, Елизаветинская улица, домъ Михельсона.

1888.

http://vofem.ru

СОДЕРЖАНИЕ № 40.

По поводу предполагаемого съезда естествоиспытателей въ г. Харьковѣ. Ш.—О дѣленіи окружности на равные части. А. Бобянинскою, Ф. Коваржика и А. Войнова.—О притяженіи виѣшней точки массою, равномерно расположеною на сфере. Г. Флоринскою.—Научная хроника: Отвѣтъ франц. астронома Файя на возраженіе пр. М. Хандрикова. Ш.—Внутренняя температура глетчеровъ (Гагенбахъ и Форель) Бхм.—Рецензіи: Журналъ „Счетоводство“. Ш.—Библиографический листокъ (ариѳметика, алгебра и пр.) (окончаніе).—Задачи №№ 277—283.—Рѣшенія задачъ №№ 118, 121, 124, 177 и 194.

ПОПУЛЯРНО-НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ

ВѢСТИКЪ ОПЫТНОЙ ФИЗИКИ И ЭЛЕМЕНТАРНОЙ МАТЕМАТИКИ¹

(съ 20-го августа 1886 года)

выходитъ книжками настоящаго формата, не менѣе 24 стр. каждая, съ рисунками и чертежами въ текстѣ, три раза въ мѣсяцъ, исключая каникулярнаго времени, по 12 №№ въ полугодіе, считая таковыя съ 15-го января по 15-ое мая и съ 20-го августа по 20-ое декабря.

Подписная цѣна съ пересылкою:

на годъ—всего 24 №№ 6 рублей | на одно полугодіе—всего 12 №№—3 рубля
Книжнымъ магазинамъ 5% уступки.

Журналъ издается по полугодіямъ (семестрамъ), и на болѣе короткій срокъ подписка не принимается.

Текущіе №№ журнала отдельно не продаются. Нѣкоторые изъ разрозненныхъ №№ за истекшія полугодія, оставшіеся въ складѣ редакціи, продаются отдельно по 30 коп. съ пересылкою.

Комплекты №№ за истекшія полугодія, сброшюрованные въ отдельные тома, по 12-ти №№ въ каждомъ, продаются по 2 р. 50 к. за каждый томъ (съ пересылкою).

Книжнымъ магазинамъ 20% уступки.

За перемѣнную адреса приплачивается всякий разъ 10 коп. марками.

Въ книжномъ складѣ редакціи, кроме собственныхъ изданий (всегда помѣченныхъ монограммой издателя) и изданий бывшей редакціи „Журнала Элементарной Математики“ (Проф. В. П. Ермакова), имѣются для продажи сочиненія многихъ русскихъ авторовъ, относящіяся къ области математическихъ и физическихъ наукъ. Каталоги печатаются на оберткѣ журнала.

На собственныхъ изданияхъ книги и брошюры редакціи дѣлаютъ 30% уступки книжнымъ магазинамъ и лицамъ, покупающимъ не менѣе 10-ти экземпляровъ.

На оберткѣ журнала печатаются

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ

о книгахъ, физическихъ, химическихъ и др. приборахъ, инструментахъ, учебныхъ пособіяхъ и пр.

на слѣдующихъ условіяхъ:

За всю страницу 6 руб. | За $\frac{1}{3}$ страницы 2 руб.
„ $\frac{1}{2}$ страницы 3 руб. | „ $\frac{1}{4}$ страницы 1 р. 50 к.

При повтореніи объявлений взымается вслѣдъ разъ половина этой платы. Семестровыхъ объявлений—печатаются съ уступкою по особому соглашенію.

Объявленія о новыхъ сочиненіяхъ или изданіяхъ, присыпаемыхъ въ редакцію для редакціи или библиографическихъ отчетовъ, печатаются одинъ разъ безплатно.

ВѢСТНИКЪ ОПЫТНОЙ ФИЗИКИ и ЭЛЕМЕНТАРНОЙ МАТЕМАТИКИ.

№ 40.

IV Сем.

15 Февраля 1888 г.

№ 4.

По поводу предполагаемаго съѣзда естествоиспытателей въ Харьковѣ.

Двадцать лѣтъ только прошло со времени учрежденія всероссійскихъ ученыхъ съѣзовъ—и мы уже къ нимъ охладѣли. Прежняго воодушевленія—не осталось почти слѣдовъ, прекрасныя мысли и пожеланія, высказанныя на 1-мъ съѣздѣ въ Петербургѣ—позабыты давно, а благія намѣренія стремиться всѣми силами къ распространенію естественно-историческихъ знаній въ обществѣ—осипались въ словахъ, какъ лепестки пустоцвѣта. Новинка скоро износилась и, несмотря на заграниційный край, переобразилась въ русскій халатъ.

Впрочемъ, въ близкомъ будущемъ, какъ говорятъ, предполагается новый съѣздъ въ Харьковѣ. Авось проснемся, хотя бы для того, чтобы дремать тамъ, во время секціонныхъ засѣданій. И за то спасибо.

Состоится ли этотъ съѣздъ въ Августѣ мѣсяцѣ, или когда нибудь позже, все равно не мѣшаетъ теперь же напомнить объ угрожающей ему опасности походить на прежніе съѣзы, на которыхъ по крайней мѣрѣ 90% всего числа членовъ составляло *толпу*, безвинно-безалаберную, не знающую куда примкнуть, что дѣлать, кого идти слушать, съ кѣмъ знакомиться, на что глязѣть. Эта толпа—это меньшая братья нашей физико-математической семьи, это тѣ, кои прѣѣхали съ тридевятыхъ земель, чтобы чему нибудь научиться, коимъ на сценѣ съѣзовъ суждено играть роль декоративнаго фона; это тѣ 90%, коихъ существованіе игнорируетъ программа съѣзовъ, коихъ почему то приглашаютъ, размѣщаютъ, угожаютъ, но все таки забываютъ гг. распорядители съѣзовъ.

но которыхъ не можетъ забыть „Вѣстникъ“, ибо это его читатели. Съ этою цѣлью, на страницахъ этого „Вѣстника“, я беру на себя смѣость напомнить будущимъ гг. членамъ Харьковскаго съѣзда какъ, напр., въ 1879 году, во время предпослѣдняго съѣзда въ Петербургѣ, эта бѣдная толпа, изъ 800 слишкомъ представителей меньшей братыи, шлялась по кабинетамъ, по секціоннымъ засѣданіямъ, забытая, ненужная, недоумѣвающая, скучная. Въ составъ ея входило очень много учителей, и изъ ихъ числа добрая половина пріѣхала на казенный счетъ. Зачѣмъ? Слишкомъ трудный вопросъ.—Напомню еще, какъ по частной инициативѣ нѣсколькихъ директоровъ и учителей среднихъ учебныхъ заведеній состоялось тогда-же въ одной изъ гостиницъ одно единственное quasi-педагогическое собрание. Предполагалось поговорить о дѣлѣ. Явилось, правда, два, три неподготовленные оратора, но... каждый изъ нихъ говорилъ только о своемъ собственномъ учебникѣ, а потому—всѣ предпочли сѣсть скорѣе за ужинъ. Этимъ все и окончилось, и я не думаю, чтобы этотъ ужинъ, на которомъ я имѣлъ непріятность быть, принесъ хоть малѣйшую пользу школьному дѣлу въ Россіи.

Если сравнить значение, какое должны имѣть подобные съѣзды въ странѣ, гдѣ не только народныя массы, но и такъ называемое интеллигентное общество такъ непозволительно отстало отъ научныхъ выводовъ современного естествознанія, съ тѣмъ ничтожнымъ по истинѣ значеніемъ, какое эти съѣзды имѣютъ теперь, если принять къ тому-же во вниманіе, какой серьезный вредъ приносить эта отсталость и умственная инерція развитію нашей промышленности, какая масса нашихъ природныхъ богатствъ, благодаря этой инерціи, лежитъ подъ спудомъ, въ ожиданіи пока ихъ не смоетъ на нашихъ глазахъ пресловутая волна *Drang nach Osten*,—то наврядъ ли можно долѣе сомнѣваться въ томъ, что организація русскихъ съѣзовъ естествоиспытателей должна быть совершенно иная. На 1-мъ съѣздѣ, покойный и незабвенный К. Ф. Кестлеръ закончилъ свою рѣчь словами: „Да будетъ ихъ (съѣзовъ) девизомъ: безкорыстная, усердная работа соединенными силами, для расширенія и распространенія естествознанія въ пользу и честь русскаго народа.“ Гдѣ же результаты, можно спросить по истиченіи 20 лѣтъ, этой дружной работы „соединенными силами“? Какой изъ всероссійскихъ съѣзовъ (кромѣ первого) означалъ собою эпоху въ жизни русской науки? Не третій ли, Кіевскій, (въ 1871 г.), на которомъ школьніе вопросы постановлено было исключить разъ на всегда изъ программы, и специальная секція педагогическая признана на съѣздахъ неумѣстною?

Итакъ, вместо ожидаемой ассоціації ученыхъ силъ и благихъ стремленій къ просвѣщенію страны, чѣмъ-же оказались наши съѣзды? Увеселительными поѣздками подъ предлогомъ учености по главнѣйшимъ

городамъ Россіи, безполезною географическою, такъ сказать, экскурсіею. Гдѣ же причины этой неудачи? Почему заграницей подобные съѣзды умѣстны и интересны, а у нась они и скучны для большинства, и почти для всѣхъ безполезны?

Всесторонне разсмотрѣть этотъ вопросъ, найти *всѣ* причины—дѣло не легкое. Предоставляя полное его рѣшеніе будущему Харьковскому съѣзду, я укажу только на *одну* изъ причинъ, существенную по отношенію къ большинству читателей „Вѣстника“.

Причина эта обща и примѣнима къ объясненію весьма многихъ неудачъ нашихъ благороднѣйшихъ побужденій и начинаній; это—привычка дѣйствовать ex abruptum, подъ впечатлѣніемъ минуты. Если намъ что либо сразу понравится, мы очень склонны увлечься словомъ: *валай!*! Понравились жѣлѣзныя дороги, классическая гимназія, пропедевтики, свекловичный сахаръ, электричество и пр.—валай, чего жалѣть! Понравились съѣзды—валай *всѣ* туда! Но о *подготовкѣ*—валайство не дастъ подумать. Пока съѣздъ официально не назначенъ—имъ рѣшительно никто не интересуется; никто не заботится о томъ, *какие* изъ накопившихся за истекшее время вопросовъ созрѣли и выяснились на столько, что уже настала очередь предложить ихъ на съѣздѣ для совмѣстного рѣшенія „соединенными силами.“ Никто и не хочетъ примкнуть къ этимъ „соединеннымъ силамъ“ заранѣе, а тамъ, когда уже *всѣ* собрались на лицо, въ разгарѣ десятидневной смѣны засѣданій и пикниковъ, уже поздно намѣтывать вопросы. И дѣйствительно, наши съѣзды никогда еще никакихъ вопросовъ не ставили, никакихъ темъ для будущихъ изысканій не задавали, и всегда, какъ веселые малютки, не думая о будущемъ (за исключеніемъ избранія города для будущихъ гостепріимныхъ развлеченій) довольствовались въ своихъ разговорахъ воспоминаніемъ прошлаго. Все, что привозится на съѣзды нашими учеными, состоитъ изъ отрывочныхъ специальныхъ рефератовъ прежнихъ работъ, иногда даже незаконченныхъ, и вслѣдствіе полнаго почти отсутствія иного материала, эти специальные работы, совершенно случайно, приобрѣтаютъ какую то общероссійскую важность.

Не трудно видѣть, что съѣзды наши имѣли бы совершенно другой характеръ и болѣе общее значеніе, если бы въ нихъ участвовали только люди, отлично знающіе зачѣмъ они явились. Необходимо чтобы всякой, кроме неопределеннаго желанія *что нибудь увидѣть и услышать*, привезъ съ собою, или лучше сказать въ себѣ, хоть что нибудь, что дѣлало бы и его личность на съѣздѣ не безличною. Пусть всякий, собирающійся побывать на съѣздѣ, прежде чѣмъ *валить туда* на всѣхъ парахъ (съ уступкою 30—50% провозной платы) *рѣшить* два вопроса: *въ какой мѣрѣ онъ самъ можетъ быть нуженъ и полезенъ на съѣздѣ, и какой онъ*

лично для себя ищетъ тамъ пользы. Тогда съѣзды будуть состоять не изъ толпы, а изъ собранія сознательно дѣйствующихъ людей.

Но—можеть спросить читатель—какой же тутъ цензъ полезности принять? Что можетъ, напр., привезть на съѣздъ въ себѣ какой нибудь учитель, давно забывшій всѣ тонкости науки и пропитанный до мозга костей преподаваемымъ имъ кусочкомъ предмета? Отвѣтить на это—можно лишь условно, а именно: если такой учитель чувствуетъ въ себѣ непреодолимое стремленіе приносить своей родинѣ пользу—онъ долженъ Ѳхать, не взирая даже на то, что и самъ хорошо не знаетъ гдѣ и какъ наивыгоднѣе ему будетъ расходовать свою энергию къ труду. Не бѣда, что онъ отсталъ по своему предмету, что онъ даже не пойметъ специальныхъ сообщеній къ этому предмету относящихся. Онъ Ѳдетъ на съѣздѣ какъ рабочая сила, и не ему будетъ стыдно, если этой *потенциальной энергіи* никто изъ старшей братіи на съѣздѣ не съумѣемъ, или не захочетъ преобразовать въ *кинетическую*, активную. Представителей такой потенціальнойной энергіи, носителей благородныхъ, но пока не направленныхъ ни въ какую сторону стремлений, въ Россіи очень много, и я думаю что игнорировать ихъ и этимъ заставлять расходоваться безъ толку—такъ же непростительно со стороны всѣхъ тѣхъ, кои могли бы быть инициаторами, какъ и держаніе подъ спудомъ другихъ природныхъ богатствъ Россіи. Разница лишь та, что послѣднихъ нужно кропотливо искать, а первые—сами напрашиваются и говорятъ: „*эксплоатируйте насть!*“ А потому однимъ изъ важнѣйшихъ пунктовъ реорганизованного устава съѣзовъ естествоиспытателей, должно быть допущеніе къ колективному труду „на пользу и въ честь русского народа“ всѣхъ младшихъ членовъ нашей семьи, которые, быть можетъ, оказались бы даже болѣе пригодными для проведения основныхъ элементовъ естествознанія въ народныя массы, чѣмъ высоко стоящіе специалисты.

Второе на что необходимо было бы теперь-же обратить вниманіе гг. распорядителей будущихъ съѣзовъ—это возстановленіе педагогической секціи со всѣми ея подраздѣленіями благодаря ея отсутствію многіе изъ пріѣзжавшихъ на прежніе съѣзды учителей оставались, такъ сказать, безъ мѣста и безъ права голоса. Я не могу понять, почему ученымъ сообщеніямъ, читаннымъ въ одной комнатѣ, могли бы мѣшать педагогическія бесѣды и пренія, происходящія гдѣ нибудь въ другой комнатѣ, и почему послѣднія были признаны неумѣстными въ тѣ именно дни, когда со всѣхъ концовъ Россіи одинъ разъ въ нѣсколько лѣтъ съѣзжаются и знакомятся учителя нашихъ гимназій, реальныхъ училищъ и пр. Неужели *всѣ* педагогическіе вопросы у насъ уже окончательно разрѣшены?

Пусть, наконецъ, страницы этого журнала послужатъ нагляднымъ

опровержениемъ того ложнаго мнѣнія, будто школьными вопросами у насъ вовсе не интересуются люди, посвятившіе себя специальными научными изслѣдованіями, и пусть то участіе, какое принимаютъ въ сотрудничествѣ гг. профессора университетовъ будетъ однимъ изъ доводовъ, что и они не отказались бы высказывать свои мнѣнія и принимать руководящее участіе въ педагогическихъ секціяхъ, посвященныхъ преподаванію естественныхъ наукъ и математики, если бы только таія секціи существовали.

Въ заключеніе обращаюсь съ предложеніемъ къ читателямъ, коихъ предполагаемый съѣздъ интересуетъ въ какомъ либо отношеніи. Сколько бы времени до открытия съѣзда ни оставалось—его не окажется слишкомъ много для добросовѣтной подготовки, а потому, въ предположеніи что и педагогическая секція существовать будетъ, слѣдуетъ теперь же приступить къ отчетливой формулировкѣ накопившихся вопросовъ, къ разработкѣ программы секціи, ея подраздѣленій и пр. пр. Концентрироваться все это можетъ на страницахъ „Вѣстника“, который для этой цѣли можно считать достаточно распространеннымъ *).

III.

О дѣленіи окружности на равныя части.

*А. Бобятинскаго, Ф. Коваржика и А. Войнова **).*

§ 1. Способами, излагаемыми въ элементарной геометріи, можно дѣлить окружность на 2, 3, 4, 5, 6, 8... частей, вообще на $2n$, если известно дѣленіе на n частей. Кроме того Гауссъ (1777—1853) показалъ въ своемъ сочиненіи: „*Disquisitiones arithmeticæ*“, что помошью линейки и циркуля можно дѣлить окружность на $2^m + 1$ частей, если только $2^m + 1$ число первое, напр. 17, 257 и т. п.

Въ практикѣ часто встрѣчается необходимость раздѣлить окружность на равныя части, число которыхъ не подходитъ подъ вышеуказанныя. Напримѣръ, въ зубчатыхъ колесахъ (по Reuleaux), если по

*) Въ случаѣ, если съѣздъ будетъ назначенъ въ августѣ текущаго года, все статьи и корреспонденціи, къ съѣзду относящіяся, будутъ помѣщаемы въ журналѣ не въ очередь съ другими, а въ первомъ текущемъ №.

Прим. редакціи.

**) Получивъ отъ поименованныхъ лицъ три замѣтки, касающіяся дѣленія окружности на равныя части, мы, въ интересахъ читателей, сочли болѣе удобнымъ соединить таіковъ въ одну статью, при чемъ, чтобы не нарушать авторскихъ правъ, дѣлимъ ее на части съ отмѣтками приславшихъ каждую часть фамилій авторовъ.—§ 1 принадлежитъ г. Бобятинскому. (Егоръ, зол. пром.)

Прим. редакціи.

вычисленію выходитъ, что число зубцовъ на одномъ колесѣ 18, а на другомъ 42, то для равномѣрнаго истиранія зубцовъ берутъ отношеніе 19 : 42 или 18 : 43,—вообще замѣняютъ вычисленныя отношенія отношеніемъ ближайшихъ первыхъ чиселъ. Вопросъ же о дѣленіи окружности на 19 частей приводить къ решенію уравненія 3-ей степени, а дѣленіе на 11 частей—къ решенію уравненія 5-ой степени. Изъ практики приходится убѣдиться, что приближенные способы дѣленія скорѣе ведутъ къ цѣли, чѣмъ самыя точныя вычислениа. Цѣль настоящей замѣтки—показать способы приближенія дѣленія окружности на требуемое число равныхъ частей.

Первый способъ дѣленія окружности на требуемое число равныхъ частей былъ предложенъ итальянскимъ математикомъ Ренальдини (\dagger 1700). Онъ считался точно геометрическимъ до тѣхъ поръ, пока швейцарскій математикъ Яковъ Бернулли не доказалъ, что способъ этотъ только приближенійный. Онъ состоитъ въ слѣдующемъ.

Фиг. 7.

Пусть дана окружность О (фиг. 7), и требуется раздѣлить ее на n равныхъ частей. Проведемъ диаметръ АВ и на немъ построимъ равносторонній треугольникъ АВС; затѣмъ дѣлимъ диаметръ АВ на n равныхъ частей и проводимъ прямую линію чрезъ С и второе изъ дѣленій (считая отъ А или отъ В). Дуга ВD и будетъ искомой $\frac{1}{n}$ частью окружности. Покажемъ, что когда $n=2$, 3, 4 и 6, этотъ способъ даетъ вполнѣ точные результаты; для другихъ же чиселъ—болѣе или менѣе приближенійные. Для этого вычислимъ величину хорды BD въ зависимости отъ радиуса R и n . Соединивъ С и О, получимъ:

$$CO=R\sqrt{3}, \quad BF=2\cdot\frac{R}{n}, \quad OF=\frac{R^{n-4}}{n}.$$

Опустимъ изъ D перпендикуляръ DE на диаметръ АВ, тогда:

$$BD^2=2R\cdot BE. \quad (1)$$


$BE=BF-EF$. Изъ подобія треугольниковъ EDF и FOC, имѣмъ:

$$EF=\frac{FO\cdot DE}{CO} \quad (2)$$

Потомъ изъ прямоугольнаго треугольника EOD имѣмъ:

$$DE^2=DO^2-(EF+FO)^2. \quad (3)$$

Рѣшимъ это уравненіе относительно DE, принявъ во вниманіе (2) и замѣнивъ CO, FO и DO ихъ величинами въ функции радиуса. Зная DE,



мы можемъ изъ (2) опредѣлить EF, тогда легко найти BE. Слѣдовательно мы можемъ теперь найти изъ (1) величину BD. Именно, послѣ сокращеній, получимъ:

$$BD=R \sqrt{\frac{8 - 2\left(\frac{n-4}{n}\right)}{3 + \left(\frac{n-4}{n}\right)^2} \sqrt{\frac{3 - 2\left(\frac{n-4}{n}\right)^2 - \left(\frac{n-4}{n}\right)^2}{3 - 2\left(\frac{n-4}{n}\right)^2}}}$$

Такъ выражается хорда BD въ функции R и n. Замѣння здѣсь n чрезъ 2, 3, 4, 5, получимъ:

n	ПО ФОРМУЛѢ.	ВЪ ДѢЙСТВИТЕЛЬНОСТИ.
2	$BD=2R$	$BD=2R$
3	$=R\sqrt{3}$	$=R\sqrt{3}$
4	$=R\sqrt{2}$	$=R\sqrt{2}$
5	$=R\sqrt{\frac{122-\sqrt{73}}{76}}$	$=R\sqrt{\frac{10-2\sqrt{5}}{4}}$
6	$=R$	$=R$
8	$=R\sqrt{\frac{14-\sqrt{40}}{13}}$	$=R\sqrt{2-\sqrt{2}}$
10	$=R\sqrt{\frac{65-\sqrt{57}}{70}}$	$=R\frac{\sqrt{5}-1}{2}$

Изъ этой таблицы видно, что формула даетъ точные результаты для $n=2, 3, 4$ и 6 ; для остальныхъ же случаевъ—приблизительные. Напр. $a_8=0,76537R$, а вычисленная по формулѣ $=0,7684R$.

§ 2*). Мы доказали, что окружность раздѣлена на n равныхъ частей, при чмъ доказательство сводилось на вычисление стороны правильного, вписанного многоугольника; не трудно видѣть, что доказательство можетъ быть сведено еще къ опредѣленію центральнаго угла $x=BOD$, истинная величина котораго есть:

$$\frac{360^\circ}{n}$$

*.) § 2 принадлежитъ весь, включая и табличку, г. Коваржику (изъ Полтавы).

Найдемъ вычисленіемъ величину центрального угла x для нѣкоторыхъ частныхъ значеній n и сравнимъ ихъ съ истинною величиной. Мы имѣемъ:

$$DO=R, \quad FO=R-\frac{4R}{n}, \quad BF=\frac{4R}{n}, \quad BC=2R.$$

Тогда изъ треугольника BFC, найдемъ:

$$\frac{2R\left(1+\frac{2}{n}\right)}{2R\left(1-\frac{2}{n}\right)} = \frac{\operatorname{tg} 60^\circ}{\operatorname{tg}(\alpha-60^\circ)}, \quad (4)$$

гдѣ уголъ α =углу BFC.

Изъ равенства (4) имѣемъ:

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{n\sqrt{3}}{4-n}.$$

Теперь уже можно рѣшить треугольникъ DFO.

$$\frac{DO}{FO} = \frac{\operatorname{Sin} \alpha}{\operatorname{Sin}(\alpha+x)}. \quad \dots \quad (5)$$

Замѣнивъ DO и FO ихъ величинами R и $R\frac{n-4}{n}$, Cos чрезъ $\sqrt{1-\operatorname{Sin}^2 x}$, мы получимъ въ концѣ концовъ:

$$\operatorname{Sin} x = \frac{-\sqrt{3}(n-4)^2 \pm \sqrt{3(n-4)^4 + 96(n-2)(n^2-2n+4)}}{4(n^2-2n+4)}. \quad \dots \quad (6)$$

Очевидно, что знаменатель будетъ величина положительная; онъ можетъ быть представленъ въ такомъ видѣ:

$$(n-2)^2 + 2n.$$

А такъ какъ для всякаго правильнаго многоугольника уголъ x будеть острый, то $\operatorname{Sin} x$ есть величина положительная, а потому въ выражении (6) нужно брать передъ корнемъ только плюсъ.

Болѣе простое выраженіе для вычисленія угла x получится, если мы при рѣшеніи треугольника ODF воспользуемся формулой

$$\frac{DO+FO}{DO-FO} = \frac{\operatorname{tg}\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)}{\operatorname{tg}\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)},$$

гдѣ $\beta=\angle ODF$. Имѣно, мы найдемъ тогда, что:

$$\operatorname{Ctg} \frac{x}{2} = \frac{n-4 \pm \sqrt{(n-4)^2 + 24(n-2)}}{4\sqrt{3}}.$$

Легко видѣть, что и здѣсь передъ радикаломъ нужно взять только *n* *множ.* Замѣння *n* разными значеніями, можно найти центральные углы требуемыхъ многоугольниковъ; сравнивая же полученные результаты съ истинною величиною центральныхъ угловъ $\left(\frac{360^\circ}{n}\right)$, легко опредѣлить, сдѣланную по построенію Ренальдини погрѣшность.


Число сто- роиъ много- угольника.	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УГОЛЪ.		ПОГРѢШНОСТЬ.
	По построенію Ренальдини.	ИСТИННЫЙ.	
7	51°31' 8"	51°25'43"	5'24"
8	45°11'18"	45°	11'18"
9	40°16'44"	40°	16'44"
10	36°21'23"	36°	21'23"
11	33° 8'58"	32°43'38"	25'20"
12	30°28'24"	30°	28'24"
13	28°12'29"	27°41'32"	30'57"
14	26°15'47"	25°42'51"	32'56"
15	24°34'30"	24°	34'30"
16	23° 5'42"	22°30'	35'42"
17	21°47'12"	21°10'35"	36'37"
18	20°37'16"	20°	37'16"
19	19°34'36"	18°56'50"	37'45"
20	18°38' 3"	18°	38' 3"
21	17°46'46"	17° 8'34"	38'12"
22	17° 0' 4"	16°21'49"	38'15"
23	16°17'19"	15°39' 8"	38'11"
24	15°38' 4"	15°	38' 4"
25	15° 1'56"	14°24'	37'56"
40	9°32'40"	9°	32'40"

Изъ этой таблицы, вычисленной при помоши пятизначныхъ таблицъ Пржевальского, видно, что уголъ, полученный построеніемъ Ренальдини *всегда* больше истиннаго; съ уведеніемъ *n* возрастаетъ погрѣшность и достигаетъ своего *maxимум* для *n=22*. Относительная же погрѣшность, т. е. отношение абсолютной погрѣшности къ истинной величинѣ центрального угла, непрерывно увеличивается вмѣстѣ съ *n*; такъ для *n=5*, погрѣшность составляетъ 0,17% центрального угла; для *n=10*, равна 1%; для *n=15*, будетъ 2,36% и т. д.

§ 3*). Второй способъ состоить въ слѣдующемъ.

Дана окружность O ; проводимъ діаметръ AB , дѣлимъ его на n равныхъ частей и продолжаемъ на одно дѣленіе до C (фиг. 8); изъ O возваляемъ перпендикуляръ, откладываемъ на немъ $OD=OC$ и соединяемъ C съ D . Ближайшую къ C точку пересѣченія CD съ окружностью,

Фиг. 8.



Е соединяемъ съ третьимъ отъ A дѣлениемъ F . Тогда EF будетъ искомой хордой $\frac{1}{n}$ части окружности, съ достаточнымъ приближеніемъ. Дѣйствительно, изъ треугольника ECF имѣемъ:

$$EF^2 = CE^2 + CF^2 - 2 \cdot CE \cdot CF \cdot \cos 45^\circ \quad \dots (7)$$

Чтобы опредѣлить CE и CF , опустимъ изъ O перпендикуляръ OG на CD ; тогда, принимая радиусъ за единицу, получимъ:

$$2CG^2 = 2OG^2 = \left(\frac{n+2}{n}\right)^2. \quad \dots \dots \dots \dots \dots (8)$$

Потомъ изъ треугольника EGO имѣемъ

$$EG = \sqrt{1 - \left(\frac{n+2}{n\sqrt{2}}\right)^2} \quad \dots \dots \dots \dots \dots (9)$$

Изъ (8) и (9) легко найти величины CG и EG . Слѣд. можемъ определить $CE = CG - EG$; тогда, помня, что $\cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$ и $CF = \frac{8}{n}$, мы найдемъ изъ (7) послѣ всѣхъ упрощеній:

$$EF = \frac{1}{n} \sqrt{(n-4)^2 + 32 - (n-6)\sqrt{(n-2)^2 - 8}}.$$

Отсюда видимъ, что при $n=2, 3$ и 4 величина для EF получается невозможная; для $n=5$, $EF=1,16619$ вмѣсто $1,17557$; для $n=6$, $EF=1$; для $n=8$, $EF=0,764$ вмѣсто $0,7653$.


§ 4. При черченіи можно рекомендовать слѣдующій способъ дѣленія окружности на n равныхъ частей. Положимъ дана окружность; возьмемъ примѣрно циркулемъ хорду, которая на нашъ взглядъ подходитъ къ искомой, и отложимъ ее на окружности n разъ и допустимъ, что она переходитъ начальную точку, отъ которой велось откладываніе, на некоторую длину; слѣд. выбранная длина слишкомъ велика. На произвольной линіи

*) §§ 3 и 4 принадлежать г. Бобатинскому.

откладываемъ выбранную линію АВ (фиг. 9). Изъ конца В возставляемъ перпендикуляръ ВС, равный хордѣ дуги избытка. Возьмемъ длину AD меньшую АВ, отложимъ на окружности отъ той же точки и положимъ, что AD уложилось n разъ и осталась нѣкоторая дуга; слѣд. AD выбрано слишкомъ малою. Изъ D возставляемъ перпендикуляръ внизъ и откладываемъ DE=хордѣ дуги недостатка; соединивъ Е и С, получимъ въ пересѣченіи съ АВ точку F; тогда AF представить довольно точно искомую хорду. Если ошибки СВ и DE были малы, то они и распредѣлились пропорціонально. Если же и AF будетъ недостаточно точно, то поступаютъ такъ же съ AF, какъ и съ АВ. Послѣ нѣсколькихъ попытокъ получится искомая хорда съ желаемой точностью, которая во многихъ случаяхъ можетъ замѣнить хорду опредѣленную вычисленіемъ.

§ 5 *). Въ началѣ текущаго столѣтія италіанскій математикъ Маскерони издалъ сочиненіе: „Объ употребленіи циркуля“, въ которомъ изложилъ

Фиг. 10.



новый способъ геометрическихъ построеній—при помощи одного циркуля. Гдѣ требуется определение только точекъ, гдѣ, слѣдовательно, можно обойтись безъ проведения прямыхъ, съ выгодаю можетъ быть примѣнъ способъ Маскерони, ибо построенія въ этомъ случаѣ получаются болѣе точными, чѣмъ при обычныхъ приемахъ. Къ числу такихъ построеній относится дѣленіе окружности на равныя части.

Разсмотримъ здѣсь нѣсколько частныхъ случаевъ дѣленія окружности на равныя части; а именно: на 4, 6, 8, 12 и 24 части (фиг. 10).

*) Весь § 5 принадлежитъ г. Войнову (изъ Харькова).

Пусть дана окружность О радиуса R и требуется раздѣлить ее на 4 равные части. Для этого изъ какой нибудь точки A, находящейся на окружности, проводимъ послѣдовательно дуги радиусомъ R, пересѣкающія данную окружность въ точкахъ B, C и D; потомъ изъ A и D, радиусомъ $AC=R\sqrt{3}$ проводимъ дуги, пересѣкающіяся въ M и N; наконецъ изъ A, радиусомъ OM описываемъ дугу HQ. Точки A, H, D и Q—искомыя. Въ самомъ дѣлѣ, треугольники AOM и DOM равны (на чертежѣ прямые не проведены, во избѣжаніе излишней сложности). Изъ равенства этихъ треугольниковъ находимъ, что:


$$AH=OM=R\sqrt{2}$$

т. е. AH есть сторона вписанного квадрата. Чтобы данную окружность раздѣлить на 8 равныхъ частей, намъ остается лишь описать изъ M и N дуги радиусомъ R, пересѣкающія данную окружность въ точкахъ E и F, P и K. Тогда искомыя точки будутъ: A, E, H, F, D, K, Q и P. Не трудно видѣть, что треугольникъ EMO есть прямоугольный равнобедренный, слѣд. уголъ EOM=45°, и дуга EH составляетъ восьмую часть окружности.

Проводя изъ точекъ A, H, D и Q дуги радиусомъ R, получимъ точки пересѣченія a, b, p, m, h и n этихъ дугъ съ окружностью. Очевидно, что $Aa=AH=aH=30^\circ$, $BH=AH-AB=30^\circ$; слѣд. $aB=30^\circ$, и данная окружность въ точкахъ A, a, B, H, C, b, D, m, n, Q, h и p раздѣлится на 12 равныхъ частей. Для дѣленія окружности на 24 равныя части, опишемъ теперь изъ точекъ E, F, P и K дуги радиусомъ R; они пересѣкаются съ окружностью въ 8 точкахъ, которыя вмѣстѣ съ точками A, a, E, B, H, C, F, D, m, K, n, Q, h, P, p и дѣлятъ окружность на 24 части. Въ самомъ дѣлѣ, $EB=EH-BH=15^\circ$, $aE=aB-EB=15^\circ$, далѣе $Hn=Ex$, ибо каждая изъ нихъ=60°, отнявъ отъ нихъ по EH, получимъ: $xC=HC-Hx=15^\circ$; $Ar=rP-AP=15^\circ$; $ra=Aa-Ar=15^\circ$; $fH=fF-HF=15^\circ$; $Bf=BH-fH=15^\circ$; $aE=Hx=15^\circ$; тоже самое можно сказать относительно всѣхъ дугъ.

Чтобы раздѣлить окружность на 5 равныхъ частей, поступаемъ слѣдующимъ образомъ. Найдемъ точки A, B, C, D, M, H, a, b по способу раньше изложенному; потомъ опишемъ изъ точекъ a и b окружности радиусомъ $R\sqrt{2}$, пересѣкающіяся въ точкѣ S (фиг. 11); затѣмъ изъ A радиусомъ AS описываемъ дугу, пересѣкающую нашу окружность въ точкахъ X и Y. Точки A, X, Y представляютъ искомыя точки дѣленія. Въ самомъ дѣлѣ, треугольники CHb и aBH равны (на чертежѣ они не дочерчены); $aB=Cb$, какъ стороны вписанныхъ 12-тиугольниковъ; $\angle CHb = \angle BHa$; $\angle BaH = \angle CbH$, слѣд. $aH=Hb$. Потомъ треугольники aHS и bHS равны, слѣд. $\angle aSH = \angle bSH$, поэтому треугольники aSN₁ и bSN₁ равны; откуда

Фиг. 11.



$\angle aN_1S = \angle bN_1S = 90^\circ$, т. е. прямая HS проходит чрезъ центръ. Такъ какъ $ab = R\sqrt{3}$, то $ON_1 = \frac{R}{2}$; потому изъ треугольника SbN_1 (недочерченного) имъемъ:

$$N_1S = \frac{R\sqrt{5}}{2} = OS + ON_1, \quad OS = \frac{R}{2}(\sqrt{5}-1).$$

Наконецъ изъ треугольника AOS (тоже недочерченного) получимъ

$$AS = \sqrt{\frac{5-\sqrt{5}}{2}}$$

что и требовалось доказать.

Чтобы раздѣлить окружность на 10 частей, слѣдуетъ лишь изъ вершинъ полученнаго 5-и угольника описать дуги радиусомъ OS , равнымъ сторонѣ десятиугольника.

О притяженіи вѣшней точки массою, равномѣрно распределеною на сфере.


Представимъ себѣ многогранникъ, описанный около данной сферы; грани его назовемъ чрезъ $\sigma_1, \sigma_2, \dots$. Пусть массы, находящіяся на граняхъ, будуть пропорціональны площадямъ граней и поэтому выражатся чрезъ $k\sigma_1, k\sigma_2, \dots$ где k есть постоянная величина, выражающая массу, расположенную на единицѣ поверхности. Даље предположимъ, что массы $k\sigma_1, k\sigma_2, \dots$ сосредоточены соотвѣтственно въ точкахъ C_1, C_2, \dots, C_n , въ которыхъ грани многогранника касаются шара. Если чрезъ F обозначимъ силу притяженія между двумя единицами массы на единицѣ разстоянія, то сила, съ которой масса $k\sigma$, сосредоточенная въ точкѣ C (фиг. 12), при-

Фиг. 12.

тягиваетъ единицу массы, находящуюся въ точкѣ A , выражается такимъ образомъ:

$$\frac{Fk\sigma}{r^2}$$

если разстояніе AC обозначимъ чрезъ r . Направлена эта сила по прямой AC ; соединимъ теперь точку A съ центромъ шара пря-



мою АО и разложимъ силу притяженія на двѣ составляющія: по направленію АО и по направленію перпендикулярному къ нему.

Тогда величина первой составляющей будетъ:

$$\frac{F \cdot k \sigma}{r^2} \cdot \cos \alpha$$

гдѣ α есть уголъ САО.

Опредѣльчъ теперь на прямой АО точку В такъ, чтобы

$$AO : OC = OC : OB.$$

Изъ получившихъ подобныхъ треугольниковъ ОСВ и ОСА имѣемъ:

$$AO : OC = OC : OB = AC : BC$$

или, полагая для краткости

$$AO = a, OC = R, BC = \rho,$$

$$a : R = R : OB = r : \rho.$$

Отсюда

$$r = -\frac{a\rho}{R}.$$

Слѣдовательно составляющая силы притяженія, оказываемаго на точку А элементомъ σ , и направленная по АО, выразится:

$$\frac{F \cdot k R^2}{a^2} \cdot \frac{\sigma \cos \alpha}{\rho^2}$$

Полная же составляющая сила притяженія, направленная по АО, съ которою всѣ элементы $\sigma_1, \sigma_2, \dots$ многогранника дѣйствуютъ на точку А, выразится суммсю:

$$\frac{F \cdot k R^2}{a^2} \left\{ \frac{\sigma_1 \cos \alpha_1}{\rho_1^2} + \frac{\sigma_2 \cos \alpha_2}{\rho_2^2} + \dots \right\} \quad (1)$$

Соединимъ вершины какой либо грани σ съ точкой В прямymi и, проведя чрезъ нихъ плоскости, построимъ пирамиду съ вершиною В. Очевидно, что высота этой пирамиды будетъ $\rho \cos \alpha$, слѣд. объемъ ея будетъ:

$$\frac{1}{3} \rho \cdot \sigma \cdot \cos \alpha.$$

Отложимъ на СВ линію $Bc=1$ и чрезъ точку c проведемъ плоскость σ' параллельно грани σ . Тогда объемъ отсѣченной части пирамиды, относясь къ объему полной какъ $1 : \rho^3$, выразится

$$\frac{1}{3} \sigma \cdot \frac{\cos \alpha}{\rho^2} \quad (2)$$

Пусть a и b суть двѣ точки площади σ' , соотвѣтственно наиболѣе и наименѣе удаленные отъ В; опишемъ изъ В, какъ изъ центра два

шара радиусами Va и Vb и обозначимъ чрезъ v_1 и v_2 объемы шаровыхъ вырѣзковъ, вырѣзанныхъ гранями нашей пирамиды изъ этихъ шаровъ.

Очевидно, что

$$v_1 > \frac{1}{3} \pi \frac{\cos \alpha}{\rho^2} > v_2.$$

Если означимъ прямую ab чрезъ λ , то $Va - Vb < \lambda$. Такимъ образомъ выраженіе (2) представляетъ величину объема, вырѣзанного гранями пирамиды изъ шара, радиусъ которого разнится отъ единицы на величину меньшую λ , гдѣ λ есть прямая не выходящая изъ площади σ' .

Отсюда слѣдуетъ, что полная сумма

$$\frac{\sigma_1 \cos \alpha_1}{3\rho_1^2} + \frac{\sigma_2 \cos \alpha_2}{3\rho_2^2} + \dots \quad (3)$$

a fortiori заключена между объемами шаровъ, описанныхъ около точки В радиусами $1+\lambda$ и $1-\lambda$, гдѣ λ есть *наибольшая* изъ прямыхъ, умѣщающихся въ площадяхъ σ' . Разница между этими объемами есть:

$$\frac{4}{3}\pi(1+\lambda)^3 - \frac{4}{3}\pi(1-\lambda)^3 = \frac{8}{3}\pi\lambda(3+\lambda^2).$$

Если наконецъ представимъ, что всѣ грани σ нашего многогранника безгранично уменьшаются, то разность между объемами упомянутыхъ шаровъ будетъ также безгранично уменьшаться и оба они будутъ приближаться къ предѣлу $\frac{4}{3}\pi$. Разность же между $\frac{4}{3}\pi$ и суммою (3) *a fortiori* будетъ становиться меньше всякой данной величины. Слѣдовательно полную составляющую по направленію АО силу притяженія сферы, равномѣрно покрытой тяготѣющей массой, получимъ, подставивъ въ (1) вместо суммы стоящей въ скобкахъ, предѣльное значеніе ея, именно 4π . Тогда выраженіе (1) получимъ такой видъ:

$$\frac{F \cdot 4\pi R^2 k}{a^4} \quad (4)$$

гдѣ $4\pi R^2 k$ есть масса всей сферы.

Что же касается составляющихъ, направленныхъ перпендикулярно къ линіи АО, то не трудно видѣть, что ихъ сумма въ предѣлѣ обращается въ нуль, вслѣдствіе симметричнаго расположенія точекъ сферы относительно линіи АО. Такимъ образомъ выраженіе (4) представляетъ величину полнаго дѣйствія на единицу массы въ А, и изъ него мы видимъ, что масса, равномѣрно расположенная на сфере, дѣйствуетъ на внѣшнюю точку такъ, какъ если бы вся эта масса была сосредоточена въ центрѣ сферы.

Г. Флоринский (Кievъ).

Научная хроника.

от редакции

Астрономія.

Отвѣтъ французскаго астронома Фая на возраженія пр. Хандрикова. Читатели наши помнить, вѣроятно, интересный отчетъ пр. М. Хандрикова, данный имъ въ засѣданіи Кіевскаго Общества Естествоиспытателей 5-го сентября 1887 г. о наблюденіи солнечнаго затмѣнія съ горы Благодать, и помѣщенный въ № 27 „Вѣстника“ (см. стр. 56 сем. III). Въ февральской книжкѣ журнала „L'astronomie“ за тек. годъ (см. стр. 54) тотъ-же отчетъ впервые появился на французскомъ языке (пер. Г. Готье-Вилляра, вѣроятно, съ нѣмецкаго перевода барона Энгельгарта). Всльдѣ затѣмъ Г. Фай въ засѣданіи Парижской Академіи наукъ 6 февраля (н. ст.) поспѣшилъ отвѣтить на возраженія, сдѣланныя пр. Хандриковымъ его гипотезѣ солнечныхъ явлений. Отвѣтъ этотъ помѣщенъ въ № 6 „Comptes Rendus“ (см. стр. 399, томъ CVI) и въ № 3 „L'astronomie“ (стр. 89) онъ слишкомъ длинень, чтобы помѣщать его цѣликомъ, ибо почтенный астрономъ повторяетъ въ немъ главныя положенія своей гипотезы, а потому мы ограничиваемся краткимъ извлеченіемъ.

Возраженія противъ гипотезы Файя, предполагающей непосредственную связь между солнечными пятнами, факелами и протуберанцами *), пр. Хандриковъ основываетъ на томъ фактѣ, что, наблюдая солнечный дискъ въ теченіе 11 дней, предшествовавшихъ затмѣнію, онъ вообще не нашелъ на немъ большихъ пятенъ, и только за 5 дней до затмѣнія показались на восточномъ краю 2 незначительныя пятна, передвинувшіяся затѣмъ къ срединѣ диска. Солнце вообще переживаетъ въ наше время *minimum* пятенъ (въ 1889 г.) и потому съ точки зренія гипотезы Файя становится непонятнымъ появленіе столь значительного числа протуберанцевъ въ моментъ затмѣнія и въ особенности наибольшаго изъ нихъ (см. рис. 12 и 13 въ № 27 „Вѣстника“, протуберанцъ *a*).

Въ своемъ отвѣтѣ Г. Фай старается объяснить это противорѣчіе тѣмъ, что—согласно его гипотезѣ—не только пятна, но и поры (т. е. пятна очень малыхъ сравнительно размѣровъ) должны вызывать водородные изверженія, замѣчаемыя нами какъ протуберанцы (красные выступы). Безъ этого гипотеза была бы давно признана несостоятельною, ибо протуберанцы бываютъ видны и въ такихъ широтахъ солнца, где пятенъ не бываетъ, а есть только поры. Переходя далѣе къ раздѣленію протуберанцевъ на *эруптивные* и *облачные*, г. Фай утверждаетъ, что только первые изъ нихъ обусловливаются пятнами; вторые же, которые никогда не бываютъ очень большими и быстро-мѣняющимися, встречаются часто въ тѣхъ областяхъ, где пятенъ не бываетъ, и потому ихъ происхожденіе нужно приписать солнечнымъ порамъ. Изъ числа протуберанцевъ, наблюдавшихся во время затмѣнія проф. Хандриковымъ, по мнѣнію г. Файя было только одинъ эруптивный (именно *a*), остальные же всѣ

*) См. статью „Солнце“, которая печаталась въ „Вѣстнике“ въ №№ 2, 5 и 8 (I сем.) и въ №№ 14, 16, 19, 21 и 22 (II сем.).

(протуб. *b*, *c*, *d*, *e* на тѣхъ-же рисункахъ) слѣдуетъ отнести къ категоріи облачныхъ, обусловливаемыхъ порами.

Отвѣтъ этотъ нельзя однокожь назвать устраниющимъ всѣ сомнѣнія, уже потому, что все-же таки появленіе наибольшаго изъ протуберанцевъ (*a*), который самъ г. Фай называетъ эруптивнымъ, остается непонятнымъ при отсутствии въ этихъ областяхъ солнца большихъ пятенъ. III.

♦ Внутренняя температура глетчеровъ. Гагенбахъ и Форель. (*Ed. Hagenbach und F. A. Forel. C. R. CV. p. 859. 1887*).

Въ прошломъ году Форель доказалъ при помощи двухъ наблюдений, что температура стѣнъ естественного грота глетчера Аролла должна лежать ниже 0° ; для этого онъ пробуравливаль въ льдѣ отверстія и наполняль ихъ водой при 0° ; черезъ нѣсколько дней вода въ отверстіяхъ замерзала. Провѣряя этотъ результатъ, Гагенбахъ доказалъ при помощи термометра, что ртутный столбъ стояль на нѣсколько сотыхъ градуса ниже 0° .

Въ виду важности этихъ наблюдений для теоріи глетчеровъ, названные физики повторили вмѣстѣ эти опыты съ возможной точностью. Они приготовили для этой цѣли термометръ изъ енензерскаго стекла, который вблизи 0° , удаленнаго на 45 см. отъ шарика съ ртутью, былъ раздѣленъ на соты части градуса, такъ что при помощи лупы можно было легко отсчитывать тысячны доли градуса. Наблюденія были сдѣланы между 21 и 27 августа въ естественномъ гротѣ глетчера Аролла.

Точка 0° термометра была опредѣлена заранѣе, и другіе подобные термометры были сравнены между собою. Въ стѣнѣ глетчера были сдѣланы дыры, въ которыхъ вставлялись трубки, наполненные до половины керосиномъ; въ нихъ вставлялись термометры, отверстія закрывались пробкой изъ ваты и снѣга, послѣ чего отсчитывалась высота ртутного столба. Спустя нѣсколько часовъ высота болѣе не измѣнялась, но не смотря на это, термометръ оставлялся въ трубкѣ еще на 24 часа.

Термометры были вложены въ пяти различныхъ мѣстахъ въ стѣны глетчера и всѣ они подтвердили упомянутый выше результатъ: масса глетчера показывала на глубинѣ 45 см. температуру между $-0,002$ и $-0,031^{\circ}$.

Причина такой температуры можетъ быть тройкая:

1) Понижение точки замерзанія могло произойти вслѣдствіе нечистоты льда, такъ какъ уже малѣйшія примѣси понижаютъ точку замерзанія. Но это предположеніе несостоитъ, такъ какъ 0° термометровъ былъ опредѣленъ при помощи тающаго льда того же глетчера.

2) Можно было бы предположить, что эта низкая температура есть еще остатокъ того зимняго холода, который проникъ въ массу глетчера; но это предположеніе тоже несостоитъ, такъ какъ нельзѧ принять, чтобы еще въ концѣ августа, послѣ трехъ-мѣсячной постоянной и хорошей погоды, въ гротѣ, въ которомъ господствуетъ сильный сквозной вѣтеръ, осталось что нибудь отъ зимняго холода. Кроме того при помощи этого допущенія нельзѧ никоимъ образомъ объяснить замѣченное въ различныхъ мѣстахъ грота различіе въ температурѣ.

3) Такимъ образомъ остается, наконецъ, еще одно объясненіе, которое авторы считаютъ всего болѣе вѣроятнымъ. Сильное давленіе пони-

жаетъ точку плавленія всякаго вещества, плотность котораго въ жидкому состояніи больше, чѣмъ въ твердомъ, въ особенности это явленіе рѣзко замѣчается у льда. Многіе физики доказали отчасти теоретически, отчасти же при помощи лабораторныхъ опытовъ, что это пониженіе точки плавленія достигаетъ для давленія одной атмосферы 0,0075°. Въ глетчерѣ вѣсъ верхнихъ слоевъ давитъ на нижніе очень сильно; напр. въ глетчерѣ Аролла ледъ, лежацій надъ нѣкоторыми изъ изслѣдованныхъ мѣстъ, достигаетъ въ высину до 40 метровъ. Такое давленіе должно понизить точку плавленія льда на нѣсколько сотыхъ градуса.

Различіе въ температурѣ, наблюденное въ нѣкоторыхъ мѣстахъ грота, можно легко объяснить различіемъ давленія, смотря потому, по-коится ли глетчеръ въ данномъ мѣстѣ непосредственно на днѣ и такимъ образомъ выдерживаетъ полное давленіе, или внизу имѣетъ видъ арки, виситъ такимъ образомъ въ воздухѣ и подверженъ только части давленія.

Низкая температура, наблюденная въ глетчерѣ Аролла, есть такимъ образомъ слѣдствіе давленія, которое понижаетъ точку плавленія льда; это явленіе есть счастливое подтвержденіе факта, который уже давно былъ найденъ въ лабораторіяхъ.

Бжм. (Цюрихъ).

Бібліографіческіе отчеты, рецензіи и пр.

Журналъ „Счетоводство“ выходитъ съ начала текущаго года два раза въ мѣсяцъ. Это первый, кажется, журналъ въ Россіи, задавшійся цѣлью знакомить наше общество съ основами правильнаго счетоводства и доказать ему всю важность этой необходимой при всякомъ предпріятіи специальности; поэтому нельзя не отнести вполнѣ сочувственно къ возникновенію у насъ подобнаго органа печати и не пожелать его редакціи успѣха въ ея трудныхъ начинаніяхъ.

До настоящаго времени вышло уже три номера журнала, и потому— во 1-хъ для ознакомленія нашихъ читателей съ программою новаго изданія, и во 2-хъ для того, чтобы не быть голословнымъ въ изложеніи нашей симпатіи основнымъ задачамъ редакціи „Счетоводства“,—мы позволимъ себѣ нѣсколько подробнѣе поговорить о вышедшихъ пока №№.

Кромѣ передовой статьи „отъ редакції“ и подробно изложенной программы, въ этихъ №№ читатель найдеть: 1) рядъ популярныхъ статей, посвященныхъ разъясненію основъ счетоводства, подъ заглавіями: „Что такое счетоводство?“, „Основные элементы счетоводства“, „Элементы счетоводства“, „Двойная бухгалтерія“ (по Галлусу) (статья I-ая); 2) статьи специальнаго характера: „Отношеніе между государственнымъ банкомъ и частными кредитными учрежденіями“, „Юридическая бесѣда“ (три статьи: о юридическомъ значеніи торговыхъ книгъ, кто по закону обязанъ вести торговыя книги и какія именно?, форма и содержаніе обязательныхъ торговыхъ книгъ) „Общий взглядъ на наши банковыя учрежденія“; 3) статьи педагогического, такъ сказать, характера: „О коммерческомъ образованіи въ Россіи“, „Жгучій вопросъ“, „Коммерческое образованіе для женщины“, 4) Хроника: „По поводу устава артели счетоводовъ“, „Уставъ артели счетоводовъ“, „Русская Лѣтопись“, „Списки несостоятельныхъ должниковъ“, 5) Смѣсь, Фельтоны и пр.

Послѣ ознакомленія съ вышепоименованными статьями намъ показалось, что редакція... ужъ слишкомъ настойчиво хлопочетъ убѣдить всѣхъ и каждого въ необходимости счетоводства, оставляя само счетоводство какъ будто на второмъ планѣ. Говоря такъ много о пользѣ дѣлъ вмѣсто того, чтобы приняться за самое дѣло, нельзя не попасть въ область фразерства, а иногда—можно и совсѣмъ заропортоваться... Напримѣръ въ статьѣ „О потерянномъ миллиардѣ“ страстное желаніе доказать, что Россія теряетъ ежегодно цѣлый миллиардъ (!?) за то, что не хочетъ усвоить правильнаго счетоводства, доводить автора до весьма сранныхъ разсужденій, въ родѣ слѣдующихъ: „Философія спущистилась съ заоблачныхъ высотъ отвлеченного умозрѣнія на почву узкаго позитивизма. Въ области знанія естествовѣдѣніе и прикладныя науки оттеснили на задній планъ всѣ (?) остальные отрасли научнаго мышленія. Въ изящной литературѣ туманные порывы романтизма уступили мѣсто точному протоколу натурализма. Въ живописи властно воцарился пейзажъ, какъ самое яркое выраженіе реалистического духа. Лучшія силы человѣческаго гenія устремились на открытия и изобрѣтенія“ и пр. пр. Все это чушь, конечно, и клевета, въ которой пропаганда рациональнаго счетоводства вовсе не нуждается, и мы серьезно совѣтуемъ редакціи оставить фразы и взяться за свое специальное, обѣщанное читателямъ дѣло, если она дѣйствительно хочетъ его популяризовать.

2) Статьи, касающіяся вопроса о коммерческомъ образованіи, о введеніи счетоводства въ программу учебныхъ заведеній и пр., статьи, которыми мы интересовались наиболѣе, ибо сами держимся того мнѣнія, что преподаваніе основъ счетоводства является въ наше время почти настоятельно необходимостью *),—къ сожалѣнію, не вполнѣ насы удовлетворили. Шаблонно составленные, съ красивыми фразами, но съ ничтожнымъ количествомъ фактовъ, онѣ бы годились скорѣе для любой ежедневной газеты.

3) Вполнѣ неприличный тонъ „фельетоновъ“ новаго журнала, погоня за остроумною бранью по адресу г. Езерскаго и пр., дѣлаютъ „Счетоводство“ еще болѣе похожимъ... на обыкновенную газету, а не на серьезній журналъ.

Было бы очень прискорбно, если бы эти замѣчанія, которыхъ мы сочли себя въ правѣ сдѣлать только потому, что искренне желали бы видѣть новый нашъ специальный журналъ вполнѣ достойнымъ той идеи, которой онъ обѣщалъ служить, не вызвали ничего, кроме полемики въ рубрикѣ „Искры и брызги печати“, (въ рубрикѣ—кстати сказать—даже неумѣстной на столбцахъ специального изданія). Не изъ желанія полемизировать, не въ видахъ отнятія охоты у читателей къ новому журналу, дали мы настоящій, можетъ быть слишкомъ строгій отзывъ, а потому лишь—повторяемъ—что желаемъ Счетоводству возможно большаго распространенія въ русскомъ обществѣ, для возврѣнія въ обильной землѣ нашей порядка, помимо всякихъ званныхъ гостей, а журналу, носящему это название—желаемъ популярности и успѣха, если онъ ихъ заслужить.

III.

*.) См. статью: „О необходимости преподаванія счетоводства въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ“ въ № 33 „Вѣстника“, стр. 193 сем. III

Библіографіческій листокъ.

(Арифметика, алгебра и пр.)

(Окончаніе *).

- W. A. Quitzow.* Praktisches Rechenbuch für Schulen. Theil 2. 18-e Aufl. Lübeck. 1886. (50 Pf.)
- L. Rajola Pescarini.* Rapporti esatti ed approssimati e teoria delle proporzioni. Napoli. 1886.
- H. W. Rathke.* Mathematische Tabellen. Hildburghausen. 1886. (1 M.)
- O. Reichel.* Die Grundlagen der Arithmetik. 1-er Theil. Berlin. 1886. (1 M.)
- F. Reidt.* Anleitung zum mathematischen Unterricht an höheren Schulen. Berlin. 1886. (4 M.)
- M. Ricotti e L. Martorelli.* Elementi di aritmetica e geometria. Torino. 1886. (2,50 L.)
- G. Ritt.* Nueva aritmética para las escuelas primarias. Traducida en castellano y adaptada á las escuelas de la América par C. C. Guzman. 7-a ed. Paris. 1886. (2 fr.)
- G. Roversi e G. Cappelli.* Compendio di aritmetica. Bologna. 1886. (0,35 L.)
- I. A. Sarrasqueiro.* Tratado elementar de arithmetica. 6-a ed. Coimbra. 1886.
- V. G. Scarpa e G. Borgogno.* Lezioni di aritmetica. 46-a ed. Torino 1886. (0,40 L.)
- O. Schlömilch.* Fünfstellige logarithm. und trigonom. Tafeln. 9-e Aufl. Braunschweig. 1886. (1 M.)
- L. Schrön.* Siebenstellige gemeine Logarithmen. 20-e Aufl. Braunschweig. 1886. (2,40 M.)
- H. Schubert.* Sammlung von arithm. und. algebr. Fragen und Aufgaben. 2-e Aufl. Potsdam. 1886. (1,80 M.)
- F. Seele.* Lehrgang für das Rechnen. Heft 5. 2-e Aufl. Berlin. 1886 (40 Pf.)
- Q. Sella.* Teorica e pratica del regolo calcolatore. 2-a ed. Torino. 1886. (2,50 L.)
- F. Servais.* Leçons d'arithmétique. Mons. 1886. (1,75 fr.)
- C. Smith.* Elementary algebra. London. 1886.
- I. H. Smith.* Key to algebra. Part. 1. 5-th ed. London. 1886. (9 sh.)
- T. X. Sleek und I. Bielmanyr.* Lehrbuch der Arithmetik. 9-e Aufl. Kempten. 1886. (1,20 M.)
- A. H. Suptil.* Arithmétique. Paris. 1886.
- G. Taschetti.* Elementi di aritmetica. Palermo. 1886.
- K. Teichman und H. Gross.* Vierstellige mathematische Tafeln. 2-e Aufl. Stuttgart. 1886. (60 Pf.)
- F. Thoman.* Théorie des intérêts composés et des annuités, suivie de tables logarithmiques. Trad. de l'anglais par. M. Bouchard. Paris. 1886. (10 fr.)

*) См. №№ 32 и 34 „Вѣстника“, стр. 183 и 232 сен III.

- W. Thomson. Algebra for the use of schools and colleges. London. 1886.
 R. O. T. Thorpe. Answers to the Oxford and Cambridge questions in algebra. London. 1886. (1 sh. 6 d.)
 C. Vacquant. Principes d'algèbre. 6-e ed. Paris. 1886.
 " Leçons d'algèbre élémentaire. 6-e ed. Paris. 1886.
 F. Wallentin. Maturitätsfragen aus der Mathematik. Wien 1886. (3,60 M.)
 W. Watson. The quarterly arithmetic with answers. London, 1886. (2 sh. 6 d.)
 G. v. Vega. Logarithmisch-trigonometrisches Handbuch; bearb. von C. Bremiker. 69-e Aufl. von F. Tietjen. Berlin. 1886. (4,20 M.)
 Veltmann und O. Koll. Formeln der niedern und höheren Mathematik. Bonn. 1886. (3 M.)
 F. Villieus. Arithmetische Aufgaben. Wien. 1886. (2 M.)
 A. Wilson. The junior student's algebra. Cambridge. 1886. (6 sh.)
 F. Vintéjoux. Cours d'arithmétique et de géométrie. Paris. 1886. (1,50 fr.)
-

Задачи.

№ 277. Возвысить въ квадратъ число 777... Э. К. III.

№ 278. Въ натуральномъ ряду чиселъ отъ 1 до 2310 включительно, сколько есть чиселъ, дѣлящихся порознь на 2, на 3, на 5, на 6, на 7, на 10; на 11, на 14, на 15 и т. д., то есть вообще на D, где D есть дѣлитель числа 2310?

НВ. Требуется найти общую теорему, которая позволить отвѣтить непосредственно на всѣ этого рода вопросы.

Э. К. III.

№ 279. На одной изъ сторонъ прямого угла МОН взята точка А; на другой сторонѣ намѣчены точки В, С и D такъ, что ОА=OB=BC=CD. Доказать, что треугольникъ АВС подобенъ треугольнику АBD.
 А. Гольденбергъ (Спб.).

№ 280. Определить x изъ уравнения:

$$(1-\operatorname{tg}x)(1+\operatorname{Sin}2x)=1+\operatorname{tg}x.$$

З. Архимовичъ (Новозыбковъ).

№ 281. Доказать что радиусы четырехъ окружностей, проходящихъ черезъ каждые три изъ четырехъ центровъ вписанныхъ въ какой нибудь треугольникъ круговъ, равны между собою и равны диаметру круга описанного около того-же треугольника.

З. Колтовский (Харьковъ).

№ 282. Найти площадь четырехугольника по четыремъ сторонамъ a, b, c, d и двумъ диагоналямъ m и n при условіи, что последнія пересекаются не подъ прямымъ угломъ.

Студ. П. Маевский (Кievъ).

№ 283. Показать, что если котангенсы угловъ треугольника составляютъ гармонический рядъ, то тангенсы образуютъ арифметическую

прогрессію, и что тогда площадь треугольника равна тангенсу средняго по величинѣ угла умноженному на произведение отрѣзковъ противолежащей стороны, образованныхъ соотвѣтственной высотой.

A. Войновъ (Харьковъ).

Рѣшенія задачъ.

№ 118. Доказать, что если синусы угловъ треугольника составляютъ ариѳметическую прогрессію, то котангенсы половинъ его угловъ составляютъ тоже ариѳметическую прогрессію.

По условію задачи имѣемъ:

$$\sin A - \sin B = \sin B - \sin C,$$

$$\text{отсюда } 2 \cos\left(\frac{A+B}{2}\right) \sin\left(\frac{A-B}{2}\right) = 2 \cos\left(\frac{B+C}{2}\right) \sin\left(\frac{B-C}{2}\right); \quad (1)$$

такъ какъ $A+B+C=180^\circ$, то:

$$\frac{A+B}{2} = 90^\circ - \frac{C}{2} \quad \text{и} \quad \frac{B+C}{2} = 90^\circ - \frac{A}{2},$$

слѣд. вм. (1) будемъ имѣть:

$$\sin \frac{C}{2} \sin\left(\frac{A-B}{2}\right) = \sin \frac{A}{2} \sin\left(\frac{B-C}{2}\right), \quad (2)$$

или:

$$\sin \frac{A}{2} \sin \frac{C}{2} \cos \frac{B}{2} - \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2} \cos \frac{A}{2} = \sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \cos \frac{C}{2} - \sin \frac{A}{2} \sin \frac{C}{2} \cos \frac{B}{2}.$$

Дѣля обѣ части этого равенства на $\sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2}$ и, замѣнивъ отношение косинуса къ синусу чрезъ котангенсъ, получимъ:

$$2 \operatorname{ctg} \frac{B}{2} = \operatorname{ctg} \frac{C}{2} + \operatorname{ctg} \frac{A}{2}.$$

Это равенство и показываетъ, что котангенсы половинъ угловъ нашего треугольника составляютъ, какъ и синусы его угловъ, ариѳметическую прогрессію.

П. Поповъ (Москва).

Прим. ред. Проще было бы доказать это свойство угловъ, пользуясь формулами:

$$\operatorname{ctg} \frac{A}{2} = \frac{p-a}{r}; \quad \operatorname{ctg} \frac{B}{2} = \frac{p-b}{r}; \quad \operatorname{ctg} \frac{C}{2} = \frac{p-c}{r},$$

гдѣ p есть полупереметръ, а r —радиусъ круга вписанного.

№ 121. Ареометръ Бомэ для жидкости тяжелѣе воды погружается до 66-го дѣленія въ сѣрий кислотѣ, удѣльный вѣсъ которой=1,85. Опре-

дѣлить удѣльный вѣсъ нѣкоторой жидкости, въ которой этотъ ареометръ погружается до 40-го дѣленія.

Назовемъ объемъ ареометра въ единицахъ дѣленія его шкалы чрезъ V_1 при погруженіи до нулевого дѣленія, чрезъ V_2 —до 66-го и наконецъ чрезъ V_3 —до 40-го. Отношеніе между вытѣсненными объемами сѣрной кислоты и воды должно быть обратно пропорціонально отношенію между ихъ плотностями или удѣльными вѣсами; поэтому мы получимъ:

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{1,85}{1}, \text{ или } \frac{V_2 + 66}{V_2} = 1,85.$$

Отсюда $V_2 = 77,65$; тогда $V_1 = V_2 + 66 = 143,65$.

Изъ равенства $V_1 - V_3 = 40$, найдемъ $V_3 = 103,65$. Наконецъ удѣльный вѣсъ нѣкоторой жидкости опредѣлится непосредственно изъ равенства:

$$\frac{V_1}{V_3} = \frac{d}{1}, \text{ или } \frac{143,65}{103,65} = d$$

или $d = 1,38$.

B. Якубовскій (Киевъ).

№ 124. Опредѣлить площадь треугольника по даннымъ угламъ и медіанѣ.

Пусть въ треугольникѣ АВС медіаною стороны ВС будетъ АМ = m .

Изъ геометріи известно, что:

$$AC^2 + AB^2 = \frac{BC^2}{2} + 2m^2. \quad (1)$$

Но:

$$\frac{BC}{AC} = \frac{\sin A}{\sin B} \text{ и } \frac{BC}{AB} = \frac{\sin A}{\sin C}$$

откуда

$$AC = BC \frac{\sin B}{\sin A} \text{ и } AB = BC \frac{\sin C}{\sin A}.$$

Подставляя эти величины вм. АС и АВ въ ур. (1), получимъ не-
полное, квадратное относительно ВС уравненіе, рѣшивъ которое, найдемъ:

$$BC = \sqrt{\frac{4m^2 \cdot \sin^2 A}{2\sin^2 B + 2\sin^2 C - \sin^2 A}}.$$

Обозначая площадь треугольника чрезъ S , находимъ:

$$S = \frac{BC^2 \cdot \sin B \cdot \sin C}{2\sin A},$$


или, замѣнивъ ВС его величиною, получимъ:

$$S = \frac{2m^2 \sin A \sin B \sin C}{2\sin^2 B + 2\sin^2 C - \sin^2 A}.$$

Н. Артемьевъ (Спб.), В. Якубовскій (К.), Н. Шимковичъ (Х.). Ученики: Астр. г. (8) И. К., Тул. г. (7) Н. П.

№ 177. Данъ кругъ и на немъ точка; при помощи циркуля, не употребляя линейки, найти точку, принадлежащую касательной, касающейся данного круга въ данной точкѣ.

Фиг. 13.



Пусть А данная точка на окружности. Отложивъ на окружности дуги АВ и ВС, равныя (каждая) 60° , описываемъ изъ А и С дуги радиусомъ равнымъ АС. Дуги эти пересѣкутся въ точкѣ Д. АД есть касательная. Въ самомъ дѣлѣ, въ треугольникѣ АОС уголъ АОС = 120° , а уголъ ОАС = ОСА = 30° ; въ треугольникѣ же АСД уголъ САД = 60° , ибо этотъ треугольникъ равносторонній. Значить:

$$\text{OAD} = \text{OAC} + \text{CAD} = 30^\circ + 60^\circ = 90^\circ.$$

Слѣд. АД есть касательная къ кругу въ точкѣ А.

М. Кузьменко (Сл. Бѣл.), *П. Алтуниджи* (Р. на Дону), *И. Маховъ* (Х.), *С. Блажко* (См.), *А. Бобянинский* (Ел. зол. пр.) *Н. Шимковичъ* (Х.), *В. Каинъ* (Одесса). Ученики: Курек г. (5) *В. Х.*, (6) *А. П.*, *В. Б.*, *В. Л.*, *В. Е.*, *Л.—овъ*, (7) *Н. К.*, (8) *І. Ч.*, Сыз. р. уч. (?) *К.—овъ*, Черн. г. (6) *С. П.*, *Д. З.*, Ив. Возн. р. уч (?) *А. Б.*, Симб. к. к. (6) *Н. Я.*, *Н. Л.*, (7) *А. А.*, Тиф. р. уч. (7) *М. К.*, Елат. г. (7) *В. Н.*, Нов.-Сѣв., (?) *Н. Х.* Уфим. г. (6) *А. Э.*, Перм. г. (6) *Н. Г.*, Астр. г. (8) *И. К.*

№ 194. По данной большей сторонѣ a параллелограмма вычислить меньшую сторону и диагонали, если известно, что меньшая диагональ перпендикулярна меньшей сторонѣ, и острый уголъ параллелограмма равенъ 30° .

Пусть въ параллелограммѣ ABCD диагональ BD будетъ перпендикулярна меньшей сторонѣ DC и уголъ BCD = 30° . Тѣмъ или другимъ способомъ легко найти, что $BD = \frac{a}{2}$. Тогда $DC = \sqrt{BC^2 - BD^2}$ или, послѣ подстановки, $DC = \frac{a}{2}\sqrt{3}$. Большая диагональ AC опредѣлится по известной геометрической формулы:

$$AC^2 + BD^2 = 2(DC^2 + BC^2).$$

Отсюда послѣ подстановки находимъ:

$$AC = \frac{a}{2}\sqrt{13}.$$

С. Блажко (См.), *Н. Артемьевъ* (Сиб.), *Н. Шимковичъ* (Х.), *Я. Тепляковъ* (К.). Ученики: Курек. г. (5) *В. Ход.*, (6) *В. Е.*, (6) *Т. Шат.*, *Л.—овъ*, (8) *І. Ч.*, Черн. г. (6) *В. М.*, Тул. г. (7) *Н. Изв.*, Мог.-Под. р. уч. (6) *А. Черв.*, Никол. г. (8) *А. В.*, Киев. I (7) *В. Б.*, Уфим. г. (6) *А. Э.*, Нов.-Сѣв. г. (7) *С. В.*, (8) *А. Ч.*, Н. Н., Ворошиловск. (?) *В. Х.*, Перм. г. (6) *Н. Г.*, Тифл. р. уч. (6) *Н. П.*, (7) *М. К.*, Новоз. р. уч. *М. Б.*, Кам.-Под. (8) *А. Я.*, Екатериносл. г. (8) *А. В.*, Астр. г. (8) *И. К.*

Н.В. У ученика Новоз. р. уч въ решеніи ошибки.

Редакторъ-Издатель **Э. К. Шпачинскій**.

Дозволено цензурою. Кіевъ, 3 марта 1888 года.

Типографія И. Н. Кушнерева и Ко, Елисаветинская улица, домъ Михельсона.

ИЗДАНІЯ БЫВШЕЙ РЕДАКЦІИ
„ЖУРНАЛА ЭЛЕМЕНТАРНОЙ МАТЕМАТИКИ“,

основанного въ 1884 г. Проф. В. ЕРМАКОВЫМЪ:

	Цѣна съ пер.
1) Комплектъ 18-и №№ „Журн. Эл. Мат.“ за 1884/5 уч. г. 4 р. 40 коп.	40
2) Комплектъ 18-и №№ „Журн. Эл. Мат.“ за 1885/6 уч. г. 4 „ 40 „	40 „
3) Основы ариѳм. Е. Коссака. Пер. И. Красовскаю. 1885 г.—	55 „
4) Рѣчь Клаузіуса „Связь между великими дѣятелями природы“ Пер. И. Красовскаю. 1885 г. —	25 „
5) Вопросы о наибольшихъ и наименьшихъ величинахъ, решаемые посредствомъ уравненій 2-ой ст. Брю. Пер. И. Красовскаю. 1886 г. —	45 „
6) Электрические аккумуляторы. Э. Шначинскаю. 1886 г.—	55 „

ИЗДАНІЯ РЕДАКЦІИ

„ВѢСТНИКА ОП. ФИЗИКИ и ЭЛЕМ. МАТЕМАТИКИ“

ВЪ ХРОНОЛОГИЧЕСКОМЪ ПОРЯДКѦ:

1) Ортоцентрический треугольникъ. Н. Шимковича. 1886 г.—	15 „
2) Ученіе о логарифмахъ въ нов. излож. В. Морозова. 1886 г.—	15 „
3) Выводъ формулы для разложенія въ рядъ логарифмовъ. Г. Флоринскаю. 1886 г. —	15 „
4) Комплектъ 12-и №№ „Вѣстн. Оп. Физ. и Эл. Мат.“ (сброшюр. въ книгу) за 1-ое полугодіе 1886/7 уч. г. (I-й семестръ). 2 „ 50 „	50 „
5) Однадцатая аксиома Эвклида. Пр. В. Ермакова. 1887 г. РАСПРОДАНО.	
6) Солнце. Составилъ по Секки и др. источникамъ. Н. Конопацкій. 1887 г. —	РАСПРОДАНО.
7) Методы рѣшеній ариѳмет. задачъ съ приложеніемъ 50 тип. задачъ. И. Александрова. 1887 г. —	РАСПРОДАНО.
8) Комплектъ 12 №№ „Вѣстн. Оп. Физ. и Эл. Мат.“ (сброшюр. въ книгу) за 2-ое полугодіе 1886/7 уч. г. (II-й семестръ). 2 „ 50 „	50 „
9) О землетрясеніяхъ. Э. Шначинскаю. (въ пользу жителей города Вѣрнаго) 1887 г. —	50 „
10) Определение теплоемкости тѣла по способу смыщенія при постоянной температурѣ. Пр. Н. Гезехуса. 1887 г. . —	5 „
11) Простой способъ определенія высоты плотныхъ кучевыхъ облаковъ. Г. Вульфа. 1887 г. —	5 „
12) Формула простого маятника. Элем. геометрическій и точный выводъ ея. Пр. Н. Случинова. 1887 г. —	5 „
13) Методы рѣшеній ариѳм. задачъ съ приложеніемъ 65 тип. задачъ. И. Александрова. Издание 2-ое пересм. и дополненное. 1887 г. —	35 „
14) Изъ исторіи ариѳметики. Умноженіе и дѣленіе. И. Клейбера. 1888 г. —	20 „
15) Комплектъ 12 №№ „Вѣстн. Оп. Физ. и Эл. Мат.“ (сброшюр. въ книгу) за 1-ое полугодіе 1887/8 уч. г. (III-й семестръ) 2 „ 50 „	50 „
16) О формулѣ $P=MG$, съ приложеніемъ 26 задачъ. Пр. О. Хволльсона. 1888 г. —	20 „
17) Объ обратныхъ изображеніяхъ на сѣтчатой оболочкѣ глаза. О. Страуса. 1888 г. —	5 „

ВЪ КНИЖНЫЙ СКЛАДЪ РЕДАКЦИИ
ВѢСТНИКА ОП. ФИЗИКИ и ЭЛ. МАТЕМАТИКИ
ПОСТУПИЛИ ДЛЯ ПРОДАЖИ

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ КНИЖНАГО МАГАЗИНА Д. Н. ПОЛУЭХТОВА:

1) **Основной курсъ Аналитической Геометріи.**
СОСТАВИЛЬ

К. А. АНДРЕЕВЪ.

Орд. проф. Имп. Харьков. Унив., Членъ-корреспондентъ Имп. Акад. Наукъ.

ЧАСТЬ I. ГЕОМЕТРІЯ НА ПЛОСКОСТИ.

Цѣна 2 р., съ перес. 2 р. 20 коп.

ХАРЬКОВЪ. 1887.

2) **КРАТКІЙ КУРСЪ ВЫСШЕЙ АЛГЕБРЫ.**
СОСТАВЛЕННЫЙ

М. ТИХОМАНДРИЦКІМЪ.

Докторомъ математики, экстраорд. проф. Имп. Харьковскаго Унив. и препод.
Харьк. Практ. Технологического Института.

Цѣна 2 руб. 50 коп., съ пересылкой 2 р. 75 коп.

ХАРЬКОВЪ. 1887.

3) **НАЧАЛА НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРІИ**
съ приложеніемъ

ЧЕРЧЕНИЯ КРИВЫХЪ.

(Курсъ реальныхъ училищъ).

2-е ИСПРАВЛЕННОЕ ИЗДАНІЕ.

Составилъ А. Н. ПАЛЬШАУ.

Цѣна 1 р. 35 к. съ пер. 1 р. 50 к.

ХАРЬКОВЪ. 1886.

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ.

ВО ВСѢХЪ ИЗВѢСТНЫХЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ ПОСТУПИЛА
ВЪ ПРОДАЖУ

ЭЛЕМЕНТАРНАЯ АЛГЕБРА.

СОСТАВИЛЬ

А. КИСЕЛЕВЪ.

Часть I, содержащая курсы 3-го и 4-го классовъ гимназій.

Цѣна 70 коп.

МОСКВА. 1888.