

Обложка  
ищется

Обложка  
ищется

# ВѢСТИНИКЪ ОПЫТНОЙ ФИЗИКИ ЭЛЕМЕНТАРНОЙ МАТЕМАТИКИ.

XIV Сем. № 164. № 8.

**Содержание:** Заявление редакции.—Старое и новое о некоторыхъ простыхъ физическихъ явленіяхъ. Засл. проф. Н. Е. Любимова. Отвѣтъ на тему № 4. А. Ефимеева.—Нѣсколько словъ по поводу открываемыхъ въ Одессѣ физико-математическихъ курсовъ. М. Попруженко.—Научная хроника. В. Г.—Разныя извѣстія.—Задачи № № 477—483.—Рѣшенія задачъ (2 сер.). № № 361, 362, 363, 364, 365 и 366.—Справ. табл. № XV.—Библиографический листокъ новѣйшихъ русскихъ изданий.—Библиографический листокъ новѣйшихъ нѣмецкихъ изданий.

## Заявленіе редакціи.

БИБЛИО

«81 № 11. Адреса для корреспонденціи: «Редакция журнала „Вѣстникъ физики“ № 11». Редакторъ: щ. Комм.

Просвеще

Лічнинъ III. Я. В. академії Н.-готыкъ

Стремясь давно къ удовлетворенію одной изъ потребностей нашихъ школьніхъ сферъ и возникающему уже въ Россіи спросу на любительскіе физические кабинеты и лабораторіи, редакція «Вѣстника Опытной Физики», покончивъ съ хлопотами, вызванными перенесенiemъ изданія изъ Кіева въ Одессу, считаетъ возможнымъ приступить теперь къ осуществленію намѣченной цѣли, и симъ заявляетъ, что, ради облегченія своимъ подписчикамъ и читателямъ приобрѣтенія физическихъ приборовъ и принадлежностей, годныхъ какъ для физическихъ кабинетовъ учебныхъ заведеній, такъ и для специалистовъ и любителей, она вошла въ сношенія съ вновь открытой въ Одессѣ

## МАСТЕРСКОЙ ФИЗИЧЕСКИХЪ ПРИБОРОВЪ

кандидата физико-математическихъ наукъ

**Н. Завадского и Ко.**

и впредь будетъ принимать заказы на всевозможные приборы и принадлежности, въ этой мастерской изготавляемые, по общедоступнымъ пѣнамъ, указаннымъ въ каталогахъ, которые послѣдовательно будутъ помѣщены на обложкахъ журнала, начиная съ настоящаго № 164.

Полный каталогъ будетъ въ свое время разосланъ всѣмъ подписчикамъ въ видѣ приложения.

При изготавлении типическихъ приборовъ, предназначенныхъ для физическихъ кабинетовъ среднихъ учебныхъ заведеній, мастерская будетъ руководствоваться результатами трудовъ комиссій, составленной

изъ членовъ Новороссійскаго Физико-Математическаго Общества для всесторонняго обсужденія вопроса о составѣ нормальныхъ физическихъ кабинетовъ, подъ предсѣдательствомъ профессора ѡ. Н. Шведова.

Труды упомянутой комиссіи будуть своевременно опубликованы въ «Вѣстнике Оп. Физики».

Всѣ подпісчики «Вѣстника Оп. Физики» (какъ вносящіе полную подпісную плату — 6 руб., такъ и мѣготные — 4 руб.) пользуются при заказахъ уступкою 5% съ цѣнъ, указанныхъ въ каталогахъ.

Заказы отъ учебныхъ заведеній исполняются согласно официальному заявленію начальниковъ сихъ заведеній. Заказы отъ частныхъ лицъ исполняются по полученню отъ нихъ не менѣе половины стоймости заказа впередъ.

Укупорка и пересылка считаются по дѣйствительной стоймости.

Починка физическихъ приборовъ и обмѣнъ испорченныхъ на новые производится по соглашенію.

При специальныхъ заказахъ на изготошеніе приборовъ, въ каталогахъ не поименованныхъ, должны быть точно указаны размѣры и приложены пояснительные чертежи и рисунки.

При запросахъ, требующихъ отвѣта, должна быть прилагаема почтовая марка.

Вмѣстѣ съ симъ редакція «Вѣстника Оп. Физики» заявляетъ о перемѣнѣ своего прежняго городскаго адреса: «Нѣжинская № 18» на новый: «Княжеская № 11». Адресъ для корреспонденціи остается прежній: „1. Одесса, Редакція Вѣстника Оп. Физики“.

Редакторъ-Издатель ѡ. К. Шпачинскій.

**Старое и новое о некоторыхъ простѣйшихъ физическихъ явленіяхъ<sup>\*)</sup>**  
**ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА.**

**Глава первая.**

*Старое.*

**МАСТЕРСКОНЪ ПІДНОПОРЪ**

Въ курсахъ и трактатахъ физики, не только краткихъ, но и обширныхъ, можно замѣтить почти пренебрежительное, и во всякомъ случаѣ крайне невнимательное отношеніе къ истории этой науки. Послѣдствіемъ является пренебреженіе, въ погонѣ за новизною, къ вопросамъ, которые по элементарности своей кажутся исчерпанными, общезвестными, утратившими интересъ, какой имѣли въ своемъ прошломъ. Это, по мнѣнію моему, болѣшой недостатокъ, вліающій и на общее образо-

(\*) Настоящая статья засл. проф. Любимова, предназначенная для «Журнала Мин. Нар. Проб.», печатается, съ согласія автора, въ нашемъ журнале съ нѣкоторыми сокращеніями, соотвѣтственно сдѣланному имъ сообщенію въ засѣданіи Мат. Отд. Новороссійскаго Общества Естествоиспытателей 14 Мая 1893 года. Прил. ред.

ваніє молодихъ людейъ изъ которыхъ должны выработаться будущіе физики. Цѣль, къ которой стремится каждый изъ лѣдователей, есть открытие въ области-лифактовъ или въ области теоріи и системы — чего-либо новаго, оставшагося нѣизвѣстнымъ предшественникамъ. Но научить дѣлать открытия нельзѧ. Открытия достигаются разнообразными путями и для нихъ нѣтъ предустановленной логики. И однако логика эта есть: она вся въ ихъ исторії. И ничто такъ не поучительно въ исканіи новыхъ умозаключеній, какъ близкое знакомство съ умозаключеніями прошлаго, чрезъ который создался научный капиталъ, нынѣ находящійся въ владаніи человѣчества. Знаменитый академикъ Беръ въ своей автобіографии указавъ на то обстоятельство, что геніальная способность великихъ ученыхъ нововведенія обнаруживается уже въ молодости — около 25 лѣтъ; — замѣчаетъ вмѣсть съ тѣмъ, что геніальность эта выражается главнымъ образомъ въ проницательной способности усматривать лакуны, пробѣлы въ наукахъ, которыхъ надлежить и можно пополнить новыми изысканіями. Но именно чрезъ историческое знаніе движенія науки, болѣе чѣмъ чрезъ что-либо, достигаетсяширина воззрѣнія, позволяющая усматривать разрешенное и не разрешенное, возбужденное, задуманное, оставленное. Историческое знаніе освобождается отъ рутинъ заучиванія на память и отъ близорукаго пониманія, помощью которыхъ главнымъ образомъ дусвояется догматическое изложеніе и полежій науки въ нынѣшнемъ состояніи, и чрезъ которыхъ поражается некритическое отношение къ дѣлу. Иорутина памяти, то-есть заучивание чрезъ простое повтореніе, и уразумѣніе дѣла на ближнемъ разстояніи, необходимы, но ограничить себя тихъ стѣною значить отказатьться отъ производительности творческаго размышенія. А переходи чрезъ нее, не зная прошлаго, можно открыть Америку, не догадываясь, что она открыта.

Что касается общаго естественно-исторического образованія, то здѣсь пренебреженіе исторіей ведетъ къ результату, который можно назвать печальнымъ. Чрезъ умъ учащагося не проводятся величайшія умозаключенія, доставшія богатства современнаго знанія. Воспитательная для ума сила естествоідѣнія, заключающаяся въ школѣ опыта (школа эта въ смыслѣ экспериментальныхъ методическихъ занятій самихъ учащихся находится едва въ зародышѣ), логикъ открытій и логикъ доказательствъ остается безъ примѣненій. Укажу разлѣкій примѣръ. Всеобщее тяготѣніе Ньютона есть величайшее изъ открытий. Гдѣ же унасъ учащійся знакомится съ тѣми посылками, чрезъ которыхъ ученіе это достигнуто и безъ знанія которыхъ нельзѧ и уразумѣть научного значенія ньютоніанскаго притяженія въ смыслѣ дѣйствія на разстояніи, составляющаго основу всей нынѣшней механики природы. Въ гимназическомъ преподаваніи физики оно обыкновенно не вводится. Въ курсѣ хеміографіи, на которую едва отдаляется до послѣдняго времени одинъ урокъ въ полугодіе въ іоі-годѣніи классъ, о немъ упоминается почти мимоходомъ. Въ университѣтскомъ курсѣ на отдѣленіи естественныхъ наукъ астрономія не преподается. Такимъ образомъ, возможно, что молодой естествоиспытатель можетъ быть геологъ, — не говоря уже о медикѣ, — окончивъ университетскій курсъ, если самъ не по完全不同ъ пробѣла, соѣтствідѣніями построениію вселенной, мало превышающими свѣ-

дѣнія гимназиста второго класса, выучившаго начатки географіи. Даже въ курсахъ астрономіи на математическомъ отдѣлении иногда законъ Ньютона принимается какъ известный гизъ физики и не выводится. Такъ поступлено, напримѣръ, въ довольно обширномъ курсѣ астрономіи, изданномъ однимъ изъ провинціальныхъ профессоровъ этой науки. Въ умѣ учащагося возвигается зданіе не имѣющее фундамента.

Въ послѣднее время пренебреженіе къ исторіи науки начинаетъ, впрочемъ, уменьшаться. Въ Германіи вышло и нѣсколько почтенныхъ трактатовъ по исторіи физики; появляются въ переводахъ изданія классиковъ естествовѣдѣнія, какъ напримѣръ, нѣкоторыя сочиненія Галилея. Мимоходомъ позволю себѣ замѣтить, что уже двадцать лѣтъ тому назадъ, при составленіи моего курса физики, я имѣлъ въ виду дать надлежащее мѣсто историческому элементу въ учебномъ изложеніи науки. Трудъ мой не нашелъ оцѣнки, или, если и нашелъ, то развѣ между учащимися — кому изъ нихъ случалось имѣть его въ рукахъ, находившимъ способъ изложения легко понимаемымъ интереснымъ.

Тѣсно связанное съ пренебреженіемъ исторіи недостаточное вниманіе къ изложению элементарныхъ частей, какъ общезнѣпѣтныхъ, не довольно возбуждающихъ интересъ въ излагающемъ рѣчь о свою очередь, важный недостатокъ. Въ томъ, что представляется и повидимому исчерпаннымъ и слишкомъ изѣпѣтнымъ, но рѣдко обнаруживаются астороны неожиданные, ставящія въ новомъ свѣтѣ то, что казалось перезнѣпѣтнымъ. Элементарные части суть основа науки. Для начинающаго то же неоткрыта еще Америка. Его умъ долженъ внимательно и долго останавливаться на элементахъ, чтобы ихъ дѣйствительно усвоить себѣ. Если перескочить чрезъ нихъ, то все знаніе будетъ неосновательное. Самое трудное дѣло не развитіе доказательствъ, а уразумѣніе сути дѣла, усвоеніе началь. Вообще, убѣжденный способъ составленія учениковъ чрезъ переписку рутинныхъ вещей и перефразировку трехъ, четырехъ новыхъ книжекъ въ ту форму, въ какой содержаніе ихъ уложилось въ головѣ составителя, безъ всякой связи съ первоисточниками, главнымъ образомъ происходитъ отъ незнакомства съ исторіею науки, лишающаго составителей ширину и свободы воззрѣнія. Относительно рутинной переписки припомню указанную мною въ семидесятыхъ годахъ грубую ошибку, въ ученіи о галилеевой трубкѣ, возникшую изъ перевиранія одного изъ положеній Ламберта, (опредѣльвшаго поле зрѣнія трубки подъ условiemъ одинакой яркости при зрѣніи чрезъ трубку и простымъ глазомъ (*Nouv. Mém. de L'Acad. de Berlin, 1771*) и стоять переходившую изъ книги въ книгу.

## II.

Пренебреженіе къ исторіи въ вопросѣ, составляющемъ предметъ настоящей статьи, выразилось весьма оригинальнымъ образомъ. Тогда какъ обыкновенно историческая свѣдѣнія опускаются, главу объ атмосферномъ давлѣніи, какъ исключение, принято было излагать исторически. Весьма обычно начинать разсказомъ о флорентийскомъ насосѣ, показанномъ Галилею, и приводить опытъ Торричелли, какъ наиболѣе элементарное доказательство давлѣнія атмосферного воздуха. Но тутъ уже исторія наказала за испытываемое пренебреженіе. Уступленная

ей глава оказалась именно тою, где историческое изложение наименее пригодно для ясного усвоения предмета, такъ какъ исторія въ этомъ вопросѣ шла весьма непрямымъ путемъ, и то путь Торричелли, который долженъ быть элементарно доказательнымъ для учениковъ, ученымъ его времени вовсе не представлялся, какъ доказывающій давленіе воздуха. Въ новыхъ руководствахъ и обыкновенно предполагаются главу о давленіи воздуха начинать съ болѣе наглядныхъ опытовъ, какъ прорываніе пузыря, магдебургскія полушарія и т. д., требующихъ для производства своего воздушного насоса. Тутъ свое неудобство: воздушный насосъ еще неизвѣстенъ учащемуся, такъ какъ не быть и не мочь еще быть объясненъ. Какъ можно устранить этого неудобства, увидимъ ниже, а теперь перейдемъ къ указанію неточностей въ историческомъ изложении ученія о давленіи воздуха.

Въ классическомъ сочиненіи Бюо *"Traité de physique expérimentale et mathématique"* (1816, Г. I, 69) читаемъ: „Однажды флорентинские колодезники, постробивъ очень длинный насосъ съ намѣреніемъ поднять воду на болѣе значительную высоту, чѣмъ какъ дѣжалось прежде, замѣтили, что вода поднялась въ насосъ на высоту около 32-хъ футовъ, но рѣшительно не хотѣла подняться выше, сколько бы ни продолжали качать. Удивленные этимъ обстоятельствомъ, они пошли посовѣтovаться съ Галилео, который сказалъ имъ, подсматриваясь надъ ними (*en se moquant d'eux*), что, по видимому, природа боится пустоты только до высоты 32 футовъ! Философъ уже усматривалъ, что это явленіе, какъ подобныя ему, было простымъ въ механическомъ послѣдствиемъ тяжести воздуха. Но вѣроятно онъ не установилъ еще своихъ идей о столбѣ новомъ и тогда предпочелъ спасовать предъ колодезниками, чѣмъ рискуя сообщить свой секретъ. Опять и умеръ, не сдѣлавъ его извѣстнымъ“.

Пулье въ своемъ курсѣ физики (7-ое изд. Paris 1856, I, III), разсказавъ случай съ флорентинскимъ насосомъ, замѣчаетъ: „въ ту эпоху поднятіе жидкости объясняли тѣмъ, что природа боится пустоты и толкаетъ жидкость, чтобы таковую пополнить. Но объясненіе помощью тайныхъ причинъ (*causes occultes*) не было изъ такихъ, какими могъ бы удовлетвориться Галилей: „Какъ только онъ узналъ о фактѣ, замѣченномъ колодезниками, обѣ предположилъ, что истинная его причина есть тяжесть воздуха“. Все это исторически не точно, Галилей объяснялъ явленіе поднятіемъ жидкости въ насосѣ не тяжестью воздуха (хотя изъ опыта зналъ, что воздухъ имѣетъ вѣсъ), а боязнь пустоты и вовсе не вѣштуя считать боязнь этой силы, имѣющею опредѣленный предѣлъ. Разсказъ о случайнѣи насосомъ переданъ самимъ Галилеемъ въ „Разговорахъ о механическихъ ученіяхъ“. Вотъ что говорить въ первый день Разговоровъ одинъ изъ собесѣдниковъ\*).

„Следѣдо. Я радъ, что бесѣда наша позволяетъ мнѣ найти причину одного явленія, которое долгое время казалось мнѣ чудеснымъ и необъяснимымъ. Я видѣлъ разъ листерну, въ которой, чтобы доставать

\*) „Discorsi e demonstrazioni matemathice intorno a due piuocie scienze“.

Въ 1890 году вышелъ нѣмецкий переводъ „Разговоровъ“ сдѣланный проф. Эттингенъ въ изданіи: „Ostwald's Klassiker der exacten Wissenschaften“.

изъ нея воду, поставили насосъ, думая, оно напрасно, въсъ меньшимъ трудомъ подымать та же или большее количество воды, чмъ обыкновенными ведрами. Насосъ этотъ имѣлъ свой поршень и клапанъ сверху, такъ что вода подымалась притяженiemъ (всасываниемъ), а не нагнетаниемъ, какъ бываетъ въ насосахъ, у которыхъ приборъ оснizu<sup>\*)</sup>. Насосъ, пока вода въ цистернѣ стояла на определенной высотѣ, гтянула обильно; но когда вода опускалась ниже известного предѣла, не действовала болѣе. Я подумалъ, когда въ первый разъ увидѣлъ такой случай, что механизмъ былъ испорченъ и когда нашелъ мастера, чтобы его исправить, то онъ сказалъ мнѣ, что тутъ есть никакого недостатка, и причина въ водѣ, которая, опустивши съ слишкомъ ензико, не выноситъ поднятія на такую высоту, и онъ прибавилъ мнѣ, что ни насосы сами, ни иною какою машиной, которая бы подымала воду притяженiemъ, невозможно заставить ее подняться и на волость болѣе 18 приблизительно локтей (около 10 метровъ). Будетъ ли насосъ широкий или узкий — это въ всякомъ случаѣ предѣль высоты "чтоопъ винцедокъ эко".  
 „До сихъ поръ я не догадывался, что, подобно тому какъ веревка, деревянный шестъ или жестяной шруть, будучи болѣе и болѣе удлинены, могутъ быть доведены до такой длины, что наконецъ ихъ разорвать собственный вихъ въесь, съ еще большей легкостью тоже можетъ случиться со столбомъ воды. Ибо, что иное притягивается въ насосъ, какъ не цилиндръ воды, который имѣеть прикрепленіе сверху и, удлиняясь болѣе и болѣе, наконецъ доходитъ до того предѣла, далѣе котораго уже разрывается своимъ вѣскомъ, какъ если бы токъ была веревка“.  
 Чрезъ нѣсколько лѣтъ („Разговоры“ появились въ 1638 году, опытъ Торричелли сдѣланъ въ 1643 г.), Торричелли придумалъ свой опытъ надъ поднятіемъ въ трубкѣ ртути въместо воды. И замѣтательная вещь! Экспериментальный-средства и привыкающихъ опытомъ были такъ мало распространены въ ту эпоху, что задумавъ опытъ, для осуществленія котораго таъ немнога, требуется: стеклянная трубка, пашка и нѣсколько ртуты. Торричелли самъ его не исполнилъ, а, какъ сказано въ предисловіи къ его аченіямъ „Lezioni Academiche“ въ Florence, 1715), „сообщилъ свои соображенія Винченцо Вивіани, который отбылъ первый, кто сдѣлалъ этотъ важный опытъ и могъ ясно видѣть удивительное явленіе, предсказанное Торричелли“; и самъ Торричелли понималъ истинную причину явленія. Въ июнь 1644 года въонъ написалъ своему другу и ученику Риччи въ Римъ: „Я разсуждаю такъ: если я усматриваю явную причину сопротивленія испытываемаго, когда хочу сдѣлать пустоту, то безполезно, кажется мнѣ, приписывать пустотѣ действие, очевидно происходящее отъ иной причины. Сдѣлавъ нѣкоторыя весьма нетрудныя вычислениа, я нахожу, что причина, которой говорю, а  
 \*) Заслуживаетъ вниманія это указаніе Галилея. У наст., какъ и всюду въ учебникахъ физики трактуетъ о насосѣ Галилея. Но не задается вопроса, какое было устройство этого насоса. Естественно, что учащійся представляетъ себѣ этотъ инструментъ въ той формѣ, какъ насосъ употребляется въ нашихъ колодцахъ. Но наши насосы изъ глубокихъ колодцевъ нѣрѣдко поднимаютъ воду выше 32 футовъ. Что же знать, что насосамъ нельзѧ поднять воду выше этого предѣла? Наши насосы изъ высокаго древеснаго ствола съ длиннымъ поршнемъ и примитивными кожанными клапанами, нигдѣ, кажется, даже и не описаны.

именно въесь воздуха, долженъ одинъ произвести больше дѣйствія, чѣмъ какое испытываемъ, стремясь произвести пустоту". Въ томъ же письмѣ Торричелли описываетъ опытъ, забываемый въ курсахъ физики, но имѣющій существенное значеніе. (Я не повиненъ: въ моемъ курсѣ опытъ приведенъ). Чашку, куда опущена барометрическая трубка, Торричелли наполнялъ поверхъ ртути водою, и трубку мало по малу подымалъ. Когда отверстіе трубки достигало воды ртуть опускалась и вода стремительно наполняла трубку всю, не оставляя вверху пустоты. Риччи, отвѣчая на письмо Торричелли, признавалъ, что опытъ побѣдоносно доказываетъ возможность пустоты въ природѣ, но принять объясненіе Торричелли не рѣшался, усматривая разныя трудности. Если закрыть чашку крышкою, ртуть не понижается въ трубкѣ, хотя надъ ртутью нѣтъ колоннъ воздуха, которая бы давила своимъ вѣсомъ. Если, закрывъ отверстіе ручного насоса (seringue), тянуть поршень, то будетъ одинаково трудно какъ бы ни помѣстить насосъ: идеть ли поршень кверху, имѣя надъ собою колонну воздуха, или идеть книзу, когда такой колонны нѣтъ. Эти возраженія Риччи указываютъ, что представленія объ упругости воздуха и о распространеніи давленія у него не было. Такъ было не съ однимъ Риччи. Вообще представленіе давленія воздуха въ видѣ груза, сверху лежащаго и давящаго внизъ чрезвычайно препятствовало правильному воззрѣнію на атмосферное давленіе. Нерѣдко и нынѣ представленіе это не достаточно разъясняется учащимся.

Проф. Н. Любимовъ.


(Продолженіе слѣдуетъ).

**Отвѣтъ на тему № 4, предложенную въ № 31, "Вѣстника Опытной Физики и Элементарной Математики" за 1887 годъ\*).**

Пусть АВС будеъ данный треугольникъ, стороны которого  $a, b, c$ . Точка О пусть будеъ центръ круга, описанного около этого треугольника (фиг. 41). Задача заключается въ томъ, чтобы черезъ вершину В данного треугольника провести скьющую, длина которой бы была средней пропорциональной между отвѣзками основанія AD и DC. Для рѣшенія задачи описываемъ на OB, какъ на диаметрѣ, окружность. Если эта окружность пересѣчетъ сторону  $b$  въ точкахъ D и  $D'$ , то скьющія  $BD$  и  $BD'$  будутъ искомыя.

Въ самомъ дѣлѣ

$$BD = DE, \text{ а } BD \cdot DE = AD \cdot DC,$$



Фиг. 41.

$BD = DE$ , а  $BD \cdot DE = AD \cdot DC$ , отсюда  $BD^2 = AD \cdot DC$ .


То же можно сказать и относительно другой скьющей  $BD'$  (это означаетъ что это скьюща, длина которой равна средней пропорциональной между отвѣзками основанія  $AD$  и  $DC$ ). Тема № 4 была предложена въ следующей формѣ. Показать, что возможность проведения черезъ вершину В данного треугольника скьющей  $BD$ , длина которой

Теперь изследуем нашу задачу, поставить своею целью отыскать такую зависимость между сторонами  $a$ ,  $b$  и  $c$ , которою обусловливается возможность проведения искомой съкущей.

Угол  $B$  въ треугольнике  $ABC$  можетъ быть тупымъ, прямымъ и острымъ.

Рассмотримъ простейшій случай, когда угол  $B=90^\circ$ .

Въ этомъ случаѣ сторона  $b$  должна проходить черезъ центръ  $O$  и служить диаметромъ этого круга (фиг. 42). Слѣдовательно, сторона  $b$  можетъ или пересѣкать кругъ, описанный на  $OB$ , или касаться къ нему въ точкѣ  $O$ .



Во всякомъ случаѣ

$$b^2 = a^2 + c^2 \text{ и } a^2 + c^2 \geq 2ac, \text{ откуда } b^2 - 2ac \geq 0.$$

Фиг. 42. Придадимъ къ лѣвой части этого неравенства нуль въ формѣ:  $b^2 - a^2 - c^2$  и разложимъ ее на множители; получимъ

$$(b\sqrt{2} + a + c)(b\sqrt{2} - a - c) \geq 0.$$

Такъ какъ множитель  $b\sqrt{2} + a + c$  положительный, то, слѣдовательно, и другой множитель долженъ быть положительнымъ, т. е.

$$b\sqrt{2} - a - c \geq 0 \text{ или } b\sqrt{2} \geq a + c.$$

Такова искомая зависимость. Мы видимъ, что задача допускаеть два рѣшенія, когда изъ двухъ знаковъ  $\geqslant$  имѣть мѣсто верхній, и одно рѣшеніе, когда нижній. Не трудно понять, что въ этомъ послѣднемъ случаѣ треугольникъ будетъ равнобедренный и сторона  $b$  будетъ касаться круга  $O'$ .

Все сказанное относится къ тому случаю, когда сторона  $b$  проходитъ черезъ  $O$ ; если же сторона  $b$  не будетъ проходить черезъ центръ  $O$ , то она должна пересѣкать или самый радиусъ  $OB$ , или его продолженіе.

Въ томъ случаѣ, когда сторона  $b$  пересѣкаетъ радиусъ  $OB$  — угол  $B$  долженъ быть тупымъ; если же сторона  $b$  пересѣкаетъ продолженіе радиуса  $OB$  или совсѣмъ его не пересѣкаетъ, то угол  $B < 90^\circ$ .

была бы средио пропорциональной между отрѣзками основанія  $AD$  и  $DC$  (см. рѣшеніе задачи № 66 въ № 31 „Вѣстника“ стр. 163) сводится къ условію

$$b\sqrt{2} \geq a + c.$$

Рассмотрѣть случаи: 1)  $\angle B > 90^\circ$ , 2)  $\angle B = 90^\circ$  и 3)  $\angle B < 90^\circ$  и въ этомъ послѣднемъ случаѣ найти предельное значение (minimum) для угла  $B$ , при которомъ проведение такой съкущей возможно.

Показать, что кромѣ внутренней съкущей (одной или двухъ) можетъ быть еще проведена виѣшняя съкущая (отъ вершины до пересѣченія съ продолженнымъ основаніемъ), удовлетворяющая условію, и разъяснить тотъ случаѣ, когда она обращается въ безконечно-большую величину.

Рассмотримъ первый случай.

Въ этомъ случаѣ сторона  $b$  обязательно пересѣкается съ кругомъ  $O'$  и непремѣнно въ двухъ точкахъ  $D$  и  $D'$  (фиг. 41). Зависимость между сторонами  $a$ ,  $b$  и  $c$  можно найти на основаніи слѣдующихъ соображеній.

Уголъ  $B$  тупой, поэтому

$$\text{но } (a-c)^2 \geqslant 0 \text{ или } a^2 + c^2 \geqslant 2ac. \quad (2)$$

Сравнивая неравенства (1) и (2), видимъ, что

$$b^2 > 2ac. \quad (3)$$

Складывая неравенства (1) и (3), найдемъ, что

$$2b^2 > a^2 + c^2 + 2ac, \text{ отсюда } b\sqrt{2} > a + c.$$

Это и есть искомая зависимость.

Рассмотримъ второй случай; уголъ  $B < 90^\circ$  (фиг. 43). Пусть сторона  $b$  пересѣкаетъ кругъ  $O'$  въ двухъ точкахъ  $D$  и  $D'$ ; тогда съкращающія  $BD$  и  $BD'$  искомыя. Онжомъ

Продолжимъ  $BD$  до пересѣченія съ окружностью радиуса  $OB$  въ точкѣ  $E$  и соединимъ  $E$  съ  $A$  и  $C$ .

Изъ треугольника  $ABE$ , въ которомъ  $AD$  медиана стороны  $BE$ , находимъ слѣдующее равенство:

$$2AD^2 + 2BD^2 = a^2 + AE^2. \quad (4)$$

Изъ треугольника  $CBE$ , въ которомъ  $CD$  медиана стороны  $BE$ , имѣемъ слѣдующее равенство:

$$2CD^2 + 2BD^2 = a^2 + EC^2. \quad (5)$$

Сложимъ равенства (4) и (5);

$$2(AD^2 + CD^2) + 4BD^2 = a^2 + EC^2 + AE^2. \quad (6)$$

Но  $AD + DC = b$ , отсюда  $AD^2 + DC^2 = b^2 - 2BD^2$ .


Слѣдовательно уравненіе (6) можно представить въ такомъ видѣ:

$$2b^2 = a^2 + c^2 + EC^2 + AE^2$$

Докажемъ, что,  $AE^2 + EC^2 \geqslant 2ac$ .

Изъ треугольниковъ  $ADE$  и  $DBC$  имѣемъ

$$AE : a = AD : BD \quad (8)$$



Фиг. 43.

Изъ треугольниковъ DEC и ADB найдемъ  $\frac{EC}{AD} = \frac{c}{a}$ .

Опредѣливъ изъ равенствъ (7) и (8) AE и EC и возвысивъ ихъ въ квадратъ, получимъ

$$AE^2 = a^2 \cdot \frac{AD}{DC} \quad \text{от} \quad (1) \quad \dots \quad (10); \quad EC^2 = c^2 \cdot \frac{DC}{AD} \quad \text{от} \quad (2) \quad \dots \quad (11)$$

Складывая равенства (10) и (11), будемъ имѣть

$$AE^2 + EC^2 = \frac{a^2 \cdot AD}{DC} + \frac{c^2 \cdot DC}{AD}.$$

Но  $(a \cdot AD - DC \cdot c)^2 \geq 0$  или  $a^2 \cdot AD^2 + c^2 \cdot DC^2 \geq 2ac \cdot AD \cdot DC$ .

Раздѣливъ обѣ части этого неравенства на  $AD \cdot DC$ , получимъ

$$\frac{a^2 \cdot AD}{DC} + \frac{c^2 \cdot DC}{AD} \geq 2ac,$$

а потому  $AE^2 + EC^2 \geq 2ac$ .

Равенство (7) можно представить теперь въ такомъ видѣ:

$$2b^2 \geq a^2 + c^2 + 2ac$$

или же  $b\sqrt{2} \geq a + c$ .

Неравенству  $b\sqrt{2} > a + c$  соответствуютъ два рѣшенія: одна изъ сѣкущихъ будетъ BD, а другая BD'. Но по мѣрѣ того, какъ величины, входящія въ это неравенство будутъ стремиться къ равенству, уголъ Въ все будетъ уменьшаться и наконецъ достигнетъ своего предѣльного значенія при


$$b\sqrt{2} = a + c.$$

Докажемъ что въ этомъ случаѣ BD будетъ биссектрисой угла Въ и сторона b будетъ касаться круга О' въ точкѣ D; покажемъ, что BD будетъ биссектрисой угла Въ.

Продолжимъ BD до пересѣченія съ окружностью радиуса OB въ точкѣ E, точку E соединимъ съ О' и назовемъ точку пересѣнія прямой OE съ AC чрезъ G.

Прямоугольный треугольникъ BDO и треугольникъ ODG подобны, такъ какъ углы DBO и ODG измѣряются дугой DO, а уголъ DOB равенъ углу DOE потому что дуга BF равна дугѣ EF. Слѣдовательно  $\angle BDO = \angle DGO = d$ , а потому дуга AE = EC. Итакъ BD биссектриса угла Въ и задача имѣть одно рѣшеніе.

Мы сказали, что уголъ Въ достигаетъ своего



предѣльного значения, при которомъ проведеніе искомой сѣкущей возможно, при

$$b\sqrt{2} = a + c.$$

Слѣдовательно, чтобы найти уголъ В построеніемъ нужно построить треугольникъ по сторонамъ  $a, c$  и  $\frac{a+c}{\sqrt{2}}$ .

Но такой треугольникъ возможенъ лишь въ томъ случаѣ, когда

$$\frac{a+c}{\sqrt{2}} < a + c; a < \frac{a+c}{\sqrt{2}}; c < \frac{a+c}{\sqrt{2}}.$$

Первое неравенство всегда соблюдается; остальные два неравенства можно представить въ слѣдующемъ видѣ

$$a < c(3 + 2\sqrt{2}); a > c(3 - 2\sqrt{2}).$$

или же  $3 + 2\sqrt{2} > \frac{a}{c} > 3 - 2\sqrt{2}$ .

Такимъ образомъ если отношение  $\frac{a}{c}$  заключается между  $3 + 2\sqrt{2}$  и  $3 - 2\sqrt{2}$ , то треугольникъ возможенъ и уголъ, противолежащій сторонѣ  $\frac{a+c}{\sqrt{2}}$  будетъ искомый. Въ противномъ случаѣ треугольникъ невозможенъ.

Изъ сказаннаго слѣдуетъ, что задача допускаетъ два рѣшенія всякий разъ, когда

$$b\sqrt{2} > a + c,$$

одно рѣшеніе, когда, пожало, отъ

$$b\sqrt{2} = a + c.$$

и совсѣмъ не рѣшается, когда

$$b\sqrt{2} < a + c.$$

Это заключеніе относится ко внутреннимъ сѣкущимъ. Если же мы въ точкѣ В къ окружности радиуса OB проведемъ касательную и обозначимъ точку ея пересечения съ продолженіемъ стороны b чрезъ H, то

$$BH^2 = AH \cdot CH.$$

Отсюда должно заключить, что кромѣ внутренней сѣкущей, удовлетворяющей вопросу, существуетъ и внѣшняя. Проведеніе внѣшней сѣкущей возможно во всякомъ треугольнике. Однако въ томъ случаѣ, когда сторона b будетъ перпендикулярна къ діаметру, соединяющему вершину треугольника В съ центромъ круга, описанного около этого треугольника, тогда точка H отодвинется въ безконечность и сама сѣкущая будетъ имѣть величину безконечно большую.

Ученіе VII класса Тамбовскаго Реальнаго Училища

Александра Евсинеева.

## Несколько словъ по поводу открываемыхъ въ Одессѣ физико-математическихъ курсовъ.

Всѣ лица, заинтересованныя успѣхами физико-математического образования въ нашей средней школѣ, конечно, искренно порадуются плодотворному почину Одесского учебного округа, выразившемуся въ организаціи физико-математическихъ курсовъ для подготовки учителей математики и физики. (См. № 161 „Вѣстника“) Дай Богъ, чтобы эта въ своемъ родѣ единственная теперь попытка послужила первымъ зерномъ для развитія въ нашемъ отечествѣ специально педагогического образования, недостатокъ котораго ощущается съ каждымъ годомъ все сильнѣе и сильнѣе.

Юристъ, техникъ, даже чиновникъ, прежде чѣмъ перейти къ самостоятельной дѣятельности проходятъ болѣею частью довольно суровую подготовительную школу, и никто не рѣшится поручить защиту рискованного дѣла только что испеченному кандидату и не позволять строить мостъ даже увѣнчанному медалью юному технологу. Нельзя безнаказанно портить гербовую бумагу и желѣзо, но можно невозбранно перепортить сколько угодно дѣтей. Употребляемое мною выраженіе, конечно, рѣзко, но оно близко соотвѣтствуетъ дѣйствительности. Вспомнимъ, въ самомъ дѣлѣ, положеніе молодого учителя-математика, приступающаго къ преподаванію: голова его набита разными интегралами, дифференціалами, варіаціями и пр., а знаніе такъ называемой элементарной математики не выше гимназического: кое-что забылось, кое въ чёмъ явились сомнѣнія; системы въ сознаніи можетъ быть и прежде не было, а теперь ужъ и подавно; въ результатѣ иѣчто весьма неопределеннѣе и смутное. Если бы пришлось держать экзаменъ на аттестовать зрѣлости, то сердитые педагоги, пожалуй, и изрѣлымъ бы не признали \*).

Это сторона специальныхъ знаній. Другая, чисто педагогическая, еще хуже. Методика, дидактика — почти незнакомы слова. Смутные воспоминанія о школьнѣмъ преподаваніи неясно рисуются на яркомъ фонѣ свѣжихъ впечатлѣній отъ профессорскихъ лекцій и всѣ симпатіи естественно склоняются къ послѣднимъ. Предо мною и сейчасъ, какъ живой, ученый мужъ, читающій краснорѣчивыя лекціи намъ, ученикамъ 3-го класса. О Боже мой, что это было!

Конечно при иѣкоторой дозѣ храбрости все это тринь-трава: „Мнѣ ли, ученому кандидату \*\*), знакомому чуть не съ послѣднимъ словомъ

\*) Если мнѣ возразятъ, что выборъ факультета обусловливается извѣстною склонностью, которая обезпечиваетъ и знаніе, и интересъ къ дѣлу, то я скажу, что это теоретическое разсужденіе далеко не всегда оправдывается въ дѣйствительности по причинамъ весьма разнообразнымъ.

\*\*) Само собою разумѣется, что я имѣю въ виду не только кандидатовъ университета, а вообще всѣхъ лицъ съ высшимъ образованіемъ, не получившихъ педагогической подготовки.

науки, не справиться съ какой то арифметикой! Небольшая хитрость — растолковать «мальчишкамъ умноженіе чиселъ, оканчивающихся нулями». На этомъ иногда успокаиваются, и тогда наступаетъ царство винта.

Но, предоставивъ винтёровъ винту, вникнемъ въ положеніе человѣка, искренно желающаго поработать: онъ прежде всего хватается за учебники, но ихъ много, а разобраться въ нихъ не легко. Надо бы почитать разборы руководствъ, но они разбросаны въ периодическихъ изданіяхъ и найти ихъ трудно и не всегда возможно. Надо бы о многомъ прочитанномъ подумать, но некогда: дѣло не терпитъ. Надо бы прочитать что нибудь по методологіи, методикѣ, дидактицѣ, но если это и дѣлается, то въ карьеръ, а, следовательно, почти безрезультатно. Подъ руками единственный возможный ресурсъ: посѣщеніе уроковъ другихъ преподавателей и бесѣды съ послѣдними и съ руководящими лицами. Но посѣщеніе уроковъ будетъ тогда только полезно, когда оно продолжительно и сопровождается надлежащими разъясненіями, а это бываетъ далеко не всегда по разнымъ причинамъ, достаточно хорошо известнымъ лицамъ, знакомымъ съ нашей школою.

Словомъ можно утверждать съ большимъ основаніемъ, что въ громадномъ большинствѣ случаевъ молодой преподаватель въ первые года своей дѣятельности находится въ совершенныхъ потемкахъ, въ полномъ туманѣ вычитанныхъ идей, выслушанныхъ советовъ и указаний, воспринятыхъ изъ личнаго опыта наблюдений.

Польза, приносимая такимъ преподавателемъ, весьма проблематична, а внутреннее состояніе его подчасъ бываетъ просто ужасно: онъ извѣрился въ свои силы, усталъ отъ безплодныхъ потугъ и впадаетъ въ совершенное отчаяніе.

Исходъ изъ этого положенія двоякій: въ худшемъ случаѣ дѣло ограничивается усвоеніемъ вѣнчаной рутинѣ; ученики попривыкнутъ къ учителю и подъ грозой единицъ съ горемъ пополамъ одолѣютъ курсы, а преподаватель, успокоенный благодѣтельнымъ временемъ, займется практическимъ изученіемъ теоріи винта; въ лучшемъ случаѣ — учителъ, человѣкъ сильный, выбѣтся, конечно, на прямую дорогу, но и онъ оглядывается на пройденный путь съ тяжелымъ чувствомъ: тамъ и жертвы его неумѣнія, и напрасно затраченныя хорошия усиія дѣтей, и его собственный.

Хорошо организованные курсы могутъ въ значительной степени уничтожить всю эту тяжелую ломку, сократить или упразднить этотъ «тернистый путь», добрая усилия они направлять по прямому пути; колеблющуюся волю укрѣпять; всякому дадутъ нѣкоторый багажъ элементарныхъ знаній и навыковъ; человѣку, неспособному къ педагогической дѣятельности, откроютъ глаза на предстоящее ему поприще и, быть можетъ, убѣдятъ его искать другихъ исходовъ.

Обращаясь къ разсмотрѣнію программы курсовъ, да позволено будетъ высказать нѣкоторыя пожеланія, быть можетъ отчасти предусматриваемыя и составителями программы. Кромѣ методики математики

желательно было бы ввести въ число изучаемыхъ предметовъ и методологію ея (съ философскимъ обоснованіемъ), разумѣется только отъ отношеніи элементарной математики. Нѣкоторыя сочиненія по этому по-виду имѣются въ иностранной и даже въ русской литературѣ.

Изученіе учебниковъ не должно ограничиваться только одобренными министерствомъ руководствами.

Центромъ изученія по каждому отдѣлу полезно сдѣлать какое нибудь классическое сочиненіе, а другія изучать путемъ сравненія съ избраннымъ. Напримеръ, по геометріи можно было бы рекомендовать критико-сравнительное изученіе „Началъ“ Евклида. Въ связи съ изученіемъ учебниковъ должно идти ознакомленіе курсистовъ съ нашей критико-педагогической литературой по математикѣ и физикѣ, которая, хотя еще очень молода, однако имѣть за собой несомнѣнныя заслуги.

Часть въ недѣлю можно было бы, кажется, удѣлить на изученіе исторіи математики, хотя бы въ объемѣ извѣстнаго курса *Klimper'a*\*\*), и это съ тѣмъ большимъ основаніемъ, что время, назначенное на технику гимназического курса физики, едва ли не слишкомъ велико.

Въ отношеніи общей постановки дѣла пожелаемъ возможно болѣе полнаго избѣжанія рутины, возможно широкаго простора личной индивидуальности. Припомнимъ, кстати и помянемъ добрымъ словомъ бывшіе курсы при 2-й Петербургской военной гимназии. Они безспорно сослужили военнымъ гимназиямъ большую службу и подлежать, кажется, единственному упреку за создавіе извѣстныхъ шаблоновъ, извѣстныхъ схемъ для уроковъ. Это шаблоны и схемы опасны въ особенности потому, что въ нихъ, какъ рука въ перчатку, удобно входитъ всякая бездарность, всякая лѣнивая или мало дѣятельная мысль.

*M. Попруженко* (Оренбургъ)

## НАУЧНАЯ ХРОНИКА.

**Къ вопросу о полученіи искусственныхъ алмазовъ.** Читатели „Вѣстника Оп. Физики“ знакомы уже съ опытами Moissan'a надъ получениемъ алмазовъ\*\*). Способъ Moissan'a основанъ на способности углерода выдѣляться изъ раствора въ металлѣ подъ сильнымъ давленіемъ въ формѣ алмаза. 4-го марта сего года въ засѣданіи Р. Ф. Химического Общества К. Д. Хрущовъ сдѣлалъ сообщеніе о своихъ опытахъ надъ приготовленіемъ алмазовъ. Прокаливая куминово-кислое серебро, докладчикъ получилъ углеродистое серебро  $Ag_2C$ , которое и служило для опытовъ. При температурѣ кипѣнія серебро растворяется до 6% углерода, выдѣляющагося изъ раствора при его охлажденіи отчасти въ формѣ

\*) Указанная на этотъ курсъ я имѣю въ виду только объемъ его.

\*\*) См. „Вѣстникъ Оп. Физики“, № 161, стр. 97.

алмаза, если охлаждение производится быстро, такъ что на поверхности образуется кора препятствующая расширению заключенного внутри металла и обусловливающая сильное давление. Въ засѣданіи были демонстрированы образцы полученного такимъ образомъ алмаза и горѣніе его въ кислородѣ. Такъ какъ г. Хрущовъ показывалъ свой препаратъ алмаза Н. И. Бекетову на другой день послѣ получения статьи Moissan'a, то онъ считаетъ себя вправѣ утверждать, что открытие сдѣлано имъ независимо отъ Moissan'a.

Опыты надъ получениемъ алмазовъ, были также произведены G. Friedel'емъ (C. R. 116, 224). Они интересны въ томъ отношеніи, что здѣсь алмазъ получается при сравнительно низкой температурѣ. Дѣйствуя долгое время сѣрой на чугунъ, содержащий до 4% угля, при температурѣ кипятка сѣры (440°) или, при 500°, растворяя полученное сѣрнистое желѣзо и обрабатывая оставшійся уголь дымящейся сѣрной кислотой и бѣртолетовой солью, Friedel получилъ незначительное количество чернаго порошка, чертящаго корундъ.

B. Г.

**Объемный составъ воды.** Вы засѣданіи Лондонскаго Королевскаго Общества 20-го апрѣля (н. с.) A. Scott сообщилъ результаты своихъ новыхъ опредѣленій объемного состава воды. Пользуясь кислородомъ изъ окиси серебра и водородомъ изъ водородистаго палладия, авторъ получилъ въ среднемъ изъ 47 опытовъ для объемного отношенія водорода къ кислороду значеніе  $2,002466 \pm 0,000003$ , что даетъ для атомнаго вѣса кислорода 15,862, если принять отношеніе плотностей, данное лордомъ Rayleigh'емъ. Раньше Ditmar и Henderson нашли 15,866, Cooke и Richards — 15,869, Laduc — 15,876; отношеніе плотности кислорода къ плотности водорода по Laduc'у = 15,905, а объемный составъ воды — 2,0037 : 1; Morley нашелъ 2,0023.

B. Г.

днѣц 0040,8  
татр 212,8  
латр 667,

## РАЗНЫЙ ИЗВѢСТИЯ.

❖ Фотографированіе красокъ, открытое Липпманомъ, усовершенствовано фабриканта ми чувствительныхъ пластинокъ Люмьеромъ и Дѣльономъ. Имъ удалось при получасовой экспозиціи получить безукоризненные снимки видовъ различныхъ мѣстностей. Снимки эти были демонстрированы ими въ одномъ изъ послѣднихъ засѣданій французскаго фотографическаго общества и поразили присутствовавшихъ върной передачей красокъ и естественностью тоновъ.

❖ Русская десятичная система мѣръ. Указывая на все большее распространеніе метрической системы въ Россіи, проф. Ф. О. Петрушевскій выступаетъ въ послѣдней книжкѣ Журнала Русскаго Ф.-Химического Общества\*) съ предложеніемъ ввести въ Россіи новую систему мѣръ, благодаря чому явится возможность сблизить наши мѣры съ метрическими и избѣжать того затрудненія, которое, явилось бы, если бы

\*) Ж. Ф. Х. О. XXV, 2. 91.

народу пришлось усваивать чиностранные названия мер. Въ отличие отъ нынѣ принятыхъ, новые мѣры могутъ быть названы *казенными* и это название, конечно, придется имъ некоторый вѣсъ въ глазахъ народа и облегчить ихъ распространение. Суть предложенія уважаемаго профессора ясна изъ слѣдующей таблицы.

Русская метрическая система.	Величина во франц. метрич. мѣрахъ.	Величина въ нынѣихъ русскихъ мѣрахъ.
Название мѣръ.		
Полусаженье казенное=20 вершкамъ казеннымъ*)	1 метръ	1,4061 арш.
Вершокъ казенный=0,05 метр.=5 сант.	0,05 метр.	1,1248 вѣрш.
Сажень казенная, саженька=2 каз. полу- саженкамъ	2 метра	0,9374 саж.
Верста казенная малая=500 каз. саж.	1 километръ	468,7 саж. 0,9374 verst.
Десятина каз., десятинка=2500 кв. са- женамъ	1 гектарь = 10000 кв. м.	0,9153 дес. (2196,8 кв. саж.)
Верста кв. каз.=100 десятинокъ	1 кв. килом. = 100 гектаровъ	0,9651 кв. verst. 91,53 дес.
Кубикъ малый=куб. каз. полусаженка	1 куб. метръ	0,10296 куб. саж.
Кубикъ большой=10 кубикамъ малымъ	10 куб. метръ	1,0296 куб. саж.
Ведерко=10 штофиковъ	10 литровъ	0,8131 ведр.
Штофикъ=10 стаканчикамъ	1 літръ	0,8131 штофиковъ
Стаканчикъ**) . . . . .	100 куб. сант.	
Мѣра малая (троегарнецъ или ведерко).	10 литровъ	3,0490 грнц.
” средняя=10 мѣр. мал.	100 ”	3,812 чвт.
” большая=10 мѣр. сп.=100 м.м.	1000 ”	4,795 чвк.
Фунтъ большой казен.=100 б. золотн.	500 гр.	1,221 ф.
Золотникъ большой	5 гр.	1,172 зол. звот.
Грамъ***)		
Двоевунтъ каз.=2 ф. б.	1 килогр.	2,441 ф.
Полупудъ большой=10 двоев.	10 килогр.	24,41
Полуберковецъ большой=100 двоев.	100 ”	6,105 пуд.
Тонна=1000 двоев.	1000 кг. (кинталъ).	61,05 ”

\*) Можно допустить *казенный аршинъ* въ 15 каз. вѣршковъ, = 75 сант. = 1,054 арш., но онъ не содержитъ цѣлое число разъ въ казенной сажени.

\*\*) Сороковка= $\frac{1}{40}$  нынѣихъ ведра=3,025 стакана.

\*\*\*) Можно допустить *казенный лотъ*=10 каз. золотникамъ.

# ЗАДАЧИ.

**№ 477.** У крестьянъ нѣкоторыхъ мѣстностей (напр. близь Перми) существуетъ мѣра объемовъ, называемая *кучей*. Куча есть конусъ, коего образующая равняется одной сажени. Они полагаютъ, что объемъ кучи почти не зависитъ отъ высоты, если послѣднюю брать въ предѣлахъ отъ  $1\frac{1}{2}$  до 2 аршинъ, и равняется половинѣ кубической сажени.— Показать, что объемъ кучи менѣе полусажени и найти измѣненіе ея объема въ зависимости отъ измѣненія высоты кучи отъ  $1\frac{1}{2}$  до 2 аршинъ.

*К. Тороповъ* (Пермь).

**№ 478.** Рѣшить систему:

$$\begin{aligned}x^2 + y\sqrt{xy} &= 420 \\y^2 + x\sqrt{xy} &= 280.\end{aligned}$$

*С. Адамовичъ* (Курскъ).

**№ 479.** Даны три параллельныя плоскости. Разстояніе между первою и второю равно  $m$ , между второю и третьею равно  $n$ . Опредѣлить ребро правильнаго тетраэдра, у котораго двѣ вершины расположены на средней плоскости, а остальная двѣ — на крайнихъ.

*П. Свѣнниковъ* (Троицкъ).

**№ 480.** Даны два концентрическия шара. Радіусъ меньшаго равенъ  $r$ , а большаго  $R$ . Опредѣлить ребро правильнаго тетраэдра, у котораго одна вершина расположена на поверхности большаго шара, а остальная три — на поверхности меньшаго.

*П. Свѣнниковъ* (Троицкъ).

**№ 481.** Построить треугольникъ АВС по углу В и по линіямъ АА<sub>1</sub> и СС<sub>1</sub>, дѣлящимъ стороны ВС и АВ въ отношеніи  $m:n$ .

*Б. Ахматовъ* (Тула).

**№ 482.** Описать двѣ окружности, касательныя къ сторонамъ даннаго угла А и пересѣкающіяся подъ прямымъ (или даннымъ) угломъ, если известно, что сумма радиусовъ искомыхъ окружностей равна  $S$ . (См. зад. 472).

*Н. Николаевъ* (Пенза).

**№ 483.** Въ вершинахъ правильнаго шестиугольника помѣщены массы, послѣдовательно равные 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Опредѣлить положеніе центра тяжести системы, образованной этими массами.

*Б. И.* (Одесса). (Заемств.)

## РЪШЕНИЯ ЗАДАЧЪ.

**№ 361** (2 сер.). Одну дѣвицу спросили сколько ей лѣтъ. „Я родилась 6-го сентября, — отвѣтила она — а въ текущемъ (1892 г.) году праздновала свое рожденіе 1-го августа, но замѣтьте, что я праздную не годовщину рожденія, а тысячедневіе. Это удобнѣе. Угадайте же, сколько мнѣ лѣтъ“.

Съ 6-го сентября по 31-е декабря включительно — 117 дней, съ начала 1892 г. по 1-е августа — 213 дней; если, слѣдовательно, назовемъ число полныхъ годовъ, прожитыхъ дѣвицей до первого високоснаго года, черезъ  $x$ , и — начиная съ этого високоснаго года до начала 1892 г. — число четырехлѣтій, по 1461 день въ каждомъ, черезъ  $y$ , то будемъ имѣть:

$$117 + 365x + 1461y + 213 = 1000n,$$

гдѣ  $n$  число пѣлое. Или

$$365x + 1461y + 330 = 1000n \dots \dots \dots (1)$$

По обозначенію,  $x$  можетъ имѣть только значенія: 0, 1, 2 и 3. При  $x=0$ , уравненіе (1) даетъ наименьшее значеніе  $y=470$ , что по условію задачи немыслимо. При  $x=1$ , находимъ  $y=5, 1005, 2005, \dots$ , изъ коихъ лишь первое значеніе даетъ отвѣтъ на предложенный вопросъ. При  $x=2$ , наименьшее изъ значеній  $y$  есть 540, а при  $x=3$ , имѣмъ: для  $y$  рядъ значеній: 75, 1075, 2075, . . . . Ни одно изъ нихъ не удовлетворяетъ условіямъ задачи, ибо не могла же дѣвица жить напр. три столѣтія съ лишнимъ (при  $y=75, n=111$ ). Итакъ, имѣя одно лишь возможное рѣшеніе:  $x=1, y=5, n=8$ , находимъ, что дѣвица родилась 6 сентября 1870 года.

Б. Лебедевъ, М. Абрамовъ (Житомиръ); А. Рѣзновъ (Самара); К. Щиголевъ (Курскъ); С. Высоцкій (Варшава).

**№ 362** (2 сер.). Дано, что  $mn+pq$  дѣлится на  $m-p$ . Доказать, что  $mq+pr$  тоже раздѣлится.

$$1. \quad \frac{mn+pq}{m-p} = n + \frac{p(q+n)}{m-p},$$

т. е.  $p(q+n)$  дѣлится на  $m-p$ , но такъ какъ

$$\frac{mq+pr}{m-p} = q + \frac{p(q+n)}{m-p},$$

то очевидно, что  $mq+pr$  дѣлится на  $m-p$ .

2. Вычитая  $mq+pr$  изъ  $mn+pq$ , получимъ  $(m-p)(n-q)$ , а такъ какъ уменьшаемое  $mn+pq$  дѣлится на  $m-p$ , то должно дѣлится и вычитаемое  $mq+pr$ .

М. Акопянцъ, О. Озаровская (Спб.); К. Каприэлъ, П. Ивановъ (Одесса); А. Васильева, С. Бабанская (Тифлісъ); А. Рѣзновъ (Самара); К. Щиголевъ (Курскъ); С. Высоцкій (Варшава); В. Шилловский (Полоцкъ); А. Герасимовъ (Кременчугъ); А. П. (Пенза); В. Шишаловъ (Иван.-Вознесенскъ); Б. Лебедевъ (Житомиръ).

**№ 363** (2 сер.). *a)* Изъ двухъ точекъ А и В, взятыхъ въ окружности, проведены касательныя АС и ВD по разныя стороны прямой АВ. Доказать, что прямая АВ въ точкѣ пересѣченія съ прямой СD раздѣлится на части, прямо пропорциональныя касательнымъ АС и ВD.

*b)* Доказать, основываясь на предыдущей теоремѣ, что діагонали описанного около круга четырехугольника и прямые, соединяющія точки касанія противоположныхъ его сторонъ, пересѣкаются въ одной точкѣ.

*a)* Проведемъ BN CD до пересѣченія съ АС въ точкѣ N; очевидно  $AO:OB=AC:CN$ , а такъ какъ  $CN=BD$ , то  $AO:OB=AC:BD$ .

*b)* Пусть діагонали описанного около круга четырехугольника АА'ВВ' пересѣкаются въ точкѣ О. Пусть точки касанія сторонъ АА', А'В, ВВ', В'А будуть соответственно С', D, D', С. На основаніи доказанной теоремы можемъ сказать, что СD дѣлить АВ въ томъ же отношеніи, въ какомъ С'D' дѣлить СD, т. е. точка пересѣченія СD и С'D' лежитъ на АВ. Повторя то же по отношенію къ линіи А'В', получимъ требуемое доказательство.

*A. Рыжновъ* (Самара); *В. Шишаловъ* (Ив.-Вознес.); *К. Щилевъ* (Курскъ); *С. Высоцкій* (Варшава); *И. Трипольскій*, *Н. Николаевъ* (Пенза); *В. Буханицевъ* (Борисоглѣбскъ).

**№ 364** (2 сер.). Рѣшить безъ помощи тригонометріи слѣдующую задачу.

„Для измѣренія высоты башни на горизонтальной плоскости, проходящей черезъ ея основаніе, были назначены три доступныя точки А, В и С, причемъ точка А лежала прямо на сѣверѣ, а точка В — на западѣ отъ С. Угловая высота верхушки башни при точкахъ А и В равна  $45^{\circ}$ , а угловая высота при точкѣ С равна  $60^{\circ}$ . Зная, что  $AC=b$ ,  $BC=a$ , найти высоту башни.

Пусть О—основаніе башни, а высоту башни обозначимъ черезъ  $x$ . Очевидно  $AO=BO=x$ , а  $CO=x:\sqrt{3}$ . Опустимъ изъ А и В перпендикуляры АМ и ВN на ОС. Такъ какъ  $\triangle AMC \sim \triangle BNC$ , то  $AM:CM=CN:BN$ , или

$$AM \cdot BN = CM \cdot CN \dots \dots (1).$$

Но

$$\overline{AO}^2 = \overline{AC}^2 + \overline{CO}^2 + 2CO \cdot CM, \text{ или } x^2 = b^2 + \frac{x^2}{3} + \frac{2x}{\sqrt{3}} \cdot CM;$$

$$\overline{BO}^2 = \overline{BC}^2 + \overline{CO}^2 + 2CO \cdot CN, \text{ или } x^2 = a^2 + \frac{x^2}{3} + \frac{2x}{\sqrt{3}} \cdot CN,$$

откуда

$$CM - CN = \frac{\sqrt{3}}{2x} (a^2 - b^2) \dots \dots (2).$$

Такъ какъ сумма площадей АОС, ВОС и АВС равна площади АOB, то

$$AM \cdot OC + BN \cdot OC + AC \cdot BC = \sqrt{(a^2 + b^2) \left( x^2 - \frac{a^2 + b^2}{4} \right)},$$

откуда легко получимъ

$$AM + BN = \frac{\sqrt{3}}{x} \left[ \sqrt{(a^2 + b^2) \left( x^2 - \frac{a^2 + b^2}{4} \right)} - ab \right]. \quad (3)$$

Такъ какъ  $\overline{CM}^2 = b^2 - \overline{AM}^2$  и  $\overline{CN}^2 = a^2 - \overline{BN}^2$ , то отнимая отсюда равные величины  $2\overline{CM} \cdot \overline{CN}$  и  $2AM \cdot BN$  (1), найдемъ:

$$(\overline{CM} - \overline{CN})^2 = a^2 + b^2 - (\overline{AM}^2 + \overline{BN}^2).$$

Замѣнняя здѣсь  $\overline{CM} - \overline{CN}$  и  $\overline{AM} + \overline{BN}$  найденными раньше для нихъ выраженіями (2) и (3), легко приведемъ это уравненіе къ биквадратному.

$$4(a^2 + b^2)x^4 - 36a^2b^2x^2 + 9a^2b^2(a^2 + b^2) = 0,$$

изъ котораго и опредѣлимъ  $x$ .

*A. П. (Пенза); К. Щиголевъ (Курскъ).*

**№ 365** (2 сер.). Построить треугольникъ по данной сторонѣ  $BC = a$ , высотѣ  $h_a$ , на нее опущенной, при условіи, что другая высота  $h_b$  равна сторонѣ  $AC$ , на которую она опущена.

Такъ какъ изъ условія задачи слѣдуетъ, что  $h_b^2 = b^2 = ah_a$ , то, построивъ среднюю пропорціональную между  $a$  и  $h_a$ , приведемъ задачу къ простой задачѣ построенія  $\Delta$ —а по  $a$ ,  $h_a$  и  $b$ , которая въ общемъ случаѣ имѣтъ два рѣшенія.

*A. Рызновъ (Самара); В. Шишаловъ, В. Баскаковъ (Ив. Вознесенскъ); С. Луневскій, (Москва); П. Писаревъ, К. Щиголевъ (Курскъ); С. Высоцкій (Варшава); С. Баханская, К. Исаковъ (Тифлісъ); В. Херувимовъ (Харьковъ); А. П. (Пенза); В. Буханиевъ (Борисоглѣбскъ); К. Капрелли (Одесса); А. Кофманъ.*

**№ 366** (2 сер.). Прямая раздѣлена на двѣ части, пропорціональныя сторонѣ квадрата и его діагонали. Показать, что большая часть есть средняя гармоническая между прямой и меньшей ея частью.

Пусть меньшая часть  $= x$ ; тогда большая  $= x\sqrt{2}$ . Требуется доказать, что

$$x\sqrt{2} = \frac{2x^2(1 + \sqrt{2})}{x(2 + \sqrt{2})},$$

сокращая на  $x$ , получимъ

$$\sqrt{2} = \frac{2 + 2\sqrt{2}}{2 + \sqrt{2}}, \text{ т. е. } 2\sqrt{2} + 2 = 2 + 2\sqrt{2}.$$

*В. Шидловскій (Полоцкъ); А. Герасимовъ (Кременчугъ); А. П. (Пенза); В. Буханиевъ (Борисоглѣбскъ); В. Шишаловъ (Ив.-Вознес.); К. Капрелли (Одесса); А. Рызновъ (Самара); К. Щиголевъ (Курскъ); С. Высоцкій (Варшава).*

Обложка  
ищется

Обложка  
ищется