

Обложка
ищется

Обложка
ищется

ВѢСТИКЪ ОПЫТНОЙ ФИЗИКИ

ЭЛЕМЕНТАРНОЙ МАТЕМАТИКИ.

№. 290.

Содержание: Новое доказательство трансцендентности чиселъ π и e . (Продолжение). Пр.-Доч. В. Калана.—Радиометръ Круска съ катодными лучами. Проф. Н. А. Гезехуса.—Опыты и приборы. Несколько опытовъ съ новымъ электроскопомъ. Г. Э. Пфлаума.—Рецензія: „Теорія Максвелля и Герцовскія колебанія“. А. Пуанкаре. Д. Шора.—Научная хроника: Телефонографъ.—Разныя извѣстія: Премія Нобеля.—Задачи для учащихся №№ 7—10 (4 сер.).—Рѣшенія задачъ (3-ей серии) №№ 587, 607, 613, 601, 602, 603, 611.—Объявленія.

Новое доказательство трансцендентности чиселъ π и e .

(Доказательство ѡ. Валена).

Прив.-Доцента В. Калана въ Одессе.

(Продолжение. *)

Теперь мы можемъ изложить доказательство ѡ. Валена. Мы начнемъ съ доказательства трансцендентности числа e . Именно — намъ нужно обнаружить невозможность равенства вида

$$a_0 + a_1 e + a_2 e^2 + \dots + a_n e^n = 0,$$

гдѣ $a_0, a_1 \dots a_n$ суть цѣлые числа, между которыми имѣются отличные отъ нуля. Подобно тому, какъ это еще дѣлалъ Эрмитъ, (см. стр. 230) мы поставимъ вопросъ шире: мы докажемъ, что равенство вида

$$Ae^a + Be^b + Ce^c \dots Le^l + M = 0$$

невозможно, если показатели $a, b, c, \dots l$ суть различные цѣлые положительные числа, а коэффициенты $A, B, \dots L, M$ цѣлые числа, изъ которыхъ не всѣ равны нулю. Даже больше, мы можемъ считать

*) См. № 287 „ВѢСТИКА“.

всѣ показатели и всѣ коэффициенты отличными отъ нуля. Это значитъ, члены, въ которыхъ коэффициенты равны нулю, мы можемъ считать вовсе опущенными; члены же, въ которыхъ обращается въ нуль показатель, мы присоединимъ къ свободному члену М; вопросъ еще въ томъ, не обратится ли въ нуль именно этотъ свободный членъ. Если бы это произошло и Le^l былъ бы толь изъ сохранившихся членовъ, который имѣеть наименьшій показатель при e , то намъ достаточно было бы раздѣлить обѣ части равенства на e^l , чтобы возстановить свободный членъ. Итакъ доказательству подлежитъ слѣдующая теорема:

Теорема. Равенство вида

$$Ae^a + Be^b + Ce^c + \dots Le^l + M = 0 \quad (17).$$

невозможно, если всѣ коэффициенты A, B M суть цѣлые числа, отличные отъ нуля, и всѣ показатели $a, b, c \dots l$ суть цѣлые положительные числа, также отличные отъ нуля.

Слѣдяя пріему, который мы уже неоднократно формулировали, мы умножимъ лѣвую часть равенства (17) на нѣкотораго множителя N и постараемся разбить каждый членъ на цѣлую и дробную его часть. Самый множитель N мы выберемъ слѣдующимъ образомъ: пусть n означаетъ число членовъ въ лѣвой части равенства (17), не считая свободнаго члена, а p пусть означаетъ произвольное нечетное простое число; затѣмъ положимъ

$$N = \sum_{\alpha, \beta, \dots, \lambda=0, 1, 2, \dots, p} (-1)^{\alpha+\beta+\dots+\lambda} \binom{p}{\alpha} \binom{p}{\beta} \dots \binom{p}{\lambda} \frac{[(n+1)p-\alpha-\beta-\dots-\lambda-1]!}{(p-1)!} a^\alpha b^\beta \dots e^\lambda \quad (18)$$

суммованіе распространяется на всѣ возможныя слагаемыя означенаго вида, въ которыхъ показатели $\alpha, \beta \dots \lambda$ независимо одинъ отъ другого принимаютъ всѣ значения отъ 0 до p включительно. Прежде всего ясно, что N есть число цѣлое; въ самомъ дѣлѣ, въ каждомъ слагаемомъ какъ число $a^\alpha b^\beta \dots e^\lambda$, такъ и

множители $\binom{p}{\alpha}, \binom{p}{\beta} \dots \binom{p}{\lambda}$ суть числа цѣлые; но и послѣдний

множитель $\frac{[(n+1)p-\alpha-\beta-\dots-\lambda-1]!}{(p-1)!}$

есть число цѣлое, ибо при сдѣланныхъ соглашеніяхъ относительно значеній количествъ $\alpha, \beta \dots \lambda$ $(n+1)p-\alpha-\beta-\dots-\lambda-1 \geq p-1$.

Выдѣлимъ теперь изъ суммы Σ тотъ членъ, который соот-

вътствуетъ значеніямъ показателей $\alpha = \beta = \gamma = \dots \lambda = p$. Этотъ членъ, очевидно, равенъ

$$(-1)^{np} S^p = (-1)^n S^p, *$$

гдѣ S означаетъ произведеніе $abc \dots l$. Что касается остальныхъ членовъ, то въ каждомъ изъ нихъ имѣется по крайней мѣрѣ одинъ показатель, скажемъ c , меньшій, чѣмъ p ; тогда $\binom{p}{c}$ есть число, кратное p , и слѣдовательно, весь членъ представляетъ собой цѣлое число, кратное p ; такъ какъ то же самое можно сказать относительно всѣхъ остальныхъ членовъ, то

$$N = (-1)^n S^p + pR \dots (19)$$

гдѣ R число цѣлое.

Составимъ теперь выраженіе для $N e^a$. Для этого намъ нужно помножить рядъ

$$e^a = 1 + \frac{a}{1} + \frac{a^2}{1 \cdot 2} + \frac{a^3}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \dots \dots \frac{a^{\sigma}}{\sigma!} + \dots \dots$$

на выраженіе N .

Какъ извѣстно изъ теоріи рядовъ, чтобы помножить рядъ, состоящій изъ положительныхъ членовъ, на многочленъ, достаточно умножить каждый членъ ряда на всѣ члены многочлена. Мы получимъ при этомъ новый рядъ, который выражаетъ требуемое произведеніе и сходится абсолютно; это значитъ, что суммованіе можно производить, располагая члены ряда въ произвольномъ порядке и соединяя ихъ въ произвольныя группы. Поэтому всѣ члены ряда, выражающаго произведеніе $N e^a$, имѣютъ видъ:

$$[h, \beta, \gamma \dots \lambda] a^h b^\beta c^\gamma \dots \lambda^\lambda, \quad (20)$$

гдѣ символъ

$$[h, \beta, \gamma \dots \lambda]$$

означаетъ коэффиціентъ того члена, въ которомъ $a, b, c \dots l$ входятъ съ показателями $h, \beta, \gamma \dots \lambda$. При этомъ показатели $\beta, \gamma \dots \lambda$ могутъ имѣть всевозможныя значения отъ 0 до p , показатель же h —отъ 0 до ∞ . Поставимъ себѣ задачей разыскать коэффиціентъ $[h, \beta, \gamma \dots \lambda]$.

Очевидно членъ (20) могъ получиться только отъ умноженія первыхъ ($h+1$) членовъ ряда e^a на такіе члены многочлена, выражающаго N , которые содержатъ множитель

$$b^\beta c^\gamma \dots \lambda^\lambda.$$

Совокупность этихъ членовъ можетъ быть представлена въ

*) $(-1)^{np} = (-1)^n$, ибо p нечетное число.

такомъ видѣ: $\dots - \gamma - \delta =$ въ йскательной арифметикѣ лѣтатѣй

$$(-1)^{\beta+\gamma+\dots+\lambda} \binom{p}{\beta} \binom{p}{\gamma} \cdots \binom{p}{\lambda} \frac{b^{\beta} c^{\gamma} \cdots l^{\lambda}}{(p-1)!} \left\{ q! - \binom{p}{1} (q-1)! a + \right.$$

$$\left. + \binom{p}{2} (q-2)! a^2 + \dots + (-1)^p \binom{p}{p} (q-p)! a^p \right\},$$

гдѣ для краткости положено $a = p - \beta - \gamma - \dots - \lambda - 1 = q$.

Умножая члены ряда a^p на этотъ многочленъ, мы получимъ въ произведеніи членъ, содержащій $a^h b^{\beta} \cdots l^{\lambda}$, въ такомъ видѣ:

$$\begin{aligned} & (-1)^{\beta+\gamma+\dots+\lambda} \binom{p}{\beta} \binom{p}{\gamma} \cdots \binom{p}{\lambda} \left\{ \frac{q!}{h!} - \binom{p}{1} \frac{(q-1)!}{(h-1)!} + \right. \\ & \left. + \binom{p}{2} \frac{(q-2)!}{(h-2)!} + \dots \right\} \frac{a^h b^{\beta} \cdots l^{\lambda}}{(p-1)!}, \end{aligned} \quad (22)$$

Послѣдній членъ суммы, содержащейся въ скобкахъ, имѣеть видъ

$$(-1)^h \binom{p}{h} (q-h)! \text{ или } (-1)^p \binom{p}{h} \frac{(q-p)!}{(h-p)!}, \quad (22')$$

смотря по тому, будетъ ли $h \leq p$ или $h > p$. Выраженіе, содержащееся въ формулѣ (22) въ кривыхъ скобкахъ совпадаетъ съ лѣвымъ частямъ тождествъ I, II, и III, а послѣдній членъ его (22') совпадаетъ съ выраженіями (13). Это намъ даетъ возможность преобразовать выраженіе (22) при помощи этихъ тождествъ.

Остановимся сначала на той группѣ членовъ, измѣреніе которыхъ относительно количествъ a, b, \dots, l меньше np , т. е. въ которыхъ

$$h + \beta + \gamma + \dots + \lambda < np. \quad (23).$$

Это условіе можно написать въ видѣ:

$$(n+1)p - \beta - \gamma - \dots - \lambda - 1 = q \geq p + h$$

и потому оно выражаетъ то условіе, при которомъ имѣть мѣсто тождество (I). Пользуясь этимъ тождествомъ и замѣняя q его значеніемъ, мы можемъ представить каждый членъ этой группы въ такомъ видѣ:

$$(-1)^{\beta+\gamma+\dots+\lambda} \binom{p}{\beta} \binom{p}{\gamma} \times \dots$$

$$\times \binom{p}{\lambda} \binom{np-\beta-\dots-\lambda-1}{h} \frac{[(n+1)p-h-\beta-\dots-\lambda-1]!}{(p-1)!} a^h b^{\beta} \cdots l^{\lambda}.$$

Совокупность членовъ этой группы мы обозначимъ черезъ $G(\bar{a}, b, c \dots l)$, такъ что

$$\begin{aligned} G(\bar{a}, b, c \dots l) = & \\ \sum (-1)^{\beta+\gamma+\dots+\lambda} \binom{p}{\beta} \binom{p}{\gamma} \times \dots & \\ \times \binom{p}{\lambda} \binom{n^p - \beta - \gamma - \dots - \lambda - 1}{h} \frac{[(n+1)p - h - \beta - \dots - \lambda - 1]!}{(p-1)!} a^h b^{\beta} \dots l^{\lambda} & (24). \end{aligned}$$

$\beta, \gamma, \dots, \lambda = 0, 1, \dots, p.$
 $h + \beta + \gamma + \dots + \lambda < np.$

Суммованіе распространяется на всѣ значения h, β, \dots, λ , сумма которыхъ меньше np ; при этомъ показатели $\beta, \gamma, \dots, \lambda$ могутъ принимать всевозможныя значенія отъ 0 до p , показатель же h можетъ принимать и большія значенія въ предѣлахъ, опредѣляемыхъ неравенствомъ (23). Поэтому выраженіе $G(\bar{a}, b, c \dots l)$ симметрично относительно количествъ группы b, c, \dots, l , въ которую, однако, не входитъ количество a . Это мы имѣли въ виду, помѣщая a горизонтальной чертой сверху.

Теперь не трудно видѣть, что $G(\bar{a}, b, c \dots l)$ есть цѣлое число, кратное p . Въ самомъ дѣлѣ, каждый членъ этого выраженія представляетъ собой произведеніе цѣлыхъ множителей; сомнѣніе можетъ возникнуть только относительно множителя

$$\frac{[(n+1)p - h - \beta - \dots - \lambda - 1]!}{(p-1)!}.$$

Но неравенство (23) обнаруживаетъ, что

$$(n+1)p - h - \beta - \dots - \lambda - 1 > p - 1,$$

а потому этотъ множитель представляетъ собой число, не только цѣлое, но даже кратное p , ибо p есть число простое, входитъ въ числитель и не входитъ въ знаменатель. Итакъ

$$G(\bar{a}, b, c \dots l) = p T_a, \quad (25).$$

гдѣ T_a есть цѣлое число.

Теперь мы обращаемся къ той группѣ членовъ (22), памѣреніе которыхъ опредѣляется неравенствомъ

$$np < h + \beta + \gamma + \dots + \lambda < (n+1)p, \quad (26)$$

Такъ какъ сумма

$$\beta + \gamma + \dots + \lambda$$

не превышаетъ $(n-1)p$, а

$$h + \beta + \gamma + \dots + \lambda \geq np, \quad (27)$$

то, при этихъ условіяхъ,

$$h \geq p. \quad (28)$$

Первая часть неравенства (26), будучи написана въ видѣ

$$(n+1)p - \beta - \gamma - \lambda \leq p + h,$$

обнаруживаетъ, что при этихъ условіяхъ

$$p + h > q. \quad (28')$$

Наконецъ, неравенство

$$h + \beta + \gamma + \dots + \lambda < (n+1)p$$

обнаруживаетъ, что

$$q \geq h \quad (28'').$$

Соотношения (28), (28') и (28'') обнаруживаютъ, что имѣютъ мѣсто тѣ условія, при которыхъ справедливо тождество (II). Отсюда слѣдуетъ, что члены (22), измѣреніе которыхъ опредѣляется неравенствами (26), обращаются въ нуль.

Намъ остается только разсмотрѣть тѣ члены, въ которыхъ

$$h + \beta + \dots + \lambda \geq (n+1)p. \quad (29)$$

Написавъ это неравенство въ видѣ

$$(n+1)p - \beta - \gamma - \lambda \leq h,$$

мы обнаружимъ, что въ этомъ случаѣ

$$q < h. \quad (30)$$

Далѣе, такъ какъ

$$\beta + \gamma + \dots + \lambda \leq (n-1)p,$$

то $q > p$. Вмѣстѣ съ неравенствомъ (30) это обнаруживаетъ, что имѣютъ мѣсто тѣ условія, при которыхъ справедливо тождество (III). Поэтому, пользуясь этимъ тождествомъ, мы представимъ члены послѣдней группы въ видѣ:

$$\begin{aligned} & (-1)^{p+\beta+\gamma+\dots+\lambda} \binom{p}{\beta} \binom{p}{\gamma} \dots \binom{p}{\lambda} \times \dots \\ & \times \frac{(h+\beta+\dots+\lambda-(n+1)p+1) \dots (h+\beta+\dots+\lambda-np)}{h(h-1) \dots (np-\beta-\dots-\lambda)(p-1)!} a^h b^\beta c^\gamma \dots l^\lambda. \end{aligned}$$

Совокупность всѣхъ членовъ этой группы мы обозначимъ символомъ $R(a, b, c \dots l)$. Такъ что

$$R(a, b, c \dots l) = \quad (31)$$

$$\begin{aligned} & \sum_{\beta, \gamma, \dots, \lambda=0, 1, \dots, p} (-1)^{p+\beta+\gamma+\dots+\lambda} \binom{p}{\beta} \binom{p}{\gamma} \dots \binom{p}{\lambda} \times \dots \\ & \times \frac{(h+\beta+\gamma+\dots+\lambda-(n+1)p+1) \dots (h+\beta+\gamma+\dots+\lambda-np)}{h(h-1) \dots (np-\beta-\gamma-\dots-\lambda)(p-1)!} a^h b^\beta c^\gamma \dots l^\lambda. \end{aligned}$$

$$\beta, \gamma, \dots, \lambda = 0, 1, \dots, p.$$

$$h + \beta + \gamma + \dots + \lambda \geq (n+1)p.$$

Такъ какъ рядъ, которымъ выражается количество $R(a, b \dots l)$, состоять изъ положительныхъ и отрицательныхъ членовъ, то абсолютная величина его, которую мы обозначимъ черезъ P , меньше, чѣмъ сумма ряда, составленного изъ абсолютныхъ величинъ членовъ предыдущаго ряда. Иными словами

$$P < \sum \binom{p}{\beta} \binom{p}{\gamma} \times \dots \times \binom{p}{\lambda} \frac{(h+\beta+\gamma+\dots+\lambda-(n+1)p+1) \dots (h+\beta+\gamma+\dots+\lambda-np)}{h(h-1)\dots(np-\beta-\gamma-\dots-\lambda)(p-1)!} a^h b^p \dots e^\lambda.$$

$\beta, \gamma \dots \lambda = 0, 1, \dots, p.$
 $h + \beta + \dots + \lambda \geq (n+1)p.$

Правая часть этого неравенства возрастетъ еще больше, если все количества a, b, \dots, l мы замѣнимъ наибольшимъ изъ нихъ, которое обозначимъ черезъ m ; поэтому

$$P < \sum \binom{p}{\beta} \binom{p}{\gamma} \times \dots \times \binom{p}{\lambda} \frac{(h+\beta+\dots+\lambda-(n+1)p+1) \dots (h+\beta+\dots+\lambda-np)}{h(h-1)\dots(np-\beta-\gamma-\dots-\lambda)(p-1)!} m^{h+\beta+\dots+\gamma}. \quad (32)$$

$\beta, \gamma, \dots, \lambda = 0, 1, \dots, p.$
 $h + \beta + \dots + \lambda \geq (n+1)p.$

Какъ указано подъ знакомъ суммы, здѣсь нужно суммировать все члены этого вида, въ которыхъ $\beta, \gamma \dots \lambda$ имѣютъ все возможныя значенія отъ 0 до p независимо другъ отъ друга, а при каждой системѣ значеній этихъ количествъ h можетъ принимать все возможныя значенія, при которыхъ

$$h + \beta + \dots + \lambda \geq (n+1)p; \quad (33)$$

порядокъ суммованія, какъ мы имѣли уже случай указать, не вліяетъ на результатъ. Это можно еще выразить такъ. Положимъ

$$\beta + \gamma + \dots + \lambda = \tau$$

$$h + \beta + \gamma + \dots + \lambda = (n+1)p + \sigma. \quad (34)$$

Тогда мы получимъ:

$$h = (n+1)p + \sigma - \tau$$

$$P < \sum \binom{p}{\beta} \binom{p}{\gamma} \times \dots \times \binom{p}{\lambda} \frac{(\sigma+1)(\sigma+2) \dots (\sigma+p)}{((n+1)p-\tau+\sigma)((n+1)p-\tau+\sigma-1) \dots (np-\tau)(p-1)!} m^{(n+1)p+\sigma}$$

Здѣсь количество h замѣнено количествомъ σ , суммованіе должно быть распространено на все значенія количествъ $\beta, \gamma \dots \lambda$.

отъ 0 до p , условіе же (33) сводится къ тому, чтобы σ принимало произвольныя значенія отъ 0 до ∞ . Количество τ зависитъ отъ $\beta, \gamma, \dots, \lambda$; вмѣстѣ съ ними оно измѣняется и именно—въ предѣлахъ отъ 0 до $(n-1)p$.

Принимая во вниманіе все сказанное, мы расположимъ суммованіе въ слѣдующемъ порядкѣ: мы дадимъ σ и τ опредѣленныя значенія и просуммируемъ всѣ тѣ члены, въ которыхъ сумма $\beta + \gamma + \dots + \lambda$ имѣть предписанное значеніе τ . Полученная сумма будетъ, очевидно, зависѣть отъ σ и отъ τ . Мы ее просуммируемъ сначала по τ въ предѣлахъ отъ 0 до $(n-1)p$, а потомъ по σ въ предѣлахъ отъ нуля до безконечности. Это можно выразить такъ:

$$P < \sum_{\sigma=0}^{\infty} \sum_{\tau=0}^{(n-1)p} \sum_{\substack{\beta+\gamma+\dots+\lambda=\tau \\ \beta, \gamma, \dots, \lambda=0, 1, \dots, p}} \binom{p}{\beta} \binom{p}{\gamma} \times \dots \times \binom{p}{\lambda} \times \frac{(\sigma+1)(\sigma+2)\dots(\sigma+p)}{(n+1)p-\tau+\sigma} \frac{m^{(n+1)p+\sigma}}{((n+1)p-\tau+\sigma)((n+1)p-\tau+\sigma-1)\dots(np-\tau)(p-1)!}.$$

При производствѣ первого суммованія σ и τ сохраняютъ свое значеніе; поэтому первую сумму можно представить въ такомъ видѣ:

$$\frac{(\sigma+1)(\sigma+2)\dots(\sigma+p)}{(n+1)p-\tau+\sigma} \frac{m^{(n+1)p+\sigma}}{((n+1)p-\tau+\sigma)((n+1)p-\tau+\sigma-1)\dots(np-\tau)(p-1)!} \sum_{\beta+\gamma+\dots+\lambda=\tau} \binom{p}{\beta} \binom{p}{\gamma} \dots \binom{p}{\lambda}$$

Извѣстно, что эта сумма равна $\binom{(n-1)p}{\tau}$. ^{*)}

Результатъ первого суммованія можно, слѣдовательно, вы-

*.) Это вытекаетъ изъ тождества

$$\underbrace{(1+x)^p (1+x)^p \dots (1+x)^p}_{(n-1) \text{ разъ}} = (1+x)^{(n-1)p}.$$

Это тождество можетъ быть написано въ такомъ видѣ

$$\sum_{\beta=0}^{p-1} \binom{p}{\beta} x^\beta \sum_{\gamma=0}^{p-1} \binom{p}{\gamma} x^\gamma \dots \sum_{\lambda=0}^{p-1} \binom{p}{\lambda} x^\lambda = \sum_{\tau=0}^{(n-1)p} \binom{(n-1)p}{\tau} x^\tau.$$

Коэффиціентъ при x^τ въ лѣвой части равенъ

$$\sum_{\beta=0}^{p-1} \binom{p}{\beta} \binom{p}{\gamma} \dots \binom{p}{\lambda},$$

гдѣ суммованіе распространяется на всѣ возможныя слагаемыя, въ которыхъ $\beta + \gamma + \dots + \lambda = \tau$. Поэтому эта сумма равна $\binom{(n-1)p}{\tau}$.

разить такъ:

$$P < \sum_{\sigma=0}^{\infty} \sum_{\tau=0}^{(n-1)p} \binom{(n-1)p}{\tau} \frac{(\sigma+1)(\sigma+2) \dots (\sigma+p)m^{(n+1)p+\sigma}}{((n+1)p-\tau+\sigma) \dots (np-\tau)(p-1)!}$$

Приступимъ теперь къ суммованію по τ въ предѣлахъ отъ 0 до $(n-1)p$. Мы имѣемъ при этомъ рядъ слагаемыхъ, представляющихъ собой каждое произведеніе двухъ множителей, изъ которыхъ второй

$$\frac{(\sigma+1)(\sigma+2) \dots (\sigma+p)m^{(n+1)p+\sigma}}{((n+1)p-\tau+\sigma) \dots (np-\tau)(p-1)!}$$

возрастаетъ вмѣстѣ съ τ . Если мы въ каждомъ слагаемомъ въ этомъ множителѣ замѣнимъ τ его наибольшимъ значеніемъ $(n-1)p$, то сумма возрастаетъ; поэтому искомый результатъ суммованія по τ будетъ меньше, нежели

$$\begin{aligned} \sum & \frac{(\sigma+1)(\sigma+2) \dots (\sigma+p)m^{(n+1)p+\sigma}}{(2p+\sigma)(2p+\sigma-1) \dots p \cdot (p-1)!} \binom{(n-1)p}{\tau} = \\ & = \frac{(\sigma+1)(\sigma+2) \dots (\sigma+p)m^{(n+1)p+\sigma}}{(2p+\sigma)!} \sum_{\tau=0}^{(n-1)p} \binom{(n-1)p}{\tau} = \\ & = \frac{(\sigma+1)(\sigma+2) \dots (\sigma+p)m^{(n+1)p+\sigma}}{(2p+\sigma)!} \cdot 2^{(n-1)p}. \end{aligned}$$

Итакъ

$$P < \sum_{\sigma=0}^{\infty} \frac{(\sigma+1)(\sigma+2) \dots (\sigma+p)m^{(n+1)p+\sigma}}{(2p+\sigma)!} \cdot 2^{(n-1)p}.$$

Но каково бы ни было значеніе σ

$$\begin{aligned} & \frac{(\sigma+1)(\sigma+2) \dots (\sigma+p)}{(\sigma+2p)!} = \\ & = \frac{1}{(\sigma+p)!} \cdot \frac{\sigma+1}{\sigma+1+p} \cdot \frac{\sigma+2}{\sigma+2+p} \dots \frac{\sigma+p}{\sigma+p+p} < \frac{1}{(\sigma+p)!} < \frac{1}{\sigma!p!} \end{aligned}$$

Слѣдовательно

$$P < \frac{m^{(n+1)p} 2^{(n-1)p}}{p!} \sum_{\sigma=0}^{\infty} \frac{m^{\sigma}}{\sigma!}$$

или иначе

$$P < \frac{k^p}{p!} e^m,$$

гдѣ

$$k = 2^{n-1} m^{n+1}.$$

<http://vofel.ru>

Такъ какъ количество k есть постоянная величина, не зависящая отъ p , то количество $k^p : p!$ стремится къ нулю при неопределенномъ возрастаніи p . *)

Этимъ доказано высказанное выше утвержденіе, что, съ увеличеніемъ числа p , количество $R(\bar{a}, b, c \dots l)$ становится по абсолютной величинѣ меньше любого, сколь угодно малаго числа.

Результатъ всего изслѣдованія можетъ быть выраженъ такъ:

Если $a, b, c \dots l$ и α, β, λ суть цѣлые положительныя числа, отличные отъ нуля, p простое нечетное число, а N имѣть значеніе, опредѣляемое формулой (17), то

$$\begin{aligned} N &= S^p + pR \\ Ne^a &= pT_a + R(\bar{a}, b \dots l) \\ Ne^b &= pT_b + R(a, b, \dots l) \\ Ne^l &= pT_l + R(a, b, \dots \bar{l}), \end{aligned} \quad (35)$$

гдѣ

$$S = a \cdot b \cdot c \dots l,$$

$R, T_a, T_b \dots T_l$ суть цѣлые числа, а количества $R(\bar{a}, b \dots l)$, $R(a, b \dots l) \dots R(a, b, \dots \bar{l})$, при достаточно большомъ p , становятся менѣе всякаго заданнаго числа.

Отсюда слѣдуетъ, что

$$\begin{aligned} N(Ae^a + Be^b + \dots + Le^l + M) &= \\ = p(AT_a + BT_b + \dots + LT_l + MR) + MS^p + & \quad (36) \\ AR(\bar{a}, b, c \dots l) + BR(a, \bar{b} \dots l) + \dots + LR(a, b, c \dots \bar{l}). & \end{aligned}$$

Выберемъ теперь кратное число p настолько большимъ, чтобы, во первыхъ, оно не входило въ составъ произведенія MS^p , во вторыхъ, чтобы абоолютная величина суммы

$$AR(\bar{a}, b \dots l) + BR(a, \bar{b} \dots l) + \dots + LR(a, b \dots \bar{l})$$

была меньше 1. (Она можетъ быть сдѣлана менѣе любого задан-

*) Это обусловливается тѣмъ, что при достаточно большомъ значеніи p , которое мы обозначимъ черезъ p_1 , дробь $\frac{k}{p}$ становится меньше 1. Тогда

$$\frac{k^{p_1+p_2}}{(p_1+p_2)!} < \frac{k^{p_1}}{p_1!} \cdot \left(\frac{k}{p_1}\right)^{p_2},$$

т. е. съ возрастаніемъ p дробь $\frac{k^p}{p!}$, начиная съ p , убываетъ быстрѣе членовъ нисходящей геометрической прогрессіи съ знаменателемъ $\frac{k}{p_1}$.

наго числа). Тогда въ правой части равенства (36) мы будемъ имѣть три группы слагаемыхъ: первую группу составить сумма

$$p(AT_a + BT_b + CT_c + \dots + LT_l + MR),$$

это есть цѣлое число, кратное p ; вторую группу составлять слагаемое MS^r , не равное нулю (такъ какъ M и S отличны отъ нуля) и не кратное p ; наконецъ, третью группу составляютъ остальнаяя слагаемыя, сумма которыхъ составляетъ число, меньшее единицы. Складывая число кратное p съ числомъ некратнымъ p , мы получимъ цѣлое число, не равное нулю; прибавляя къ нему число, меньшее единицы, мы не можемъ получить нуля; поэтому число

$$Ae^a + Be^b + Ce^c + \dots + Le^l + M$$

не можетъ быть равно нулю. Этимъ доказано формулированное выше предложеніе и обнаружена трансцендентность числа e .

(Окончаніе слѣдуетъ).

Радіометръ Крукса съ катодными лучами.

Профессора Н. А. Гезехуса въ С.-Петербургѣ.

Въ „Вѣстникѣ Опытной Физики и Элем. Математики“ за 1898 г. № 8 была помѣщена замѣтка г. Бархова по поводу наблюдений, произведенныхъ мною и Н. Н. Георгіевскимъ и описанныхъ въ томъ же году и въ томъ же „Вѣстнике“; г. Барховъ думаетъ, что замѣченная нами перемѣна направлениія вращенія крыльевъ радиометра Крукса могла быть только кажущаяся, обусловленная прерывистостью освѣщенія. Это, разумѣется, въ нѣкоторыхъ случаяхъ могло быть и такъ. Въ нашихъ же опытахъ это было иначе. Недавно, опять вмѣстѣ съ Н. Н. Георгіевскимъ я имѣлъ возможность повторить прежніе опыты, имѣя на этотъ разъ подъ руками два радиометра, повидимому совершенно одинаковые; крылья у нихъ алюминіевые, покрытыя съ одной стороны слюдяными пластинками. Результаты этихъ опытовъ слѣдующіе:

1) Прежде всего бросилось въ глаза, что оба радиометра, при одной и той же румкорфовой катушкѣ, вращаются въ обратные стороны; въ одномъ изъ нихъ крылья вращались слюдою впередъ, а въ другомъ, напротивъ, впередъ металлическою поверхностью.—Это прямо показываетъ, что катодные лучи въ радиометрахъ играютъ далеко не главную роль; вращеніе зависитъ въ значительной степени и отъ температурныхъ и электростатическихъ вліяній, и косвеннымъ образомъ, следовательно, отъ степени разрѣженія, формы и размѣровъ частей прибора и т. п.

2) Взята была большая индукціонная катушка. Сперва оба радиометра вращались медленно въ тѣ же стороны, какъ и раньше при меньшей румкорфовой спирали. Но при усиленіи тока вра-

щеніе постепенно стало замедляться, наконецъ крылья совсѣмъ остановились, а затѣмъ начали вращаться въ обратныя стороны постепенно все скорѣе и скорѣе. Остаточное вращеніе, послѣ разобщенія радиометра съ индукціонной катушкой, продолжалось нѣсколько минутъ въ ту же сторону, какъ и подъ дѣйствіемъ тока. Если наклоненіемъ радиометра остановить вращеніе крыльевъ, то оно снова возобновляется, когда радиометръ устанавливается прямо, какъ это наблюдалось нами и раньше.

Что перемѣна направления вращенія во 2-омъ опыте, при большой катушкѣ, не была только кажущаяся, какъ это предполагалъ г. Барховъ, было для насть очевиднымъ, такъ какъ вращеніе было сперва очень медленнымъ и опыты производились при постоянномъ и сильномъ свѣтѣ вольтовой дуги.

Итакъ дѣйствительно радиометръ, независимо отъ дѣйствія катодныхъ лучей, можетъ вращаться и въ ту и въ другую стороны. Очевидно, слѣдовательно, на вращеніе въ радиометрѣ катодные лучи вліяютъ обыкновенно сравнительно слабо, какъ это показалъ, между прочимъ, и *H. Starke* (*Ann. der Physik.* 1900 г. В. 3. 101).

Остаточное продолжительное вращеніе въ радиометрѣ послѣ прекращенія тока обусловливается навѣрное тѣми же причинами, какъ и другія остаточные явленія въ разрѣженномъ воздухѣ, напр. свѣченіи (опытъ проф. И. И. Боргмана, показанный имъ въ Физ. Общ. 21 ноября 1900). Объ остаточныхъ дѣйствіяхъ упоминаютъ *Sandrucci* (см. *Beibl.* 1898. 602) и *Lenard* (*Ann. d. Ph.* 1900. В. 3. 308).

Упомянутыя причины предстоитъ еще выяснить. Можно думать однако, что они заключаются въ остаточныхъ электрическихъ разрядахъ, какъ объ этомъ было сказано въ первой статьѣ.

Январь 1901.

ОПЫТЫ И ПРИБОРЫ.


Нѣсколько опытовъ съ новымъ электроскопомъ.

Г. Э. Пфлаума въ Ригѣ.

Если разрѣзть заключающійся въ электроскопѣ воздухъ, то отталкиванія и притяженія листковъ становятся слабѣе по мѣрѣ приближенія къ нѣкоторому предѣлу разрѣженія; за этимъ предѣломъ они возрастаютъ тѣмъ болѣе, чѣмъ совершеніе достигнутая пустота. Это вполнѣ соотвѣтствуетъ давно извѣстному факту, что разрѣженные газы оказываютъ меньшее сопротивление теченію электричества, нежели газы нормальной упругости,

//vofem.ru

но что далѣе нѣкотораго предѣла проводимость ихъ все болѣе и болѣе уменьшается. Въ 1883 г. Worthington (см. Phil. Mag. 19, р. 218, 1885) приготовилъ приборъ съ сильно разрѣженнымъ воздухомъ и наблюдалъ, что находящійся въ немъ платиновый шарикъ сильно притягивался платиновою пластинкою,—однако въ моментъ прикосненія тѣль явились маленькая искра. Это обнаруживается, что степень пустоты въ приборѣ Worthington'a была удалена отъ абсолютной пустоты и даже отъ такъ называемой „непробиваемой“ пустоты еще довольно далеко. Нѣсколько совереннѣе въ этомъ отношеніи ниже описанный приборъ, продаваемый фирмой Müller-Unkel въ Брауншвейгѣ. Онъ состоять изъ двухъ соединенныхъ между собою частей: вакуумметра, т. е. цилиндрической трубки съ двумя впаянными въ нее платиновыми проволоками, концы которыхъ отстоятъ другъ отъ друга не далѣе одного миллиметра и собственного электроскопа. Послѣдній (см. фигуру) имѣть грушевидную форму; листки изъ алюминія дли-



но въ одинъ сантиметръ и шириной въ 2 миллиметра, они прикреплены къ алюминіевой плоской полоскѣ. Остріевъ и острыхъ реберъ нигдѣ нѣтъ, и изоляція всѣхъ проводящихъ частей самая лучшая. Теоретическая слѣдствія, вытекающая изъ опытовъ съ описаннымъ приборомъ, слѣдующія: пустота — совершенный изоляторъ, электростатическая явленія (притягивание, отталкиваніе и поляризациѣ) проявляются въ ней особенно явственно и передача электрическаго состоянія черезъ пустоту не сопровождается свѣтовыми явленіями. Хотя цѣна прибора довольно высокая — 35 марокъ, — но все-таки доступная и для кабинетовъ среднихъ учебныхъ заведеній. Позволимъ себѣ перечислить нѣсколько опытовъ, которые могутъ быть сдѣланы съ нимъ.

1. Чтобы убедиться въ томъ, до какой степени разрѣженъ оставшійся въ приборѣ воздухъ, соединяютъ вакуумметръ съ катушкою Румкорфа параллельно искромѣру. При искрахъ длиною до 10 сантиметровъ, т. е. *въ 100 разъ болѣе* разстоянія между электродами вакуумметра, въ приборѣ никакихъ свѣтовыхъ явлений не видно; если же повысить потенциалы разрядовъ далѣе названного предѣла, то возникаетъ флюоресценція стекла, свойственная Hittorf'овымъ (Круксовымъ) трубкамъ, значитъ въ этомъ случаѣ разряды уже проходятъ черезъ приборъ. При описанномъ только что опыте слѣдуетъ вставить между вакуумметромъ и электроскопомъ металлическій (напр. оловянный) листъ, соединенный съ землею, въ противномъ случаѣ повреждаются листки электроскопа.

2. Приборъ довольно чувствителенъ: поднесенное къ нему наэлектризованное тѣло вызываетъ расхожденіе листковъ уже на разстояніи многихъ дециметровъ; при слабѣйшемъ сотрясеніи стола, на которомъ стоитъ приборъ, листки замѣтно вздрогиваютъ. Благодаря этой чувствительности, приборъ обнаруживаетъ присутствіе весьма слабыхъ зарядовъ.

3. Приборъ можетъ служить для изслѣдованія электричества, возникающаго отъ тренія какихъ либо изоляторовъ или полупроводниковъ обѣ алюминіевый шарикъ электроскопа. Для этого достаточно провести изслѣдуемымъ тѣломъ слегка по шарику, листки моментально расходятся на уголъ въ 90° и больше. Такимъ образомъ можно изслѣдовать больше сотни тѣлъ въ продолженіи одного часа. Оказывается, что алюминій получаетъ положительный зарядъ относительно большинства тѣлъ, какъ то: относительно сѣры, сахара, каучука, гуттаперчи, янтаря, алебастра, колофона, резины, дерева, воска, гладкой бумаги, мрамора, пробки, цеплупоида, отшлифованного двойного шпата, сургуча, стеарина, кожи, шелка, бархата, шерсти и т. д. Электроотрицательно алюминіевый шарикъ заряжается отъ пропускной бумаги, стекла, волоса, фарфора, перломуutra, щетины, кварца, арагонита и проч. Аспидъ, кость, мѣль и др. не заряжаютъ электроскопа замѣтнымъ образомъ.

4. Обыкновенные общизвестные опыты легко удаются съ приборомъ, если же заряды поднесенныхъ къ прибору тѣлъ не очень слабы, то замѣчается конденсирующее дѣйствіе стеклянной оболочки, чѣмъ въ нѣкоторомъ смыслѣ усложняются явленія. Опишемъ здѣсь нѣсколько изъ такихъ явленій.

Если приблизить издали наэлектризованное тѣло, то листочки сперва отталкиваются, будучи заряжены электричествомъ приближаемаго тѣла, при дальнѣйшемъ же приближеніи тѣла, примѣрно до 20 сантиметровъ и менѣе, одноименное электричество переходить на стекло и листки заряжаются противоположнымъ электричествомъ. При этомъ на стеклѣ является зарядъ свободнаго электричества,веденіемъ котораго въ землю можно увеличить

уголь между листками. При соединении съ землею пуговки электроскопа листки или спадаютъ или же заряжаются послѣ разряженія электричествомъ приближенаго тѣла.

Если приблизить наэлектризованное тѣло къ листкамъ, т. е. снизу, то на большомъ разстояніи можно получить временное расхожденіе листковъ съ разноименнымъ электричествомъ; при меньшемъ разстояніи листки заряжаются одноименно (съ прибл. тѣломъ). И здесь, какъ въ предыдущемъ опытѣ, перемѣна знака заряда сопровождается замѣтнымъ вздрогиваніемъ листковъ. Если затѣмъ отвести въ землю шарикъ, то листки расходятся еще сильнѣе, при отведеніи стеклянной оболочки листки или разряжаются или заряжаются противоположнымъ электричествомъ.

Если наэлектризованное тѣло въ продолженіе нѣкотораго времени держать вблизи шарика или листковъ, при чёмъ стеклянная оболочка соединена съ землею, то листки притягиваются пластинкою, къ которой они прикреплены. Изъ этого видно, что листки могутъ принимать зарядъ, противоположный заряду пластинки; можетъ быть они нѣсколько уединены отъ пластинки тѣмъ матеріаломъ, которымъ они къ ней прикреплены.

5. Заставляя перескакивать искру на шарикъ, заряжаютъ электроскопъ разноименнымъ электричествомъ, одноименное электричество переходитъ на стекло; обыкновенно же послѣ перескакиванія искры листки расходятся не тотчасъ, а только послѣ отведенія въ землю электричества стеклянной оболочки; если же послѣ перескакиванія искры соединить съ землею шарикъ, то листки отталкиваются одноименнымъ электричествомъ. Заставляя перескакивать искру на стеклянную оболочку, видимъ, что листки пока еще не расходятся, по отведенію же оболочки они отталкиваются разноименнымъ электричествомъ, а по отведенію шарика—одноименнымъ.

6. Если шарикъ соединенъ съ землею и къ нему приближается наэлектризованное тѣло, то листки все-таки расходятся, они отталкиваются разноименнымъ (съ приближаемымъ тѣломъ) зарядомъ. Уголь между листками увеличивается, если затѣмъ отвести оболочку, но дѣлается равнымъ нулю, если снова отвести шарикъ. Если во время приближенія наэлектризованного тѣла, соединена съ землею оболочка, то листки заряжаются одноименно или не расходятся до отведенія пуговки, послѣ чего проявляется одноименный зарядъ.

Если приблизить наэлектризованное тѣло снизу, при чёмъ оболочка соединена съ землею, то листки заряжаются одноименно, если послѣ этого снова отвести оболочку, то листки расходятся съ разноименнымъ электричествомъ. По отведенію шарика одноименный зарядъ увеличивается. Если шарикъ отведенъ и наэлектризованное тѣло приближается къ листкамъ снизу, то листки расходятся, принявъ разноименный зарядъ, который увеличивается послѣ отведенія оболочки, но исчезаетъ послѣ отведенія шарика.

7. Описанные только что опыты ясно иллюстрируют конденсирующее и наводящее действие стеклянной оболочки. Листки, вследствие своих небольших размѣровъ, издали не видны, но такъ какъ стѣнки электроскопа вполнѣ прозрачны, безъ всякаго металлическаго осадка, то для демонстраціи опытовъ можно пользоваться проекціоннымъ приборомъ, при чьемъ кривизна стеклянной оболочки вовсе не мѣшаетъ.

8. Если вблизи электроскопа вызвать электрическія колебанія, то листки начинаютъ сильно вибрировать, при чьемъ, если источникомъ колебаній служить индукціонная катушка или трансформаторъ Tesla, листки мало по малу и независимо отъ перемѣнныхъ зарядовъ принимаютъ постоянный зарядъ. При пользованіи индукціонною катушкою постоянный зарядъ положителенъ или отрицателенъ, смотря по направленію прямыхъ токовъ; при употребленіи трансформатора Tesla постоянный зарядъ вблизи полюса (на разстояніи немногихъ сантиметровъ)—отрицательный, между тѣмъ какъ на большемъ разстояніи отъ полюса всякой разъ получается положительный зарядъ электроскопа.

РЕЦЕНЗІИ.

„Теорія Максвелля и Герцовскія колебанія.“ А. Пуанкаре. Переводъ подъ редакціей М. А. Шателена и В. К. Лебединскаго. С.-Петербургъ. 1900. (98 страницъ).

Научная теорія очень рѣдко становятся доступными такъ называемой большой публикѣ сейчасъ послѣ своего появленія на свѣтѣ. Должно пройти известное время пока идея, изложенная специальнymъ языкомъ, будетъ переведена на общепонятный. Вышесказанное примѣнено и къ теоріи электромагнитныхъ явленій Максвелля. До сихъ поръ въ учебникахъ господствуетъ старая теорія, по которой діалектрики не играютъ никакой существенной роли въ электрическихъ явленіяхъ. Восполнить этотъ пробѣлъ можетъ-быть поможетъ книжка Пуанкаре. Правда, въ нашей литературѣ есть уже статьи по этому предмету; такъ напримѣръ, рѣчь Столѣтова, произнесенная имъ на VIII съездѣ естествоиспытателей и врачей въ Петербургѣ въ 1890 г.¹⁾, следовательно, больше 11-ти лѣтъ тому назадъ; при всѣхъ своихъ выдающихся достоинствахъ, рѣчь эта не можетъ помочь ориентироваться въ данномъ вопросѣ, такъ какъ она очень коротка—всего 27 страницъ. Другая статья, посвященная тому же вопросу, на нашъ взглядъ, также мало отвѣчаетъ своему назначению; это очеркъ г. Постникова „О природѣ электромагнитныхъ явленій“, напечатанный въ „Сборнику статей въ помощь самообразованію“²⁾. Не-

¹⁾ „Общедоступныя Лекціи и Рѣчи“ Столѣтова. Москва. 1897. Рѣчь: „Эфиръ и Электричество“.

²⁾ Томъ I. Москва. 1898 г. Стр. 507—528.

чего и говорить, что при такой бѣдности литературы появление книжки Пуанкаре, известного французского физика и математика, на русскомъ языкѣ — въ высшей степени отрадное явленіе. Читатель найдетъ здѣсь вполнѣ элементарное изложеніе теоріи Максвелля и на ряду съ этимъ не мало очень интересныхъ новыхъ фактовъ. Несмотря на совершенное отсутствіе математики, изложеніе, какъ и слѣдовало ожидать, строго научное. Авторъ предполагаетъ знаніе физики въ размѣрѣ нѣсколько большемъ, чѣмъ курсъ нашихъ гимназій. Такъ, явленія дифракціи и поляризациіи предполагаются извѣстными. Принимая во вниманіе этотъ фактъ, можно только пожалѣть, что авторъ совершенно отказался отъ помощи математики: читатель, знакомый съ упомянутыми явленіями, владѣетъ *minimum* элементарной математикой. Также чувствуется недостатокъ въ чертежахъ, во всей книжкѣ ихъ всего пять.

Относительно русского перевода нельзѧ, къ сожалѣнію, сказать ничего утѣшительного. Онъ сдѣланъ такимъ тяжелымъ языкомъ, что часто приходится задумываться надъ конструкціей фразы. Мѣстами встрѣчаются и недосмотры (объ опечаткахъ, понятно, и говорить нечего), какъ напр.: на стран. 66 (строка 16 снизу) вместо „самое“ напечатано „саму“, на стран. 96 (строка 1 сверху) вместо „сразу“ — „заразъ“ и т. п. Кромѣ того, на нашъ взглядъ, французское слово „projecteur“ слѣдуетъ перевести словомъ „проекторъ“, а не „прожекторъ“ (стран. 65, строка 1 сверху); вѣдь мы не говоримъ „прожектъ“, „прожекція“, а — „проектъ“, „проекція“. Так же мы находимъ неудобнымъ передавать иностранныя имена русскими буквами; одно и то же имя de la Rive переводчикъ передаетъ, въ различныхъ мѣстахъ книги, различно: де ла Ривъ и де Ларивъ. *)

Д. Шоръ (Геттингенъ).

НАУЧНАЯ ХРОНИКА.

Телефонографъ. Телефоны, употреблявшіеся до недавняго времени, страдали, какъ извѣстно, тѣмъ существеннымъ недостаткомъ, что на значительныхъ разстояніяхъ (свыше 1000 километровъ) передаваемая рѣчь становилась неясной и непонятной, вслѣдствіе слабости звука. Но благодаря изобрѣтенію нового микрофона, явилась возможность не только разговаривать на громадныхъ разстояніяхъ (телефономъ соединены теперь Берлинъ—Парижъ—Бордо), но и фиксировать передаваемую рѣчь на валикахъ фонографа, благодаря значительной силѣ звука.

Въ послѣднее время сдѣлано не мало остроумныхъ попытокъ связать телефонъ и фонографъ;— другими словами, изобрѣтатели старались придумать приборъ, который могъ бы быть названъ *телефонографомъ* или *телефрафономъ*.

*) Редакція изъ раздѣляетъ мнѣнія рецензента, что иностранная фамилія неудобно печатать русскими буквами; но принявши опредѣленное русское начертаніе, слѣдуетъ его, конечно, держаться.

Связать телефонъ или фонографъ съ пишущей машиной такъ, чтобы рѣчъ записывалась на бумагѣ съ такой же скоростью, съ какой она произносится, и по сей день остается неразрѣшимой задачей, несмотря на всѣ усилия изобрѣтателей съ Эдиссономъ въ главѣ.

Всеобщее вниманіе обратило на себя открытие, сдѣланное датскимъ инженеромъ Waldemar'омъ Poulsen'омъ, которое, какъ полагаютъ специалисты, далеко подвинуло впередъ рѣшеніе вышеизложенной задачи. Открытие это, сверхъ того, должно внести очень многое въ такъ называемую „технику слабыхъ токовъ“ (Schwachstrom-Technik). Основная идея этого открытия относится къ учению о магнитизмѣ.

Если мы станемъ натирать постояннымъ магнитомъ желѣзную или стальную пластинку, въ которой находится нѣкоторое количество остаточного магнитизма, то въ тѣхъ мѣстахъ, въ которыхъ мы касались магнитомъ, сила остаточного магнитизма будетъ измѣняться. Это не трудно провѣрить на опытѣ. Если мы покроемъ пластинку равномѣрнымъ слоемъ желѣзныхъ опилокъ, то послѣ натирания магнитомъ слой опилокъ измѣнится въ тѣхъ мѣстахъ, которыя были натерты магнитомъ. Вызванное такимъ образомъ измѣнение толщины слоя опилокъ останется до тѣхъ поръ, пока какая-либо внѣшняя причина, напр., новое натирание, не измѣнить распределенія магнитизма въ пластинкѣ и тѣмъ самымъ расположенія опилокъ на ней.

Инженеръ Poulsen, напалъ на мысль воспользоваться этимъ для телефона. Телефонъ заканчивается, какъ извѣстно, электромагнитомъ, отражающимъ звуковыя колебанія. Представимъ себѣ стальную проволоку, передвигающуюся между полюсами электромагнита, въ то время какъ телефонъ находится въ дѣйствіи. Наводящее дѣйствіе электромагнита измѣняетъ распределеніе магнитизма въ проволокѣ, усиливая его въ однихъ мѣстахъ и ослабляя въ другихъ, смотря по тѣмъ колебаніямъ, которыя онъ самъ испытываетъ. Проволока сохраняетъ такимъ образомъ — если можно такъ выразиться — магнитную запись человѣческой рѣчи. Если затѣмъ съ тою же скоростью проводить эту проволоку между полюсами электромагнита, то она будетъ вызывать въ его обмоткѣ токъ, напряженіе котораго будетъ колебаться въ зависимости отъ меняющаго напряженія тока въ различныхъ частяхъ проволоки. Электромагнитъ будетъ отражать магнитную запись, которую несетъ проволока, а его якорь вновь вызывать тѣ звуковыя колебанія, которыми эта запись была произведена. Къ этому нужно прибавить, что проволока сохраняетъ эту запись до тѣхъ поръ, пока въ ней будетъ возстановлено равномѣрное распределеніе магнитизма какой либо внѣшней силой; проще всего это достигается тѣмъ, что чрезъ нее пропускаютъ токъ отъ сухой батареи.

На приборѣ Поульсена длинная проволока толщиною въ 1 mm наматывается съ небольшими промежутками на мѣдный барабанъ, который можетъ быть приведенъ въ быстрое вращеніе.

Въ то время, когда говорять въ микрофонъ, проволока, скользящая мимо катушекъ телефона, намагничивается въ различныхъ своихъ частихъ различнымъ образомъ, благодаря индукционнымъ токамъ катушекъ; и на проволокѣ какъ бы образуются магнитные возвышенности и впадины.

Значеніе такого приспособленія при телефонѣ можетъ быть очень велико. Владѣльца телефона можетъ не быть, когда говорятъ въ его телефонѣ; но стальной прутъ запишетъ все, что было сказано, и по возвращеніи хозяина передастъ ему все, что нужно.

РАЗНЫЯ ИЗВѢСТИЯ.

Премія Нобеля. Какъ нашимъ читателямъ извѣстно, покойный шведскій инженеръ *Dr. Alfr. Bernh. Nobel* завѣщалъ свое громадное состояніе для учрежденія премій. Его состояніе должно было быть реализовано, и съ процентовъ полученнаго капитала ежегодно выдаваться 5 премій: 1) за лучшую работу по физикѣ; 2) за лучшую работу по химії; 3) за лучшую работу по физіологіи или медицинѣ; 4) за самое выдающееся „въ идеальномъ отношеніи“ литературное произведение; и 5) за наиболѣе продуктивную дѣятельность съ цѣлью достиженія всеобщаго мира. — До сихъ поръ воля покойного не была выполнена вслѣдствіе многочисленныхъ препятствій и трудностей, изъ которыхъ главная была реализація имущества. Въ настоящее время работы по этому дѣлу приведены въ порядокъ въ такой мѣрѣ, что мы можемъ сообщить нашимъ читателямъ нѣкоторыя небеззинтересныя подробности. Присужденіемъ первыхъ двухъ премій (физика и химія) завѣдуетъ „Королевская Академія для Естественныхъ Наукъ“ въ Стокгольмѣ. Для испытанія работъ выбираются изъ среды ея членовъ два комитета.— 1) Для физики комитетъ состоитъ въ настоящее время изъ слѣдующихъ членовъ: *Dr. K. B. Hasselberg*, профессоръ физики и астрономіи въ Стокгольмѣ (предсѣдатель); *Dr. T. R. Thalen*, заслуженный профессоръ физики и механики въ Упсалѣ; *Dr. H. H. Hildebrandsson*, экстраординарный профессоръ метеорологіи въ Упсалѣ; *Dr. K. J. Angström*, профессоръ физики въ Упсалѣ; *Dr. S. A. Arrhenius*, профессоръ физики въ Стокгольмскомъ политехникумѣ. — 2). Для химіи: *Dr. P. Th. Cleve*, профессоръ химіи въ Упсалѣ (предсѣдатель); *Dr. J. P. Klason*, профессоръ въ Стокгольмскомъ политехникумѣ; профессоръ *Dr. H. G. Söderbaum*, директоръ агрономическаго отдѣленія Стокгольмской земледѣльческой академіи; *Dr. S. O. Pettersson*, профессоръ химіи въ Стокгольмскомъ политехникумѣ; *Dr. K. O. Widman*, экстраординарный профессоръ химіи въ Упсалѣ.

Премія будетъ выдаваться за работу (открытие, изобрѣтеніе или сочиненіе), на которую укажетъ комитету одно изъ имѣющихъ на то право лицъ и которую комитетъ сочтетъ достойной

премії. Правомъ предлагать кандидатовъ обладаютъ слѣдующія лица (мы, конечно, говоримъ только о физикѣ и химіи):

1. Всѣ члены Стокгольмской „Академіи для Естественныхъ Наукъ“. 2. Члены вышеназванныхъ двухъ комитетовъ. 3. Тѣ изслѣдователи, которые получили отъ „Академіи для Естественныхъ Наукъ“ Нобелевскую премію. 4. Ординарные и экстраординарные профессора физики и химіи университетовъ въ Упсалѣ, Лундѣ, Христіанії, Копенгагенѣ и Гельсингфорсѣ; Стокгольмской Медицинской Академіи и Королевскаго Политехникума. 5. Лица, занимающія каѳедры физики и химіи въ тѣхъ иностранныхъ университетахъ и политехникумахъ, которые ежегодно будутъ избираться „Академіей Естественныхъ Наукъ“ въ Стокгольмѣ. На 1901 годъ послѣдняя избрала университеты: *Берлинский, Вѣнскій, Парижскій, Лондонскій, С.-Петербургскій, Римскій, Лейденскій, Чикаскій* и кромѣ того *Цюрихскій политехникумъ*. 6. Всѣ другіе ученые, которымъ „Академія для Естественныхъ Наукъ“ найдетъ цѣлесообразнымъ дать это право.

Премія будетъ выдаваться безъ различія національности за работу (открытие, изобрѣтеніе или сочиненіе), давшую *новѣтствіе резульматы*. Но и болѣе старыя работы могутъ быть приняты во вниманіе, если они получили *значеніе только въ послѣднее время*. Работа умершаго можетъ быть премирована только въ томъ случаѣ, если его кандидатура была поставлена до его смерти. „Академія Естественныхъ Наукъ“ можетъ, если найдетъ цѣлесообразнымъ, присудить премію не отдѣльному лицу, а цѣлому учрежденію.

Ежегодно въ день смерти Нобеля (10-го декабря¹⁾) будетъ происходить торжественное засѣданіе „Академіи“, на которомъ будетъ возвѣщаться имя получившаго премію и всѣхъ кандидатовъ. Кроме денежной суммы премія содержитъ еще дипломъ и золотую медаль съ портретомъ Нобеля и соотвѣтствующую надписью. Получившій премію обязанъ прочесть въ Стокгольмѣ публичный докладъ въ дополненіе къ премированной работе не позже, чѣмъ черезъ полѣ-года послѣ 10-го декабря. Каждая изъ выдаваемыхъ премій должна быть не менѣе трехъ пятихъ ежегодного дохода съ суммы, которую располагаетъ для этой цѣли „Академія“, и можетъ быть раздѣлена, въ крайнемъ случаѣ, на три части²⁾. Если работа принадлежитъ несколькимъ лицамъ, то сумма выдается имъ вмѣстѣ.—Если „Академія“ не найдетъ достойной преміи работы, то сумма, предназначавшаяся для преміи, присовокупляется къ основному капиталу; если то же повторится еще разъ, то изъ этой суммы образуютъ отдѣльный фондъ для поддержки ученыхъ, уже оказавшихъ наукѣ пользу. Но, по меньшей мѣрѣ, одинъ разъ въ пять лѣтъ премія должна быть присуждена.

¹⁾ Въ первый разъ въ настоящемъ, 1901, году.

²⁾ Реализація имущества Нобеля еще не вполнѣ закончена; несмотря на это, каждая отдѣльная премія опредѣляется теперь, въ 1901 году, приблизительно въ 200.000 марокъ т. е. около 100.000 рублей.

Для помоци вышеупомянутымъ Нобелевскимъ комитетамъ „Академіи для Естественныхъ Наукъ“, при послѣдней учреждены особые институты, въ которыхъ могутъ занимать должности лица различныхъ національностей, равно какъ и женщины. „Нобелевскій Институтъ Академіи для Естественныхъ Наукъ“ еще только строится; въ этомъ учрежденіи будутъ провѣряться и изучаться тѣ работы, которыя будутъ предложены, какъ достойны премій, однимъ изъ имѣющихъ на то право лицъ (см. выше). Въ специальнѣ для этой цѣли построенному зданію будутъ находиться двѣ лабораторіи — физическая и химическая, залъ для засѣданій обоихъ вышеупомянутыхъ комитетовъ, библіотека и архивъ. Для устройства этого института отпущено пока 340.000 марокъ, а затѣмъ будетъ ежегодно выдаваться приблизительно четверть дохода съ капитала, имѣющагося въ распоряженіи „Академіи.“ Кромѣ того $\frac{1}{10}$ этого дохода будетъ ежегодно присовокупляться къ основному капиталу.

Управлениe всего „Нобелевскаго Учрежденія“ сосредоточивается въ настоящее время въ рукахъ слѣдующихъ пяти лицъ: 1) Бывшій шведскій министръ-президентъ *E. G. Boström* (предсѣдатель); юристъ *H. Santenon* (управляющій); инженеръ *R. Sahlman*; историкъ и бывшій министръ финансовъ *Dr. H. L. Forssell*; депутатъ рейхстага и повѣренный государственного банка *Dr. H. R. Törebladh*. Секретаремъ управлениe назначенъ юристъ баронъ *K. F. v. Otter*.

Въ этомъ году будутъ обсуждаться работы, предложенные не позже 12 февраля кѣмъ либо изъ лицъ, имѣющихъ на то право.

ЗАДАЧИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ.

№ 7 (4 сер.). Даны три прямые. Провести въ данномъ направлениe сѣкущую, встрѣчающую эти прямые въ трехъ точкахъ x , y , z , такъ, чтобы имѣло мѣсто равенство:

$$xy^2 = xz \cdot yz.$$

И. Александровъ (Тамбовъ).

№ 8 (4 сер.). Какой изъ треугольниковъ, вписанныхъ въ данный круговой секторъ, меньшій четверти окружности, и имѣющихъ одну изъ вершинъ въ данной точкѣ M дуги сектора, имѣть наименьшій периметръ? Доказать, что периметръ искомаго треугольника не зависитъ отъ положенія точки M на дугѣ данного сектора.

Я. Полушкинъ (Знаменка).

№ 9 (4 сер.). Доказать, что числа вида $3n-1$, $5n+2$, $5n-2$, $7n+3$, $7n-1$, $7n-2$, где n число цѣлое, не могутъ быть точными квадратами.

В. Раздарскій (Владикавказъ).

№ 10 (4 сер.). Сколько литровъ водяного пара при температурѣ 100° и давлении 76 см. надо сгустить въ 2 куб. метрахъ воды, чтобы повысить температуру этой воды съ 20° до 80° ? Плотность водяного пара $\frac{5}{8}$; скрытая теплота его испаренія при 100° равна 537.

М. Гербановский (Владимиръ).

Рѣшенія задачъ.

№ 587 (3 сер.). Построить треугольникъ, когда даны: основаніе, точка касанія его съ окружностью, вписанной въ искомый треугольникъ, и уголъ при вершинѣ.

Пусть ABC искомый треугольникъ, α, β, γ — соответственныя точки прикосновенія сторонъ BC, CA, AB съ вписанной окружностью, $BC, \angle A$ и x —даннія основаніе, уголъ и точка прикосновенія. Такъ какъ

$$A\beta = A\gamma, B\gamma = B\alpha, C\alpha = C\beta,$$

$$AB - AC = A\gamma + B\gamma - A\beta - C\beta = B\alpha - C\alpha.$$

Такимъ образомъ вопросъ приводится къ рѣшенію извѣстной задачи: по основанію, углу при вершинѣ и разности двухъ другихъ сторонъ построить треугольникъ. На данной сторонѣ BC строимъ сегментъ, вмѣщающій уголъ A , и второй сегментъ, вмѣщающій уголъ $\frac{\pi}{2} + \frac{A}{2}$ и лежацій внутри первого сегмента. Изъ точки B на дугѣ второго сегмента въ точкѣ M дѣлаемъ засѣчку радиусомъ $B\alpha - C\alpha$ (полагая $B\alpha > C\alpha$); прямая BM встрѣтить первый сегментъ въ точкѣ A , и треугольникъ ABC есть искомый.

А. Я. (Екатеринбургъ); П. Давидсонъ (Житомиръ).

№ 607 (3 сер.). Черезъ данную точку даннѣмъ радиусомъ провести окружность, встрѣчающую двѣ даннѣя параллельныя прямые по хордѣ данной длины.

Пусть M —данная точка, L и L' —даннѣя параллельныя прямые. Предположимъ, что задача рѣшена; пусть O —центръ искомой окружности, AB —данна по длини хорда окружности O , содержащаяся между параллельными пряммыми, причемъ точка A предполагается лежащей на прямой L .

Черезъ произвольную точку A' прямой L проведемъ прямую, параллельную прямой AB до пересѣченія ея въ точкѣ B' съ прямой L' (точка B' есть также одна изъ точекъ пересѣченія съ прямой L' окружности, описанной изъ точки A' , какъ изъ центра, радиусомъ, равнымъ данной длине хорды). Въ срединѣ отрѣзка $A'B'$ проводимъ къ нему перпендикуляръ и на немъ дѣлаемъ изъ точки A' радиусомъ AO засѣчку въ точкѣ O' такъ, чтобы расположение точекъ A, B, O и точекъ $A'B'O'$ было соотвѣтственное. Затѣмъ изъ точки O' радиусомъ $O'A'$ описываемъ окружность, которая пройдетъ и чѣрезъ точку B' . Треугольники ABO и $A'B'O'$ равны по тремъ сторонамъ; слѣдовательно $\angle B'A'O' = \angle BAO$, откуда, въ виду вышеуказанного замѣчанія о положеніи точки O' , вытекаетъ равенство и соотвѣтственное положеніе угловъ, образуемыхъ прямой L съ пряммыми AO и $A'O'$, а слѣдовательно и параллельность равныхъ отрѣзковъ OA и $O'A'$. Поэтому пряммы OO', L и L' параллельны. Проведя черезъ точки O' и M пряммы, параллельныя соотвѣтственно прямымъ OM и $O'O'$, получимъ параллелограммъ $O'M'MO$, а слѣдовательно $O'M = OM = O'A'$, такъ что точка M' лежитъ на окружности O' . Итакъ радиусъ OM искомой окружности параллеленъ прямой, соединяющей центръ O' съ одной изъ точекъ пересѣченія окружности O' и прямой, проходящей черезъ точку M и параллельной прямой L .

Отсюда вытекаетъ построеніе при помощи метода параллельнаго перенесенія. Изъ произвольной точки A' прямой L' дѣлаемъ засѣчку въ точкѣ B' на прямой L радиусомъ, равнымъ данной длине хорды. Строимъ (см. анализ задачи) точку O' или симметричную ей относительно прямой $A'B'$ точку O'' . Изъ точки O' описываемъ даннымъ радиусомъ окружность и находимъ точки пересѣченія ея M' и M'' съ прямой MX , проходящей черезъ точку M и параллельной прямой L , затѣмъ черезъ точку M проводимъ прямую, параллельную радиусамъ $O'M'$ и $O'M''$, до пересѣченія ихъ съ прямую

$O'Q$, параллельной прямой L , въ точкахъ O и O_1 *); каждая изъ этихъ точекъ есть центръ окружности, удовлетворяющей условію задачи; доказать это предоставляемъ читателю. Окружность O'' даетъ вообще еще два рѣшенія.

Выбравъ точку A' произвольно на прямой L , можно хордѣ $A'B'$ вообще дать два положенія, что безразлично для числа рѣшеній, такъ какъ оба положенія даютъ одну и ту же прямую $O'Q$ и тѣ же направлениа радиусовъ $O'M'$ и $O'M''$.

В. Толстовъ (Тамбовъ); *Б. Мерцаловъ* (Орелъ); *В. Шмыгинъ* (Урюпино); *И. Кудинъ* (Москва).

№ 613 (3 сер.). Черезъ данную точку провести окружность, встречающую данные три параллельные прямые по двумъ хордамъ данной длины.

Пусть L, L', L'' —данная параллельные прямые, a и b —данная длины хордъ, содержащіяся соответственно между пряммыми L, L' и L', L'' . Задача решается, подобно № 607 (3 сер.) методомъ параллельного перенесенія. Предоставляя анализ задачи читателю, приводимъ ея синтезъ вмѣстѣ съ доказательствомъ. Изъ произвольной точки A прямой L дѣлаемъ радиусомъ a засѣчку на прямой L' въ точкѣ B , а изъ точки B радиусомъ b —засѣчку на L'' въ точкѣ C . Черезъ точки A, B, C (если это возможно) проводимъ окружность; пусть O' ея центръ. Черезъ точки M и O' проводимъ прямые MP и $O'Q$, параллельныя прямой L . Пусть M' и M'' суть точки пересѣченія окружности O' съ прямой MP ; тогда, проведя черезъ точку M двѣ прямые, параллельныя соответственно прямымъ $O'M'$ и $O'M''$, получимъ соотвѣтственныя точки пересѣченія O и O_1 *) этихъ прямыхъ съ прямой $O'O$. Окружности, описанные изъ центровъ O и O_1 радиусами $OM=O_1M$, удовлетворяютъ условію задачи. Дѣйствительно, эти окружности имѣютъ данный радиусъ; кромѣ того, если изъ центра O проведемъ прямые OX, OY и OZ , соотвѣтственно параллельныя прямымъ $O'A'$, $A'B'$ и $O'C'$, и назовемъ соотвѣтственные точки встрѣчи прямыхъ OX, OY и OZ съ пряммыми L, L' и L'' черезъ A, B и C , то изъ полученныхъ при этомъ построеніи параллелограммовъ найдемъ, что $OA=O'A'=OB=O'B'=OC=O'C'$, т. е. точки A, B, C лежать на окружности O . Кромѣ того отрѣзки AA' и BB' равны и параллельны отрѣзку $O'O'$, откуда слѣдуетъ, что $AB=A'B'$. Точно также убѣдимся, что $BC=B'C'$. Различный выборъ засѣчекъ B' и C' даетъ четыре комбинаціи, а каждому положенію треугольника $A'B'C'$ отвѣчаютъ по предыдущему два рѣшенія. Но рѣшеній вообще 4, а не 8, такъ какъ два положенія треугольника $A'B'C'$, симметричны относительно перпендикуляра къ L , даютъ ту же прямую $O'Q$ и тѣ же направлениа радиусовъ $O'M'$ и $O'M''$; доказать это предоставляемъ читателю.

В. Толстовъ (Тамбовъ); *Б. Мерцаловъ* (Орелъ); *В. Шмыгинъ* (Урюпино).

№ 601 (3 сер.). Найти ариѳметическую прогрессію, въ которой средняя ариѳметическая всякихъ и первыхъ членовъ равна числу этихъ членовъ.

Обозначая n -ї членъ прогрессіи черезъ u_n , а сумму n первыхъ членовъ черезъ S_n , имѣемъ:

$$\frac{S_n}{n} = n, \quad (1)$$

откуда

$$S_n = n^2, \quad S_{n-1} = (n-1)^2, \quad u_n = S_n - S_{n-1} = 2n - 1.$$

Искомая прогрессія можетъ оказаться лишь рядомъ нечетныхъ чиселъ 1, 3, 5, 7 . . . , который дѣйствительно удовлетворяетъ равенству (1).

В. Толстовъ (Тамбовъ); *Л. Галтеринъ* (Бердичевъ); *В. Шмыгинъ* (Урюпино); *Б. Мерцаловъ* (Орелъ); *Ѳ. Дмитріевъ* (Новочеркасскъ); *П. Даудсонъ* (Житомиръ).

*) Такое построение удобнѣе для доказательства; конечно, точки O и O_1 можно найти проще, сдѣлавъ изъ M засѣчку на прямой $O'Q$ даннымъ радиусомъ.

*) См. примѣчаніе къ рѣшенію задачи № 607.

№ 602 (3 сер.). Построить прямоугольный треугольник, зная медіаны одного изъ катетовъ та и гипотенузы m_c .

Пусть ABC есть искомый треугольникъ съ прямымъ угломъ C ; пусть $CD = m_c$ и $AE = m_a$ суть данная медіаны, O —точка ихъ пересѣченія. Тогда

$$AO = \frac{2}{3} AE = \frac{2}{3} m_a, \quad OD = \frac{1}{3} CD = \frac{1}{3} m_c, \quad AD = DB = CD = m_c.$$

Такимъ образомъ въ треугольникѣ AOD известны его стороны. Отсюда вытекаетъ построение: строимъ треугольникъ AOD по тремъ сторонамъ, описываемъ изъ точки D , какъ изъ центра, окружность радиусомъ $DA = m_c$ и продолжаемъ сторону OD до пересѣченія съ этой окружностью єзвъ точкѣ C ; треугольникъ ACB есть искомый.

В. Толстой (Тамбовъ); **Л. Галлеринъ** (Бердичевъ); **В. Шлыгинъ** (Урюпино); **Б. Мерцаловъ** (Орелъ); **Ф. Дмитриевъ** (Новочеркасскъ); **П. Полушкинъ** (Знаменка).

№ 603 (3 сер.). Рѣшить уравненіе

$$(1+x)^7 + (1-x)^7 = 128.$$

Перенеся 128 въ первую часть уравненія, раскрывъ скобки, сдѣлавъ приведеніе и раздѣливъ обѣ части уравненія на 7, находимъ:

$$x^6 + 5x^4 + 3x^2 - 9 = 0,$$

или

$$(x^6 - x^4) + (6x^4 - 6x^2) + (9x^2 - 9) = (x^2 - 1)(x^4 + 6x^2 + 9) = (x^2 - 1)(x^2 + 3)^2 = 0.$$

Слѣдовательно, или $x^2 - 1 = 0$ или $x^2 + 3 = 0$, откуда

$$x_1 = 1, \quad x_2 = -1, \quad x_3 = i\sqrt{3}, \quad x_4 = -i\sqrt{3}.$$

В. Толстой (Тамбовъ); **П. Кунда** (Гродно); **Ф. Дмитриевъ** (Новочеркасскъ); **П. Полушкинъ** (Знаменка); **П. Даудсонъ** (Житомиръ).

№ 611 (3 сер.). Определить площадь трапеции по четыремъ ея сторонамъ.

Пусть a, b —длины параллельныхъ, c и d —длины непараллельныхъ сто ронъ трапеци, h —ея высота. Если черезъ конецъ одной изъ непараллельныхъ сторонъ проведемъ прямую, параллельную другой непараллельной сторонѣ, то получимъ треугольникъ со сторонами, равными c, d и $a-b$ (полагая $a > b$), высота которого, если принять за основание сторону $a-b$, равна h . Поэтому

$$\frac{(a-b)h}{2} = \frac{1}{4} \sqrt{(b+c+d-a)(a+c+d-b)(a-b+c-d)(a-b+d-c)},$$

откуда

$$h = \frac{1}{2(a-b)} \cdot \sqrt{(b+c+d-a)(a+c+d-b)(a-b+c-d)(a-b+d-c)}.$$

Слѣдовательно площадь трапеции равна

$$\frac{a+b}{4(a-b)} \cdot \sqrt{(b+c+d-a)(a+c+d-b)(a-b+c-d)(a-b+d-c)}.$$

Л. Галлеринъ (Бердичевъ); **Б. Мерцаловъ** (Орелъ); **В. Шлыгинъ** (Урюпино).

Обложка
ищется

Обложка
ищется