

Обложка
ищется

Обложка
ищется

ВѢСТНИКЪ ОПЫТНОЙ ФИЗИКИ и ЭЛЕМЕНТАРНОЙ МАТЕМАТИКИ.

№ 201.

Содержание: Послѣдствіе въ физическомъ мірѣ. Проф. *П. Бахметьевъ*.—Очеркъ геометрической системы Лобачевского (продолженіе). *В. Кацана*.—Научная хроника. *В. Г.*—Доставленныя въ редакцію книги и брошюры.—Задачи на испытанияхъ зрености.—Задачи №№ 126—131.—Рѣшенія задачъ 2-ой сер. №№ 467, 517, 582, 583 и 3-ей сер. №№ 17, 39, 42, 43, 45, 46.—Полученные рѣшенія задачъ.—Обзоръ научныхъ журналовъ. *Д. Е.*—Библиографический листокъ новѣйшихъ русскихъ изданій.—Библиографический листокъ новѣйшихъ нѣмецкихъ изданій.—Отвѣты редакціи. Объявленія.

ПОСЛѢДСТВІЕ ВЪ ФІЗИЧЕСКОМЪ МІРѢ.

Слово „послѣдствіе“ есть переводъ нѣмецкаго термина „Nachwirkung“, введенаго въ науку въ первый разъ *В. Веберомъ* въ 1835 году. Онъ подвергалъ коконовую нить постоянному дѣйствію опредѣленнаго груза и наблюдалъ, что нить каждый день становилась все длиннѣе и длиннѣе, хотя грузъ и оставался постояннымъ. Когда грузъ былъ снятъ, то коконовая нить не сейчасъ приняла свою первоначальную длину, а приблизжалась къ ней очень медленно. Это то явленіе онъ и называлъ *послѣдствіемъ*.

Послѣдствіе противорѣчитъ теоріи упругости, такъ какъ въ ней деформація не зависитъ отъ продолжительности дѣйствія вѣнѣшней силы; въ виду этого вопросъ этотъ разрабатывался послѣ многими физиками, изъ которыхъ назову здѣсь *Кольрауша*, *Стрейнца*, *Апртона* и *Перри* и друг., но систематически разобралъ его проф. *Гезехусъ* (1882), взявъ объектами изслѣдованія свинцовую проволоку, каучуковый шнурокъ и палладиевую проволоку, поглотившую водородъ. Кромѣ того его заслуга состояла въ обобщеніи явленій, повидимому очень разнородныхъ, но которыхъ подчиняются одному и тому же закону послѣдствія.

Цѣль настоящей статьи—познакомить читателя съ мало известнымъ явленіемъ послѣдствія, но въ то же время заслуживающимъ интереса въ виду той обширной роли, какую оно играетъ въ природѣ.

Чтобы дать представление объ *упругомъ послѣдствіемъ*, я приведу здѣсь мои наблюденія надъ кадміевой проволокой 0,944 мм. въ диаметрѣ и 232,20 мм. длиной (т. е. между двумя марками).

Наблюдения дѣлались при помощи катетометра, допускавшаго измѣрение съ точностью до 0,01 мм. Проволока была подвержена растяженію грузомъ въ 907 гр. Въ приведенной таблицѣ въ рубрикѣ „время“ числа означаютъ, сколько часовъ прошло отъ начала подвѣшиванія груза, t означаетъ температуру проволоки, а Δl увеличеніе длины проволоки въ мм.

время	t	Δl	время	t	Δl
0 ^h ,00'	10,1°	0,00	94 ^h ,00'	13,8	35,70
0.40	10,1	0,40	95.30	15,4	35,20?
1.00	10,2	0,96	99.35	16,2	36,68
1.40	10,2	1,28	114.00	12,2	41,12
2.15	10,2	1,40	115.45	13,0	41,60
2.45	10,2	1,72	116.30	13,6	41,74
3.15	10,3	2,28	117.20	14,2	42,48
3.35	10,3	2,32	120.25	16,0	43,60
4.10	10,6	2,52	138.15	13,2	49,40
19.30	9,5	8,78	141.00	15,8	50,14
20.10	10,0	9,04	143.30	16,5	51,44
21.05	10,6	9,06	146.00	16,7	52,22
22.10	11,5	10,10	163.15	15,0	58,54
24.20	12,6	10,36	170.15	15,5	61,08
27.05	14,6	11,94	171.30	15,6	61,10
44.20	10,5	17,80	183.15	14,2	66,56
49.55	15,0	19,84	189.30	14,7	67,36
50.30	15,5	20,42	192.00	15,1	68,44
69.10	12,7	26,36	195.20	14,5	69,98
70.10	13,5	26,90	216.05	12,8	76,54
76.15	—	29,40	218.40	13,0	78,04
91.15	12,2	34,00	219.35	15,0	78,10.
93.00	13,0	34,46			

Эти числа приведены здѣсь въ извлечениі, такъ какъ наблюденія, которыя я распространилъ на 18 проволокъ изъ различныхъ металловъ, еще не окончены.

Изъ этой табл. видно, что кадміевая проволока удлинялась вслѣдствіе послѣдѣйствія очень сильно, и по прошествіи около 220 часовъ это удлиненіе достигло болѣе 30%.

Если мы представимъ это явленіе графически (ордината = Δl , абсцисса = время), то замѣтимъ, что вначалѣ послѣдѣйствіе было очень сильно, но затѣмъ стало слабѣть все болѣе и болѣе.

Веберъ даетъ для послѣдѣйствія слѣдующую формулу:

$$x = \frac{b}{(t + c)^p},$$

гдѣ t означаетъ время, а b , c и p константы, причемъ $p > 1$. Здѣсь нужно замѣтить, что формула эта дѣйствительна только въ извѣстныхъ предѣлахъ.

Послѣдѣйствіемъ обладаютъ не всѣ тѣла въ одинаковой степени, а по обобщенію *Н. Гезехуса* наибольшее упругое послѣдѣйствіе обнаруживается вообще въ тѣлахъ, обладающихъ меньшимъ сѣплениемъ и большей подвижностью молекулъ. Эта же ученый нашелъ, что послѣдѣйствіе при высокихъ температурахъ слабѣе, чѣмъ при низкихъ (исключение представляетъ каучукъ).

Объяснить упругое послѣдѣйствіе подробно мы пока не въ состояніи, хотя нѣкоторые могли бы сказать, что такъ какъ грузъ, подвѣшенный напр. къ проволокѣ, произведетъ въ ней нѣкоторое удлиненіе, то проволока вслѣдствіе этого будетъ имѣть меньшій діаметръ; но извѣстно, что чѣмъ меньшій діаметръ имѣть проволока, тѣмъ большее удлиненіе произведетъ данный опредѣленный растягивающей грузъ. Такимъ образомъ нашъ грузъ будетъ дѣйствовать во всякой моментъ времени на проволоку, дѣлающую все болѣе и болѣе тонкой, которая вслѣдствіе этого и должна будетъ постоянно удлиняться; т. е. никакого особеннаго такъ называемаго послѣдѣйствія здѣсь и нѣтъ.

Но этому объясненію противорѣчать факты. Тогда почему проволока послѣ снятія груза опять укорачивается, причемъ укороченіе это вначалѣ совершается очень быстро, а затѣмъ слабѣе? Это объясненіе никто не будетъ защищать, если захотеть присутствовать въ пекарнѣ приготовленіи кренделей. Когда пекарь растянетъ полосу обыкновенного тѣста и положитъ ее на столъ, чтобы сдѣлать крендель, полоса тѣста сейчасъ же сильно начинаетъ укорачиваться сама собой.

Вѣроятнѣе всего, что молекулы деформированного тѣла приспособляются къ своему новому положенію, но не сразу, а постепенно, слѣдствіемъ чего и является неустойчивое ихъ равновѣсіе.

Н. Гезехусъ думаетъ, что при этомъ играетъ большую роль взаимодѣйствіе внутренняго состоянія тѣль съ окружающей средой. Я намѣренъ въ скоромъ времени провѣрить это предположеніе опытнымъ путемъ.

Кромѣ этого такъ называемаго *упругаго* послѣдѣйствія существуетъ еще послѣдѣйствіе и въ другихъ областяхъ физики.

Такъ фосфоресценція представляетъ собою *свѣтовое* послѣдѣйствіе. На основаніи фотометрическихъ измѣреній *Дюфура* выходитъ, что тѣла, обладающія способностью фосфоресцировать, тѣмъ дольше свѣтятся въ темнотѣ, чѣмъ болѣе продолжительное время дѣйствовалъ на нихъ свѣтъ; при этомъ фосфоресценція сначала убываетъ очень быстро, а затѣмъ все медленнѣе и медленнѣе. *Дарвинъ* даетъ для этого явленія формулу, которая совершенно подобна формулѣ *Бебера* для упругаго послѣдѣйствія.

Магнитное послѣдѣйствіе наблюдалось нѣсколько разъ различными изслѣдователями, какъ то *Кольраушемъ*, *Фромме*, *Ауэрбахомъ* и проч.

На основаніи ихъ опытovъ выходитъ, что магнитизмъ тѣла, который получается вслѣдствіе данной намагничивающей силы, соответствуетъ не только этой послѣдней, но зависитъ и отъ прежде дѣйствовавшихъ силъ.

Примѣромъ *электрическаго* послѣдѣйствія можетъ служить остаточный зарядъ лейденской банки. Замѣчено, что если при помо-

щи разрядника разрядить лейденскую банку, то по прошествіи нѣ сколькихъ секундъ при прикосновеніи разрядника она снова даетъ искру, хотя и слабую; по прошествіи еще нѣ сколькихъ секундъ разрядникъ покажетъ еще слабѣйшую искру и т. д. Отсюда слѣдуетъ, что лейденская банка не сразу теряетъ электрическій свой зарядъ (въ упругомъ послѣдѣйствіи проволока не сразу достигаетъ своей первоначальной длины послѣ снятія растягивающаго груза), а только по прошествіи болѣе или менѣе продолжительного времени. Кромѣ того опыты Гопкинсона показали, что явленіе это зависитъ отъ температуры банки, а Гордонъ нашелъ, что механическое сотрясеніе молекулъ стекла ускоряетъ появленіе остаточнаго заряда. Явленія—характерныя и для упругаго послѣдѣйствія.

Можно было бы привести здѣсь еще нѣ сколько примѣровъ послѣдѣйствія въ области диффузіи, обезвоживанія кристалловъ (въ эксикаторѣ) и проч., но все это привело бы настъ къ общей формулы: *только, подверженное дѣйствию постоянной силы, не приходитъ въ равновѣсіе сразу, а только спустя болѣе или менѣе продолжительное время.*

Отсюда слѣдуетъ, что законъ, упоминаемый въ учебникахъ физики, что дѣйствіе равно противодѣйствію, не можетъ считаться вполнѣ вѣрнымъ. Въ самомъ дѣлѣ, если мы положимъ на столъ гирю напр. въ 10 килogr., то гира будетъ давить на столъ съ этой силой, а столъ слѣдовательно долженъ бы оказывать противодѣйствіе на гирю съ той же силой и, слѣдовательно, мы имѣли бы полное равновѣсіе. На самомъ же дѣлѣ гира, какъ показываютъ катетометрическія измѣренія, постепенно входитъ въ доску стола, что показываетъ существованіе упругаго послѣдѣйствія и его иллюстрируетъ.

Послѣдѣйствіемъ объясняются многие факты, наблюдаемые въ природѣ. Возьмемъ нѣ сколько примѣровъ.

Сфинксы—древніе памятники Египта,—какъ извѣстно, едва видны надъ окружающимъ пескомъ; это объясняютъ тѣмъ, что они будто бы имъ занесены. Не отрицая возможности участія наноса песка, мы должны здѣсь въ то же время допустить и участіе послѣдѣйствія, такъ какъ сфинксы стоятъ болѣе 3000 лѣтъ и, слѣдовательно, постепенно *вростали* въ землю, особенно если допустить рыхлость почвы, ибо для такой почвы коэффиціентъ послѣдѣйствія естественно долженъ быть значителенъ.

Въ этомъ обстоятельствѣ нужно искать также и причину того, что древніе города нужно откапывать, какъ напр. въ Греціи. Разумѣется, нельзя отрицать различныхъ наслоеній, происходившихъ въ различные историческія времена вслѣдствіе разрушенія городовъ и постепенно засыпавшихъ послѣдніе, но нужно допустить при этомъ и способность „врастанія“, какъ частный случай послѣдѣйствія.

Не будетъ фантастично, если мы скажемъ, что современемъ, когда коэффиціентъ послѣдѣйствія различныхъ почвъ будетъ точно извѣстенъ, можно будетъ опредѣлить приблизительно и годъ, въ которомъ было построено данное зданіе; стоитъ только опредѣлить толщину насыпаннаго искусственно въ теченіи столѣтій слоя и глубину, на которую вросло зданіе въ землю.

Извѣстно, что телеграфныя проволоки, протянутыя по столbamъ, современемъ до того ослабляются, что ихъ снова нужно натягивать.

Это явление тоже объясняется послѣдѣствіемъ, а именно постоянную силу здѣсь представляетъ вѣсъ проволоки, который и производитъ постепенное растяженіе проволоки. Къ этому присоединяются еще и толчки, производимые вѣтромъ, которые, какъ сказано было выше, помогаютъ послѣдѣствію. Къ этой категоріи относятся и висячіе мосты, и пѣни, служащая для передачи движенія заднему колесу велосипеда, и проч.

А какъ вы думаете, читатель, не „растетъ“ ли монета, только что отчеканенная? Вѣдь серебряная напр. пластинка, на которой прессъ вытиснулъ изображеніе, въ мѣстахъ гладкихъ подвергалась огромному давленію (а въ мѣстахъ рельефныхъ болѣе слабому) и теперь, когда сжимающая сила удалена, эти мѣста должны снова постепенно утолщаться и наконецъ по прошествіи t лѣтъ (см. формулу *Вебера*) изображеніе съ монеты исчезнетъ и она сдѣлается такой же толстой, какъ и до чеканки. Такія же явленія должны происходить и съ пуговицами военныхъ.

Изъ этого примѣра слѣдуетъ, что для сохраненія монетъ для по-колѣній, которая является по прошествіи нѣсколькихъ десятковъ тысячелѣтій, нѣкоторые экземпляры нужно не чеканить, но отливать.

Явленіе сложного послѣдѣствія наблюдается между прочимъ у нѣкоторыхъ кристалловъ. Если расплавить напр. натріевую амальгаму въ вертикальной трубкѣ и затѣмъ медленно охладить, то, какъ наблюдалъ *Шуманъ*, она имѣеть此刻 же послѣ затвердѣванія четыре различныхъ слоя, изъ которыхъ одинъ состоитъ изъ длинныхъ толстыхъ призматическихъ иглъ состава $\text{Na}_2\text{Hg}_{10}$, а другіе обладаютъ либо зернистымъ сложеніемъ либо состоять изъ тонкихъ иглъ. Первый слой постепенно распространяется все болѣе и болѣе и по прошествіи *полугода* вся масса въ трубкѣ превращается въ однообразные кристаллы первого слоя.

Въ эту категорію входитъ и медленное кристаллизованіе сталактитовъ, какъ о томъ говорить проф. *Шведовъ*. Внутреннее строеніе молодыхъ сталактитовъ представляется въ видѣ концентрическихъ слоевъ съ небольшими промежутками между ними; средина сталактина средняго возраста представляетъ стекловидную массу, имѣющую подъ микроскопомъ видъ лучей, идущихъ отъ центра; сталактины же 2—3 дюймовъ толщиною (возрастъ для которыхъ уже нужно считать многими тысячелѣтіями) имѣютъ сплошную стекловидную массу, которая образовала одинъ кристаллъ—октаэдръ.

Примѣромъ, гдѣ многочисленные толчки помогаютъ послѣдѣствію, можетъ служить ось желѣзно-дорожного вагона. Эта ось сдѣлана изъ кованнаго желѣза и представляетъ такимъ образомъ строеніе волокнистое. По прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ ось сама собою ломается и мѣсто излома представляетъ собою поверхность, усѣянную мелкими кристалликами желѣза.

Если мы теперь обратимся къ изготавленію приборовъ и аппаратовъ для точныхъ наблюдений, то увидимъ, что послѣдѣствіе играетъ здѣсь очень для насъ непріятную роль.

Термометръ, только что приготовленный, не показываетъ точно, такъ какъ его резервуаръ не принялъ еще окончательныхъ размѣровъ, для чего ему надо нѣсколько лѣтъ; да и такой долголѣтній термо-

метръ не будетъ показывать точно, если имъ измѣряются низкія и высокія температуры. Если имъ напр. была измѣрена высокая температура, а затѣмъ сейчасъ же хотимъ измѣрить и низкую температуру, то его шарикъ не можетъ въ силу упругаго послѣдействія принять сразу должный объемъ, а только послѣ болѣе или менѣе продолжительнаго времени. Это время можно однако сократить, если только выдрессировать данный термометръ. Дрессировку сдѣлать легко: стоитъ только термометръ нѣсколько сотъ разъ охладить и нагрѣть; тогда въ силу закона, что вторичное, третичное и проч. послѣдействіе совершается все легче и легче, мы заставимъ термометръ принимать объемъ, соотвѣтствующій данной температурѣ, въ очень короткое время.

Сюда относится и причина, почему напр. константныя объемометра Ренъю современемъ оказываются невѣрными; проволоки, проволоченные черезъ тонкія отверстія стальной пластинки, спустя нѣсколько времени дѣлаются сами собою толще и такимъ образомъ измѣняютъ свое электрическое сопротивленіе, и т. д.

Изъ этого краткаго очерка читатель видитъ, что явленіе послѣдействія очень распространено въ мірѣ физическомъ и при осторожномъ его примѣненіи къ міру психическому могло бы дать намъ отвѣты на многие вопросы изъ области психологіи. Такъ память можно было бы объяснить упругимъ послѣдействіемъ (совмѣстно съ приспособленіемъ молекулъ). Подъ эту же рубрику подходитъ и душевное потрясеніе (напр. смерть близкаго человѣка), которое современемъ не только ослабляется, но даже и почти забывается, и проч.

П. Бахметьевъ (Софія).

ОЧЕРКЪ

ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЛОБАЧЕВСКАГО.

(Продолженіе*).

VII. Измѣреніе длины кривыхъ и опредѣленіе площадей.

Методы, съ помощью которыхъ, мы опредѣляемъ въ элементарной геометріи Евклида длину дуги или площадь кривой, цѣликомъ основываются на подобіи фігуръ и на теоріи пропорціональныхъ линій, неразрывно съ ней связанной. Легко убѣдиться, что геометрія Лобачевскаго исключаетъ возможность какого бы то ни было подобія фігуръ въ томъ смыслѣ, въ какомъ этотъ терминъ фигурируетъ въ геометріи Евклида. Въ самомъ дѣлѣ, не трудно видѣть, что въ геометріи Лобачевскаго три угла вполнѣ опредѣляютъ собой треугольникъ**). Пусть въ треугольникахъ АВС и А'В'С' углы соответственно равны. (См. „Вѣстн. Оп. Физики“ №№ 174, 178, 179, 183, 187, 188, 189, 190, 194, 195, 196, 198 и 199).

*) См. „Вѣстн. Оп. Физики“ №№ 174, 178, 179, 183, 187, 188, 189, 190, 194, 195, 196, 198 и 199.

**) Аналитически это доказывается уравненіемъ XXVI.

В'А' пойдетъ по сторонѣ ВА. Далѣе ни одинъ изъ треугольниковъ не можетъ расположиться внутри другого, ибо при такихъ условіяхъ сумма угловъ внутренняго треугольника была бы больше суммы угловъ вѣнчанаго треугольника (см. „Вѣст.“ № 179 стр. 240). Слѣдовательно, сторона А'C' должна пересѣкать сторону АС въ какой нибудь точкѣ Е или совмѣстится съ ней. Въ первомъ случаѣ одинъ изъ угловъ С и С' будетъ внутреннимъ, другой вѣнчанымъ угломъ треугольника ЕСС' и они, слѣдовательно, не могутъ быть равны. Поэтому треугольники совмѣстятся. Итакъ измѣреніе длины кривыхъ линій, площадей прямолинейныхъ фигуръ и объемовъ тѣлъ въ геометріи Лобачевскаго не можетъ опираться на теорію пропорціональности и должно быть основано поэтому на другихъ принципахъ. Общій методъ заключается въ опредѣленіи дифференціала дуги, площади, объема—и въ интегрированіи полученного выраженія въ надлежащихъ предѣлахъ.

Мы займемся этими вычислениемъ въ слѣдующихъ главахъ, а здѣсь приведемъ основные элементарные приемы.

Опредѣленіе длины окружности круга не представляетъ никакихъ затрудненій. Пусть R ея геодезический радиусъ на орисферѣ. Тогда длина окружности равна $2\pi R$, где π известное трансцендентное число 3,1459*)... Но R, какъ мы видѣли (см. „Вѣст.“ № 199 стр. 153) равно $lcotg \Pi(\varrho)$, где ϱ прямолинейный радиусъ окружности, слѣдовательно

$$C = 2\pi lcotg \Pi(\varrho) = \pi l \left(e^{\frac{\varrho}{l}} - e^{-\frac{\varrho}{l}} \right). \quad (\text{XXVIII})$$


Длину дуги предѣльной кривой въ зависимости отъ ея хорды мы уже опредѣлили въ предыдущей главѣ. А такъ какъ окружность и предѣльная линія представляютъ собой единственная кривыя, входящія въ элементарную теорію, то ими мы здѣсь и ограничиваемся.

Вопросъ объ измѣреніи площадей мы начнемъ съ опредѣленія площади треугольника. Точкой отправленія у насъ будетъ при этомъ служить слѣдующая основная теорема:

Треугольники, имѣющіе общее основаніе и одинаковую сумму внутреннихъ угловъ, равновелики.

Въ самомъ дѣлѣ, соединимъ середины D и E (фиг. 33) сторонъ АВ и ВС прямой DE и опустимъ на эту прямую перпендикуляры AF, CG и BH. Изъ равенства треугольника AFD и DBH, съ одной стороны,

и треугольниковъ BEH и ECG, съ другой стороны, обнаружится, во первыхъ, что $AF = BH = CG$ и, слѣдовательно, четырехугольникъ AEGC представляетъ собой четырехугольникъ Саккери; во вторыхъ, этотъ четырехугольникъ равновеликъ данному треугольнику; въ третьихъ, сумма угловъ при верхнемъ основаніи FAC и GCA равна суммѣ угловъ треугольника. Но этотъ четырехугольникъ вполнѣ опредѣляется основаніемъ АС треугольника и суммой его угловъ s . Въ самомъ дѣлѣ,



Фиг. 33.

*.) Чтобы отличить это π отъ прежняго символа π , который обозначалъ у насъ длину полуокружности или два прямыхъ угла—и не имѣлъ никакого опредѣленного чи-

построивъ углы CAF и ACG , равные $\frac{1}{2}s$, мы получимъ двѣ прямыя AF и CG . Эти прямыя неизбѣжно расходящіяся, потому что они представляютъ собой боковыя стороны четыреугольника Саккери, существование котораго нами уже доказано. Существуетъ слѣдовательно единственная прямая FG , перпендикулярная къ обѣмъ даннымъ прямымъ, которая и служить нижнимъ основаниемъ четыреугольника. Если же основаніе и сумма угловъ треугольника вполнѣ опредѣляютъ собой соотвѣтствующій четыреугольникъ Саккери, то этими элементами опредѣляется также и площадь треугольника*). Положимъ, что въ $\triangle ABC$ сумма угловъ равна s . Разность $\pi - s$ измѣняется отъ треугольника къ треугольнику. Условимся обозначать сумму угловъ треугольника черезъ $S(ABC)$, разность $\pi - S(ABC)$ черезъ $F(ABC)$, а площадь треугольника черезъ $\Delta(ABC)$.

Въ произвольномъ треугольнике ABC (фиг. 34) проведемъ черезъ вершину сѣкущую BD и докажемъ, что

$$\Delta ABD : \Delta BDC : \Delta ABC = F(ABD) : F(BDC) : F(ABC). \quad (1)$$

Замѣтимъ прежде всего, что

$$S(ABD) + S(BDC) = S(ABC) + \pi$$

или, вычитая обѣ части равенства изъ 2π , найдемъ

$$F(ABD) + F(BDC) = F(ABC). \quad (2)$$

Это соотношеніе будетъ, очевидно, справедливо для всякихъ трехъ треугольниковъ, изъ которыхъ два представляютъ собой части, на которыхъ дѣлится третій треугольникъ сѣкущей, выходящей изъ вершины.


Допустимъ теперь, что величины $F(ABD)$ и $F(BDC)$ имѣютъ общую мѣру δ , такъ что

$$F(ABD) = m\delta \text{ и } F(BDC) = n\delta.$$

Положимъ теперь, что точка D перемѣщается и движется отъ A къ C , занимая послѣдовательно положенія $D_1, D_2, D_3, \dots, D, D', D'', \dots$. Тогда на основаніи соотношенія (2) будемъ имѣть

$$\left. \begin{aligned} F(ABD_2) &= F(ABD_1) + F(D_1BD_2) \\ F(ABD_3) &= F(ABD_2) + F(D_2BD_3) \end{aligned} \right\} \quad (3)$$

Т. е. при движениіи точки D отъ A къ C значение функции $F(ABD)$ постоянно возрастаетъ. При этомъ оно измѣняется отъ 0 до $m\delta$. Слѣдовательно имѣется m точекъ D_1, D_2, D_3, \dots , въ которыхъ



Фиг. 34.

сленнаго значенія, мы прибѣгаемъ къ другому начертанію буквы; къ этому начертанію мы будемъ прибѣгать только въ томъ случаѣ, если подъ π будетъ необходимо разумѣть это трансцендентное число.

*). Это простое и изящное доказательство мы заимствуемъ непосредственно у Лобачевскаго. См. „О началахъ геометріи“ стр. 29.

$$F(ABD_1) = \delta$$

$$F(ABD_2) = 2\delta$$

$$F(ABD_3) = 3\delta$$

и поэтому на основании равенства (3)

$$F(ABD_1) = F(D_1BD_2) = F(D_2BD_3) \dots = \delta.$$

Итакъ треугольникъ ABD разбивается на m треугольниковъ такимъ образомъ, что каждые два соседнихъ треугольника имѣютъ общую сторону и одинаковую сумму угловъ; эти треугольники по основной теоремѣ равновелики. Очевидно треугольникъ BDC такимъ-же образомъ разбивается на n равновеликихъ треугольниковъ BDD' , $D'BD'' \dots$

Такъ какъ треугольники $D_{m-1}BD$ и DBD' имѣютъ общую сторону и одинаковую сумму угловъ, то треугольники первой группы равновелики треугольникамъ второй группы и, следовательно,

$$\Delta(ABD) : \Delta(DBC) = F(ABD) : F(DBC);$$

отсюда

$$\Delta(ABD) : \Delta(ABD) + \Delta(DBC) = F(ABD) : F(ABD) + F(DBC).$$

Или, принимая во вниманіе соотношеніе (2),

$$\Delta ABD : \Delta ABC = F(ABD) : F(ABC).$$

Теорема (1), следовательно, доказана. Случай, когда величины $F(ABD)$ и $F(DBC)$ несоизмѣримы приводится къ предыдущему обычнымъ приемомъ.

Опираясь на это предложеніе, не трудно доказать, что площади двухъ треугольниковъ ABC и $A'B'C'$, имѣющихъ общее основаніе $AB=A'B'$, относятся какъ $F(ABC) : F(A'B'C')$. (Фиг. 35).

Если углы A и B равны угламъ A' и B' , то треугольники равны и оба отношенія равны единицѣ. Положимъ, что $\angle A' < \angle A$ и наложимъ треугольникъ $A'B'C'$ на треугольникъ ABC такъ, чтобы основанія $A'B'$ и AB совпали; тогда точка C' займетъ одно изъ трехъ положеній D, D', D'' .

Во второмъ случаѣ, на основаніи теоремы (1) имѣемъ:

$$\Delta(AD'C) : \Delta(ABC) = F(AD'C) : F(ABC). \quad (4)$$


Въ первомъ случаѣ, на основаніи той-же теоремы:

$$\Delta(ADC) : \Delta(AD'C) = F(ADC) : F(AD'C).$$

Перемножая эту пропорцію съ предыдущей, получаемъ:

$$\Delta(ADC) : \Delta ABC = F(ADC) : F(ABC).$$

Такимъ же образомъ въ третьемъ случаѣ



Фиг. 35.

$$\Delta(AD''C) : \Delta(AD'C) = F(AD''C) : F(AD'C)$$

и перемножая эту пропорцию съ пропорцією (4) имѣемъ:

$$\Delta(AD''C) : \Delta(ABC) = F(AD''C) : (ABC).$$

Теперь уже нетрудно доказать, что площади вскихъ двухъ треугольниковъ ABC и A'B'C', относятся, какъ функции F(ABC) и F(A'B'C').

Въ самомъ дѣлѣ, если три стороны одного треугольника равны тремъ сторонамъ другого, то оба отношенія равны единицѣ.

Въ противномъ случаѣ сторону A'C' можно считать меныше стороны AC и расположить треугольникъ A'B'C' такимъ образомъ, чтобы онъ занялъ относительно треугольника ABC положеніе AHG (фиг. 35), гдѣ AH представляетъ собой сторону AC'.

Теперь на основаніи предыдущей теоремы имѣемъ:

$$\Delta ABC : \Delta AGC = F(ABC) : F(AGC).$$

А на основаніи теоремы (1) или предыдущей:

$$\Delta(AGC) : \Delta(AHG) = F(AGC) : F(AHG).$$

Перемножая эти двѣ пропорціи, находимъ окончательно:

$$\Delta(ABC) : \Delta(AHG) = F(ABC) : F(AHG).$$

Изложенная теорія обнаруживаетъ, что

$$\Delta(ABC) = \mu F(ABC),$$

гдѣ μ некоторая постоянная величина. Значеніе этой постоянной зависитъ отъ выбора единицы при измѣрениі площадей. Если примемъ за единицу площади—площадь такого треугольника, въ которомъ разность между π и суммой угловъ равна угловой единицѣ*), то $\mu = 1$ и.

$$\Delta(ABC) = F(ABC) = \pi - S(ABC).$$

XXIX

Такимъ образомъ выборъ единицы площади ставится въ зависимость отъ выбора угловой единицы. Если измѣрять уголъ, какъ это было указано въ предыдущей главѣ, отношеніемъ дуги къ ея геодезическому радиусу, то эту формулу можно писать такъ:

$$\Delta^*ABC = \pi - S(ABC).$$

Переходъ отсюда къ площади многоугольника дѣлается совершенно такимъ-же образомъ, какъ и въ сферической геометріи и мы приходимъ къ выражению

*) Такое соглашеніе возможно только въ предположеніи, что всегда можно построить треугольникъ, имѣющій данную сумму угловъ, и что за основную единицу принимается величина, не превышающая π . Первое утвержденіе доказано ниже (см. форм. (9) и примѣченіе къ ней).

$$\text{пл. мног.} = (n-2)\pi - S,$$

XXX

гдѣ S сумма внутреннихъ угловъ многоугольника. Формула XXIX замѣтальна во многихъ отношеніяхъ.

Прежде всего замѣтимъ, что величина $S(ABC)$ всегда больше нуля, а потому $\Delta(ABC)$ не превышаетъ π , т. е. отношеніе площади произвольного треугольника, къ площади того треугольника, въ которомъ сумма внутреннихъ угловъ равна угловой единице и площадь котораго принятая нами за единицу, не можетъ превышать отношенія двухъ прямыхъ угловъ къ этой угловой единице. Итакъ на плоскости Лобачевскаго площадь треугольника не можетъ превышать извѣстныхъ предѣловъ. Допущеніе, что площадь треугольника можетъ быть сдѣлана сколь угодно большой вполнѣ эквивалентно постулату Эвклида *).

Представимъ себѣ, далѣе, прямоугольный треугольникъ, ACB , въ которомъ катетъ BC неопределенно возрастаетъ. Площадь треугольника при этомъ равна

$$\frac{\pi}{2} - A - B.$$

Но съ возрастаніемъ катета BC гипотенуза стремится сдѣлаться параллельной прямой BC ; уголъ B стремится поэтому къ O , а уголъ A къ $\Pi(b)$; слѣдовательно, площадь треугольника имѣть предѣломъ $\frac{\pi}{2} - \Pi(b)$. Такъ какъ при такихъ условіяхъ треугольникъ приближается къ полосѣ, ограниченной прямой BC , перпендикуляромъ AC и другой прямой, проходящей черезъ вершину A параллельно CB , то говорить, что площадь полосы, ограниченной двумя параллелями и перпендикуляромъ b , равна

$$\sigma = \frac{\pi}{2} - \Pi(b)$$

XXXI

Но нужно, конечно, помнить, что такая формулировка не присваиваетъ предложенію никакого другого содержанія, кромѣ того, которое содержится въ изложенномъ выводѣ.

Однако полученное нами выраженіе можетъ вести къ одному небезинтересному парадоксу. Если положить въ уравненіи XXXI $\Pi(b)$

*). Лобачевскому это обстоятельство, конечно, хорошо извѣстно. Однако, по нѣдосмотру, въ сочиненіи „О Началахъ Геометріи“ имъ допущена слѣдующая погрѣшность: „Итакъ при сравненіи площадей двухъ треугольниковъ“, говоритъ онъ, „всегда можно полагать, что у нихъ по одному боку равному, которой и будемъ называть основаніемъ. Далѣе каждый изъ сихъ треугольниковъ, оставаясь на томъ же основаніи, можетъ быть превращенъ въ прямоугольный“. (Стр. 29). Если бы каждый треугольникъ можно было превратить въ прямоугольный, не измѣня основаній, то площадь всякаго треугольника можно было бы удвоить: въ самомъ дѣлѣ, приложивъ къ полученному прямоугольному треугольнику другой ему тождественный такимъ образомъ, чтобы два разныхъ катета совпадали, мы получимъ равнобедренный треугольникъ, площадь котораго въ два раза больше площади данного треугольника. Если площадь всякаго треугольника можно удвоить, то площадь треугольника можетъ быть сдѣлана сколь угодно большой. Да и помимо того, очевидно, что въ прямоугольный треугольникъ можетъ быть превращенъ только такой треугольникъ, площадь котораго не превышаетъ $\frac{1}{2}\pi$.

равнымъ $\frac{\pi}{2}$, т. е. перейти къ геометрии Евклида, то получимъ $\sigma = 0$. Между тѣмъ въ геометрии Евклида площадь полосы безконечно велика. Это кажущееся противорѣчіе не трудно объяснить. Выраженіе σ въ уравненіи XXXI даетъ намъ отношеніе площади полосы, рассматриваемой, какъ предѣлъ нѣкотораго треугольника, къ площади другого треугольника, принятаго за единицу. Но за единицу принята площадь треугольника, въ которомъ разность между двумя пряммыми и суммой угловъ въ треугольнике равна угловой единицѣ. Величина этой единицы зависитъ отъ величины l , характеризующей пространство. Если мы нашли, что

$$\lim \sigma = 0 \quad (l=\infty)$$

то это значитъ, что отношеніе площади полосы къ площади треугольника, принятаго за единицу, стремится къ нулю, когда пространство по своимъ свойствамъ приближается къ пространству Евклида, когда величина l неопределенно возрастаетъ. Когда мы обращаемся къ пространству Евклида, то здѣсь, за отсутствиемъ такого треугольника, принимаютъ за единицу совершенно другую площадь, именно двойную площадь равнобедренного прямоугольного треугольника, катеты котораго равны линейной единицѣ. И нѣть ничего удивительнаго, ничего противорѣчащаго равенству XXXI въ томъ, что площадь полосы безконечно велика по сравненію съ этой единицей. Изъ этого можно только сдѣлать одинъ выводъ: отношеніе площади треугольника, который былъ принятъ за единицу въ предыдущей теоріи, къ площади равнобедренного прямоугольного треугольника, катетъ котораго равенъ единицѣ длины, стремится къ безконечности вмѣстѣ съ l .

При этомъ предполагается, что единица длины не зависитъ отъ l . Такой выводъ будетъ совершенно справедливъ и мы это сейчасъ обнаружимъ аналитически. Мы предложимъ для этого формулу, выражающую площадь треугольника въ зависимости отъ трехъ сторонъ и одной изъ высотъ. Эта формула намъ будетъ полезна и въ слѣдующей главѣ.

B. Каанъ (Спб.).

(Продолженіе следуетъ).

НАУЧНАЯ ХРОНИКА.

Вліяніе намагничиванія на размѣры стержней и колецъ изъ мягкаго желѣза. По этому вопросу сдѣланы недавно весьма интересныя наблюденія Sh. Bidwell'емъ, который давно уже занимается изученіемъ измѣнений размѣровъ стержней изъ мягкаго желѣза подъ вліяніемъ намагничиванія. Еще при прежнихъ своихъ работахъ онъ обнаружилъ, что при достаточномъ увеличеніи напряженія намагничивающей силы желѣзный стержень, который сначала удлиняется, начинаетъ укорачиваться, при напряженіи между 300 и 400 С. G. S. единицами пріобрѣтаетъ

первоначальные свои размѣры, а при дальнѣйшемъ увеличеніи напряженія намагничивающей силы начинаетъ сжиматься. Кромѣ того еще Joule замѣтилъ, что при прочихъ равныхъ условіяхъ удлиненіе стержня тѣмъ больше, чѣмъ мягче желѣзо, т. е. чѣмъ тщательнѣе оно прокалено. — Взявши кусокъ желѣзной проволоки въ 10,6 см длины и 0,265 см діаметра, Bidwell нашелъ, что подъ вліяніемъ намагничиванія проволока эта удлиняется на 0,0000045 своей длины, причемъ этотъ maximum удлиненія наступаетъ при 140 C. G. S. единицахъ намагничивающей силы. Когда та же проволока была тщательно прокалена, то maximum ея удлиненія уменьшился до 0,0000008 ея длины при 60 C. G. S. единицахъ намагничивающей силы. Закаливъ ту же проволоку, Bidwell нашелъ maximum ея удлиненія 0,0000025 ея длины при 110 един. намагничивающей силы. Попытки Bidwell'я достичь прокаливаніемъ того, чтобы желѣзный стержень вовсе не удлинялся при намагничиваніи и при слабыхъ намагничивающихъ силахъ началь бы уже сжиматься, какъ это имѣть мѣсто для стержней изъ никеля и кобальта,—попытки эти не увенчались успѣхомъ.

Нѣсколько иные результаты дали опыты съ желѣзными кольцами, которыхъ вообще относятся къ намагничиванію, какъ и стержни, т. е. сперва діаметръ ихъ увеличивается, достигаетъ maximum'a при нѣкоторой величинѣ намагничивающей силы, а затѣмъ начинаетъ уменьшаться. Изъ хорошаго мягкаго желѣза было приготовлено кольцо, очень сильно прокалено и обвито 515 оборотами изолированной проволоки. Уже при самомъ слабомъ токѣ діаметръ кольца сталъ уменьшаться, причемъ до этого не удалось обнаружить никакого увеличенія. Увеличивая силу тока, удалось достичь уменьшенія діаметра на 0,0000075 его длины. Кривая, выражавшая зависимость между напряженіемъ намагничивающей силы и укороченіемъ діаметра, оказалась весьма схожей съ подобной же кривой, полученной прежде для кобальтоваго стержня. Судя по ходу этой кривой, можно бы достичь и еще большаго укороченія діаметра кольца, но развиваемая намагничивающимъ токомъ теплота помѣшала продолжать опытъ.

Если закалить такое кольцо, раскаливши его и быстро затѣмъ охладивъ погружениемъ въ холодную воду, то оно пріобрѣтаетъ первоначальные свойства, т. е. сперва расширяется, а при дальнѣйшемъ увеличеніи намагничивающей силы начинаетъ сжиматься. (Naturwiss. Rundsch.).

B. Г.

Соотношеніе между молекулярнымъ вѣсомъ твердыхъ тѣл и ихъ удѣльнымъ вѣсомъ.—F. Pisani нашелъ для цѣлаго ряда сложныхъ минераловъ слѣдующее соотношеніе:

$$\frac{M}{2s} = M \cdot W, \text{ откуда } W = \frac{1}{2s},$$

гдѣ M есть молекулярный вѣсъ даннаго соединенія, s —его уд. вѣсъ, а W —его теплоемкость; MW есть, слѣдовательно, молекулярная теплоемкость.—Соотношеніе это приблизительно вѣрно только для кислородныхъ безводныхъ солей; для содержащихъ воду кислородныхъ солей $\frac{1}{2s} = \frac{3}{4} W$, для большей части окисловъ, сѣрнистыхъ соединеній и

галоидныхъ солей $\frac{1}{2}s = \frac{2}{3}W$, для большей части металлоидовъ и для нѣкоторыхъ металловъ $\frac{1}{2}s = 3W$, для группы же платины $\frac{1}{2}s = \frac{3}{2}W$.
(Naturwiss. Rundsch.).

B. Г.

Нововведеніе въ фотографіи.—Въ послѣднее время нѣкоторые фотографы употребляютъ слѣдующій способъ для полученія на одной и той же пластинкѣ сразу нѣсколькихъ изображеній одного и того-же лица въ различныхъ его положеніяхъ. Снимающійся становится задомъ къ фотографическому аппарату и лицомъ къ углу, образуемому двумя зеркалами. Тогда на чувствительной пластинкѣ получается одновременно отпечатокъ изображенія затылка и сини снимающагося и рядъ изображеній, получающихся отъ зеркалъ; всѣ эти изображенія составляютъ какъ бы кружокъ. Понятно, что съ уменьшениемъ угла между зеркалами число изображеній увеличивается.

Новое примѣненіе фотографіи.—E. Pringsheim и Gradenwitz удачно примѣнили фотографію для возстановленія старого текста палимпсестовъ, т. е. такихъ пергаментовъ, на которыхъ кромѣ бросающагося въ глаза текста замѣтны еще слѣды болѣе старого текста, смѣтаго впослѣдствіи вторымъ переписчикомъ. Чтобы возстановить этотъ старый текстъ приготавляются два негатива A и B съ одного и того-же мѣста рукописи такъ, чтобы на негативѣ A болѣе старый текстъ отпечатался по возможности слабѣе, а выступилъ бы новый текстъ, на негативѣ же B чтобы старый текстъ отпечатался по возможности съ тою же силой, какъ и новый. Затѣмъ съ негатива B готовится діапозитивъ B' и накладывается своимъ чувствительнымъ слоемъ на чувствительный слой негатива A, такъ чтобы соответственные части изображеній на негативѣ A и на позитивѣ B' совпали. Если разматривать такія двѣ наложенные другъ на друга пластиинки въ проходящемъ свѣтѣ, то, если снимки удачно сделаны, новый текстъ почти совершенно скрадывается и ясно выступаетъ болѣе старый текстъ. Дѣйствительно:

фонъ	старый текстъ	новый текстъ
на негативѣ A	темный	темный
на позитивѣ B'	свѣтлый	темный.
при наложеніи A		
на B' въ проходя-щемъ свѣтѣ	темный + свѣтлый	темный + темный
		свѣтлый + темный.

Очевидно, что для удачи работы надо подобрать пластиинки такъ, чтобы темный фонъ негатива A + свѣтлый фонъ позитива B' давали бы тонъ такой же силы, какой даютъ свѣтлый новый текстъ негатива A + темный новый текстъ позитива B'. Тогда новый текстъ совершенно сливаются съ фономъ и съ двухъ наложенныхъ другъ на друга пластиинъ A и B' можно приготовить новый негативъ C, на которомъ будетъ видѣнъ лишь старый текстъ.

B. Г.

Утилизациѣ двигательной силы волнъ. Съ цѣлью воспользоваться двигательной силой волнъ были произведены весьма интересные опыты въ Сѣв. Амер. Соединенныхъ Штатахъ, на одной изъ станцій для морскихъ купаній, на берегу Нью-Джерсея. Существенная часть употреб-

блленного для этого прибора состояла изъ поплавка въсомъ въ 1150 килогр., къ которому прикрепленъ былъ конецъ кабеля, перекинутаго черезъ блоки и снабженного на другомъ концѣ противовесомъ въ 900 килогр. Къ этому противовесу прикрепленъ былъ другой кабель, также перекинутый черезъ блокъ и соединенный другимъ своимъ концомъ съ поршнемъ насоса, накачивавшаго воду въ особый резервуаръ. Ходъ поршня равнялся 1,83 метр., а диаметръ цилиндра насоса—15 центим. Когда волна поднимала поплавокъ, противовесъ опускался, поднимая поршень. При опусканиі поплавка противовесъ поднимался, а поршень опускался отъ собственной тяжести. При помощи этого приспособленія удавалось при обыкновенныхъ условіяхъ накачивать въ резервуаръ 54,000 куб. метр. воды въ теченіе семи рабочихъ часовъ.

ДОСТАВЛЕННЫЯ ВЪ РЕДАКЦІЮ КНИГИ И БРОШЮРЫ.

Перемѣнныя электрическіе токи. Руководство для студентовъ и техниковъ Т. Г. Блекслея, профессора королевской морской коллегіи въ Гринвичѣ. Переводъ съ французскаго, свѣрренный съ 3 изданіемъ: „Papers on alternating currents of Electricity by T. H. Blakesley“. Подъ редакціей В. К. Лебединскаго, дополненный авторомъ для русскаго изданія. Съ 55 рисунками. Спб. Изд. К. Л. Риккера. 1894. Ц. 1 р. 60 к.

Les formules pour la détermination approximative des nombres premiers, de leur somme et de leur différence d'après le numéro de ces nombres. I. Pervouchine, prêtre au district Chadrinsk (Perm). Kasan, 1894.

Къ вопросу о термодинамическомъ потенциаль. Н. Шиллера. Отд. отт. изъ VII тома Трудовъ Отдѣленія Физическихъ наукъ Императорскаго Общества Любителей Естествознанія. Москва. 1894.

О вліяніи виѣшняго давленія, приложеннаго къ поверхности раздѣла жидкости и ея пара, на упругость этого послѣдняго. Н. Шиллера. Отд. отт. изъ VII тома Трудовъ Отдѣленія Физическихъ Наукъ Императорскаго Общества Любителей Естествознанія. Москва. 1894.

ЗАДАЧИ НА ИСПЫТАНИЯХЪ ЗРЕЛОСТИ ВЪ 18^{93/94} Г.

Одесскій Учебный Округъ.

Гимназіи:

Николаевская.

1) *Алгебра:* Два плотника, изъ которыхъ второй начинаетъ работать $1\frac{1}{2}$ днями позже первого, могутъ сколотить заборъ въ 7 дней; если бы эта работа была поручена каждому отдельно, то первому для совершенія ея понадобилось бы тремя днями болѣе, чѣмъ второму. Во сколько дней каждый плотникъ отдельно можетъ сколотить заборъ?

2) *Геометрія*: Объемъ шара $v = 317,28$ куб. ф. Определить объемъ его сектора, у которого центральный уголъ въ осевомъ сечениі $\alpha = 56^{\circ}20'34''$.

Одесская 1-ая (Ришельевская).

1) *Алгебра*: Четвертый и седьмой члены возрастающей арифметической прогрессіи равны корнямъ уравненія: $x^2 - 50x + 589 = 0$; сумма всѣхъ членовъ = 403. Определить число членовъ.

2) *Геометрія*: Определить объемъ прямого конуса, осевое сечение котораго имѣть площадь $Q = 13$ кв. ф., а уголъ при вершинѣ $\alpha = 28^{\circ}27'$.

Одесская 2-ая.

1) *Алгебра*: Число учениковъ въ учебномъ заведеніи равно 156; число учениковъ въ I классѣ равно коэффиціенту при восьмомъ членѣ разложенія $(x+1)^9$, а въ каждомъ слѣдующемъ классѣ менѣе, чѣмъ въ предыдущемъ, на n учениковъ, где n —число цѣлыхъ и положительныхъ рѣшеній уравненія: $14x + 25y = 1153$. Сколько классовъ въ учебномъ заведеніи?

2) *Геометрія*: Въ равнобедренномъ треугольнику ABC, площадь котораго S равняется 545,3 кв. д., уголъ B, заключающійся между равными сторонами AB и BC, содержитъ $68^{\circ}48'$. Определить поверхность тѣла, образуемаго вращеніемъ этого треугольника около прямой, проведенной черезъ вершину B параллельно сторонѣ AC.

Одесская 3-я.

1) *Алгебра*: Два путешественника отправились другъ другу на встречу изъ городовъ, отстоящихъ одинъ отъ другого на 425 в. Пройхавши число дней, равное разности между числами верстъ, проѣзжаемыхъ ими въ день и встрѣтившись, путешественники узнаютъ, что одинъ изъ нихъ проѣхалъ на 25 в. больше другого. Сколько верстъ каждый проѣзжаетъ въ день?

2) *Геометрія*: Въ шарѣ, поверхность котораго $B = 240,15$ кв. ф., вписанъ конусъ. Образующая конуса наклонена къ плоскости основанія подъ угломъ $\alpha = 52^{\circ}17'15''$. Определить боковую поверхность конуса.

Симферопольская.

1) *Алгебра*: Помѣщикъ купилъ на ярмаркѣ коровъ и воловъ и заплатилъ за нихъ столько десятирублевыхъ кредитныхъ бумажекъ сколько единицъ заключается въ меньшемъ корней уравненія: $z^2 - 318z + 24056 = 0$. За каждую корову онъ заплатилъ столько 10-рублевыхъ кредитокъ, сколько единицъ заключается въ меньшемъ изъ двухъ послѣдовательныхъ чиселъ, а за вола столько такихъ же кредитокъ, сколько единицъ заключается въ слѣдующемъ по порядку изъ двухъ упомянутыхъ послѣдовательныхъ чиселъ. Меньшее изъ этихъ послѣдовательныхъ чиселъ равно положительному корню уравненія: $x^2 + 2x - 63 = 0$. Сколько коровъ и сколько воловъ купилъ помѣщикъ?

2) *Геометрія*: Въ правильномъ 27-угольнику апоѳема короче радиуса описанного круга на 0,064786 вершка. Определить радиусъ описанного круга.

Херсонская.

1) *Алгебра:* Рѣшить квадратное уравненіе; $ax^2 + bx = \frac{383,9421}{c}$, въ которомъ коэффиціентъ a = числу членовъ ариѳметической прогрессіи, имѣющей первымъ членомъ 2, разностью $1\frac{1}{2}$ и суммою этихъ членовъ $104\frac{1}{2}$; коэффиціентъ b = предѣлу суммы членовъ безконечно-убывающей прогрессіи, первый членъ которой = 5, и знаменатель $0,(285714)$; число c = числу, обыкновенный логарифмъ котораго равенъ $-\frac{3}{8}$.

2) *Геометрія:* Изъ двухъ параллельныхъ сторонъ трапециі большая $AB = a$, меньшая $DC = b$, прилежащіе углы къ большей изъ параллельныхъ сторонъ суть $DAB = \alpha$, $\angle CBA = \beta$. Опредѣлить объемъ тѣла, образуемаго вращеніемъ этой трапециі около стороны AB . Вычислить этотъ объемъ, полагая $a = 35,875$; $b = 17,325$; $\angle \alpha = 50^\circ 30' 30''$; $\angle \beta = 32^\circ 40' 40''$.

Московскій учебный округъ.

Иваново-Вознесенское реальное училище.

VII кл. *Приложение алгебры къ геометріи:* Внѣ круга, радиусъ коего = R , дана точка, разстояніе которой отъ центра круга = a . Черезъ данную точку провести съкрущую къ кругу, такъ чтобы внутренняя часть ея равнялась данной длины b .

Алгебра: Вычислить съ точностью до 0,01 выраженіе $a + b\sqrt[7]{7}$, где a = действительной части комплекснаго выраженія

$$[2(\cos 15^\circ + \sin 15^\circ \sqrt{-1})]^4$$

а b равно тому значенію x , при которомъ выраженіе

$$(19 - 7x)(7x - 9)$$

имѣеть наибольшую величину.

VII кл. *Ариѳметика:* Нѣкоторый капиталъ выражается числомъ рублей, состоящимъ изъ трехъ цифръ, сумма которыхъ = 18. Число сотенъ этого трехзначнаго числа относится къ числу его десятковъ какъ 1:0,75, а число десятковъ къ числу единицъ какъ $0,1(9):\frac{2}{15}$. На сколько времени должно отдать упомянутый капиталъ въ ростъ по 4 простыхъ годовыхъ процента, чтобы получить съ него 43 р. 20 к. процентныхъ денегъ.

Геометрія: 1. Площадь квадрата, вписанного въ основаніе круглого прямого конуса, равна полной поверхности куба, объемъ котораго = v . Отношеніе высоты конуса къ радиусу его основанія = $m:n$. Опредѣлить объемъ конуса.

2. Опредѣлить объемъ правильной пирамиды съ квадратнымъ основаніемъ, зная, что площадь диагонального съченія пирамиды = $6\sqrt{2}$ кв. дюйм., а апоѳема пирамиды = $\sqrt{13}$ дюйм.

Алгебра: 1. Написать геометрическую прогрессію, у которой сумма членовъ, стоящихъ на мѣстахъ четнаго порядка = 150, а сумма членовъ, находящихся на мѣстахъ нечетнаго порядка, = 50, число же

всѣхъ членовъ ея равно первому члену такой ариѳметической пропрессии, у которой сумма второго и четвертаго членовъ = 20, а сумма третьаго и шестого = 29.

2. Подставить въ выражение: $\frac{3717 + b}{404 + c}$ вмѣсто b коэффиціентъ пятаго члена разложенія $(x + a)^{16}$, вмѣсто c число сочетаній изъ 15 элементовъ по 4, обратить полученнную простую дробь въ непрерывную, найти всѣ подходящія дроби этой послѣдней и опредѣлить затѣмъ предѣль той ошибки, которую мы дѣлаемъ, принимая пятую подходящую дробь за равную данной простой дроби.

Тригонометрія: По данной площиади тр-ка, равной 547,57 кв. фут. и по даннымъ угламъ $A = 103^{\circ}18'$, $B = 23^{\circ}23'22''$ опредѣлить стороны этого треугольника.

ЗАДАЧИ.

№ 126. ABC есть равнобедренный треугольникъ, вершина кото-
рого A ; произвольная прямая опирается своими концами D и E на
равныя стороны, D_1E_1 — ея проекція на основаніе AB ; черезъ сре-
дину F прямой ED проведена параллельно основанію прямая GH ,
ограниченная равными сторонами. Доказать, что $GH = D_1E_1$.

А. Гольденбергъ (Спб.).

№ 127. Доказать, что прямая DE , проходящая черезъ середину D гипотенузы BC прямоугольного треугольника ABC и черезъ одну изъ точекъ E , въ которыхъ катетъ AB дѣлится на три равныя части, от-
сѣкаеть на продолженіи катета AC отрѣзокъ $C_1A = AC$.

В. Захаровъ (Саратовъ).

№ 128. Рѣшить безъ помоши тригонометріи слѣдующую задачу
(изъ „Собранія вопросовъ и задачъ прямолинейной тригонометрії“ Ве-
решагина, изд. 2, № 650):

„Перпендикуляръ, опущенный изъ вершины прямого угла на ги-
потенузу, равенъ h дюйм. и дѣлить прямой уголъ на части, изъ кото-
рыхъ одна въ три раза болѣе другой. Определить гипотенузу, оба ка-
тета и площаадь“.

Н. Николаевъ (Пенза).

№ 129. Рѣшить уравненіе:

$$\operatorname{tg}x \cdot \operatorname{tg}^2 2x \cdot \operatorname{tg}^2 3x = \operatorname{tg}x + \operatorname{tg}^2 2x - \operatorname{tg}^2 3x.$$

И. Окунь (с. Голле).

№ 130. Въ какой системѣ счисленія число 57896, написанное по
десятичной системѣ, изобразится черезъ 3323041?

А. Бачинскій (Холмъ).

№ 131. Показать, что

$$\sqrt{a + \sqrt{a^2 + \sqrt{a^4 + \sqrt{a^8 + \dots}}} - \sqrt{a - \sqrt{a^2 - \sqrt{a^4 - \sqrt{a^8 - \dots}}}} = a.$$

П. Свѣшиниковъ (Троицкъ).

Рѣшенія задачъ.

№ 467 (2 сер.). Разность кубовъ двухъсосѣднихъ подходящихъ дробей равна $\frac{27360}{3511808}$. Определить эти дроби.

Такъ какъ $\sqrt[3]{3511808} = 152 = 8 \cdot 19$ и знаменатели искомыхъ дробей должны быть взаимно простыми, то они суть 8 и 19. Пусть x и y будутъ числителями. Тогда

$$\frac{x^3}{19^3} - \frac{y^3}{8^3} = \left(\frac{x}{19} - \frac{y}{8} \right) \left(\frac{8^2 x^2 + 8 \cdot 19 \cdot xy + 19^2 y^2}{19^2 \cdot 8^2} \right) = \frac{27360}{3511808}.$$

Но такъ какъ $8x - 19y = 1$, то задача приводится къ системѣ двухъ уравнений:

$$64x^2 + 152xy + 361y^2 = 27360,$$

$$8x - 19y = 1,$$

откуда $x = 12$, $y = 5$, т. е. искомыя дроби суть $\frac{12}{19}$ и $\frac{5}{8}$.

К. Щиполевъ (Курскъ).

№ 517 (2 сер.). Доказать, что основанія прямыхъ, проведенныхъ въ одномъ смыслѣ изъ какой нибудь точки M окружности, описанной около треугольника ABC , къ сторонамъ его подъ даннымъ угломъ α , лежатъ на одной прямой (Обобщеніе теоремы о прямой Симсона).

Пусть (фиг. 36) $\angle MaB = \angle MbA = \angle McA = \angle \alpha$. Соединивъ точку M съ A и B и замѣтивъ, что около четырехъугольниковъ $AMcb$, $MaBc$ и $MaCb$ можно описать круги, находимъ

$$\angle bMa + \angle C = 2d,$$

$$\angle AMB + \angle C = 2d,$$


откуда $\angle bMa = \angle AMB$, а потому $\angle aMB = \angle AmB$. Но такъ какъ $\angle aMB = \angle acB$ и $\angle AmB = \angle AcB$, то

$$\angle Abd = \angle acB,$$

откуда, очевидно, слѣдуетъ, что точки b , c и a лежать на одной прямой.

Фиг. 36.

Легко показать, что эта теорема имѣетъ и свою обратную: если основанія прямыхъ, проведенныхъ изъ точки M въ одномъ смыслѣ подъ



разными углами къ сторонамъ треугольника ABC лежатъ на одной прямой, то точка M лежить на описанной около треугольника ABC окружности.

Дѣйствительно, такъ какъ около четырехъугольника $MacB$ можно описать кругъ, то $\angle aMb + \angle C = 2d$; такъ какъ около четырехъугольника $AMcb$ можно описать кругъ, то $\angle Acb = AMb$ и точно такъ же $\angle aMB = \angle acB$. Но $\angle acB = \angle Acb$; слѣдовательно $\angle AMb = \angle aMB$ и $\angle aMb = \angle AMB$, а потому $\angle AMB + \angle C = 2d$, т. е. точка M лежитъ на описанной около треугольника ABC окружности.

B. Ахматовъ (Тула); *M. Окасъ* (Мерьяма); *Я. Полушкинъ* (с. Знаменка).

№ 582 (2 сер.). Построить треугольникъ, если известенъ радиусъ внутренняго вписанного круга и двухъ внутреннихъ круговъ, касательныхъ каждый къ первому и къ двумъ сторонамъ треугольника.

Построивъ двѣ касающіяся внѣшне окружности O и O_1 радиусовъ, соотвѣтственно равныхъ радиусамъ внутренняго вписанного въ искомый треугольникъ круга и внутренняго, касательного къ двумъ сторонамъ, и проведя ихъ общія внѣшнія касательные, продолжимъ эти послѣднія до взаимнаго пересѣченія въ точкѣ A . Затѣмъ третьимъ даннымъ радиусомъ описываемъ окружность O_2 , касательную къ окружности O и продолженію одной изъ внѣшніхъ касательныхъ, пересѣкающихъ въ A . Остается провести вторую общую касательную къ окружностямъ O и O_2 .

B. Абрамовичъ (Сѣдлецъ); *И. Себряковъ*, *B. Ушаковъ* (ст. Усть-Медведицкая); *H. Кузнецова*, *A. Треумовъ* (Ив.-Вознесенскъ); *К. Щиполевъ* (Курскъ).

№ 583 (2 сер.). Показать, что каждыя двѣ вершины треугольника и основанія перпендикуляровъ, опущенныхъ изъ нихъ на противоположныя стороны, лежать на одной окружности. По даннымъ сторонамъ треугольника вычислить радиусы трехъ получающихся такимъ образомъ окружностей и разстоянія ихъ центровъ.


Если на каждой изъ сторонъ треугольника опишемъ какъ на диаметръ окружность, то очевидно, что окружность эта пройдетъ черезъ основанія перпендикуляровъ, опущенныхъ изъ двухъ прилежащихъ вершинъ на противоположныя стороны. Поэтому искомые радиусы равны половинамъ сторонъ треугольника, а разстояніе центровъ каждыхъ двухъ окружностей, описанныхъ на двухъ сторонахъ треугольника, равно половинѣ третьей стороны.

B. Абрамовичъ (Сѣдлецъ); *И. Себряковъ*, *B. Ушаковъ* (ст. Усть-Медведицкая); *К. Щиполевъ* (Курскъ); *П. Ивановъ* (Одесса); *Я. Полушкинъ* (с. Знаменка); *C. Окуличъ* (Варшава).

№ 17 (3 сер.). Въ плоскости даны четыре прямыхя. Найти въ той же плоскости такую точку, чтобы точки пересѣченія прямыхъ, проведенныхъ изъ нея подъ однимъ угломъ къ каждой изъ данныхъ прямыхъ, съ данными пряммыми лежали на одной прямой.

Извѣстно, что геометрическое мѣсто точекъ, обладающихъ тѣмъ свойствомъ, что основанія прямыхъ, проведенныхъ изъ нихъ въ одномъ смыслѣ къ сторонамъ треугольника ABC подъ однимъ и тѣмъ же угломъ, лежать на одной прямой,—есть описанная около треугольника ABC окружность (см. рѣшеніе задачи № 517 (2 сер.), напечатанное въ этомъ же № „Вѣстника“). Поэтому для рѣшенія задачи описываемъ окружности около двухъ какихъ либо треугольниковъ, составленныхъ данными пряммыми AB , AC , BC , $B'C'$, напр. около треугольниковъ ABC

и $AB'C'$ (фиг. 37). Точка M ихъ пересѣченія и будетъ, очевидно, искомой точкой. Задача всегда возможна и имѣтъ одно рѣшеніе, что не трудно видѣть, ибо если вмѣсто треугольниковъ ABC и $AB'C'$ возьмемъ напр. треугольники $BB'D$ и $CC'D$, то, на основаніи теоремы, обратной той, которая предложена въ задачѣ № 517 (2 сер.), описанная около нихъ окружности пройдутъ черезъ точку M .



Фиг. 37.

B. Ахматовъ (Тула).


№ 39 (3 сер.). Въ окружность вписанъ равносторонній треугольникъ ABC (фиг. 38). Черезъ точку M окружности проведены три прямые, параллельныя сторонамъ треугольника, до встрѣчи съ каждой изъ непараллельныхъ сторонъ или съ ея продолженіемъ. Показать, что три точки a, b, c изъ шести, полученныхъ такимъ образомъ, лежать на одной прямой, а три другія (a', b', c') —на другой.

Такъ какъ треугольники $Maad'$ и Mcc' равносторонни, то $\angle MaB = MbA = 180^\circ - \angle McA = 120^\circ$, а потому (см. рѣшеніе задачи № 517, напечатанное въ этомъ же № „Вѣстника“) точки a, b и c лежать на одной прямой. Точно такъ же докажемъ это и для точекъ a', b' и c' .

Я. Блюмбергъ (Рига); П. Хлыбниковъ (Тула); Я. Полушкинъ (с. Знаменка).

№ 42 (3 сер.). Построить треугольникъ по даннымъ сторонѣ, противолежащему углу и разности квадратовъ медіанъ двухъ другихъ сторонъ.

Обозначимъ данную сторону черезъ b , а разность квадратовъ медіанъ двухъ другихъ сторонъ черезъ k^2 . Если a и c суть двѣ другія стороны треугольника, а m_a и m_c ихъ медіаны, то



Фиг. 38.

http://vorum.ru

$$b^2 + c^2 = 2m_a^2 + \frac{a^2}{2},$$

$$b^2 + a^2 = 2m_c^2 + \frac{c^2}{2};$$

вычитая второе равенство изъ первого, получимъ:

$$c^2 - a^2 = {}^4/{}_3 (m_a^2 - m_c^2) = {}^4/{}_3 k^2.$$

Извѣстно, что геометрическое мѣсто всѣхъ точекъ, разность квадратовъ разстояній которыхъ отъ двухъ данныхъ точекъ равна квадрату данной прямой, есть прямая, перпендикулярная къ прямой, соединяющей данные точки. Поэтому для решенія задачи описываемъ изъ концовъ данной стороны треугольника дуги радиусами, равными гипотенузѣ и одному изъ катетовъ такого прямоугольного треугольника, квадратъ другого катета котораго равенъ ${}^4/{}_3 k^2$. Перпендикуляръ, опущенный изъ точки пересѣченія этихъ дугъ на данную сторону и будетъ такимъ геометрическимъ мѣстомъ. Третья вершина искомаго треугольника опредѣлится его пересѣченіемъ съ дугою, описанной на данной сторонѣ и вмѣщающей данный уголъ.

И. Барковскій (Могилевъ); *П. Хлебниковъ* (Тула); *Г. Сивчинскій* (Варшава);
Э. Заторскій (Могилевъ и. д.).

№ 43 (3 сер.). Подвижной шарикъ *B* однонитныхъ вѣсовъ Кулона отклоняется отъ неподвижного шарика *A* на 20° , если сообщить *A* и *B* данное число электрическихъ единицъ. Пусть зарядъ *A* уменьшенъ въ 3 раза, а *B* — въ 2 раза. Какъ станетъ шарикъ *B*? На сколько придется закрутить нить, чтобы показать уменьшение отталкивателной силы въ 6 разъ?

Если шарикамъ *A* и *B* сообщены заряды въ m_1 и m_2 электрическихъ единицъ, а дуга *AB* = 20° , то отталкивателная сила

$$f_{20} = \frac{m_1 m_2}{20^2}.$$

Во второмъ случаѣ шарикъ *B* перейдетъ въ положеніе *B*₁ и если дуга *AB*₁ = *x*, то отталкивателная сила

$$f_x = \frac{m_1 m_2}{6x^2}.$$

Такъ какъ сила крученія (она же и отталкивателная сила) пропорциональна углу, то

$$f_{20} : f_x = 20 : x,$$

откуда

$$x = \frac{20\sqrt[3]{36}}{6} = 11^0 \text{ (съ точн. до } 1/3000).$$

Чтобы перевести шарикъ изъ B_1 обратно въ B , надо закрутить нить по направлению отъ B_1 къ B на такое число y градусовъ, чтобы

$$20^\circ - (11^\circ + y) = 20^\circ : 6 = 3\frac{1}{3}^\circ,$$

откуда $y = 5\frac{2}{3}^\circ$.

A. Варениковъ (Ростовъ н. Д.).

№ 45 (3 сер.). Начертить равнобедренный треугольникъ такъ, чтобы периметръ всякаго вписанного въ него прямоугольника былъ величиной постоянной.

Пусть ABC есть равнобедренный треугольникъ, удовлетворяющій требованіямъ задачи, $MNPD$ и $MNPD$ (фиг. 39) половины двухъ вписанныхъ въ него прямоугольниковъ. По условію задачи

$$M'N' + 2N'P' = MN + 2NP,$$


откуда

$$M'N' - MN = N'R = 2(NP - N'P') = 2NR,$$

а такъ какъ $\triangle ABD \sim \triangle NN'R$, то и

$$BD = 2AD = AC,$$

т. е. въ искомомъ треугольнике высота равна основанию.



Фиг. 39.

Я. Бломбергъ (Рига); *A. Варениковъ* (Шуя).
M. Веккеръ (Винница).

№ 46 (3 сер.). Окружность касается непараллельныхъ сторонъ равнобочнай трапециі и дѣлить каждую изъ параллельныхъ сторонъ на три равныя части. Требуется 1) построить такую трапецию по данному радиусу R окружности и длинѣ a хорды, соединяющей точки касанія, и 2) вычислить ея стороны и площасть.

1) Въ данный кругъ вписываемъ хорду $AB = a$ и проводимъ че-резъ точки A и B касательныя къ кругу. Продолживъ эти касательныя до пересѣченія ихъ въ точкѣ C , изъ C проводимъ двѣ прямые, дѣлящія AB на три равныя части. Остается лишь соединить надлежащимъ образомъ точки пересѣченія этихъ прямыхъ съ окружностью.

2) Пусть $MNPQ$ (фиг. 40) есть удовлетворяющія требованіямъ задачи трапеция, O центръ даннаго круга, $AB = a$, $OT = R$, $BK \perp PQ$, $OR \perp PQ$, $PT = x$. Тогда

$$OR = \sqrt{R^2 - \frac{x^2}{4}}, OS = \sqrt{R^2 - \frac{a^2}{4}} \text{ и } RS = \sqrt{R^2 - \frac{x^2}{4}} + \sqrt{R^2 - \frac{a^2}{4}}$$

$$PK = \frac{3x - a}{2}, PB^2 = 2x^2.$$

Изъ треугольника PBK находимъ:

$$\overline{PB}^2 = \overline{BK}^2 + \overline{PK}^2 = \overline{PK}^2 + \overline{RS}^2$$

$$\text{или } 2x^2 = \frac{(3x-a)^2}{4} + \left(\sqrt{R^2 - \frac{x^2}{4}} + \sqrt{R^2 - \frac{a^2}{4}} \right)^2,$$

откуда

$$x_1 = \frac{3aR^2 + aR\sqrt{8R^2 - 2a^2}}{2a^2 + R^2};$$

$$x_2 = \frac{3aR^2 - aR\sqrt{8R^2 - 2a^2}}{2a^2 + R^2};$$

x_1 есть третья часть одной изъ параллельныхъ сторонъ, x_2 —другої.

Такъ какъ $BP = 2x_1^2$ и $BN = 2x_2^2$, то

$$BP + BN = NP = (x_1 + x_2)\sqrt{2} = \frac{6aR^2\sqrt{2}}{2a^2 + R^2}.$$


Далѣе легко найдемъ высоту трапеци

$$\frac{3a^2R\sqrt{2}}{2a^2 + R^2}$$

и площадь ея, равную $\frac{27a^3R^3\sqrt{2}}{(2a^2 + R^2)^2}$.


Я. Блюмбергъ (Рига).

ПОЛУЧЕНЫ РѢШЕНИЯ ЗАДАЧЪ отъ слѣдующихъ лицъ: *П. Бѣлова* (с. Знаменка) 112, 116 (3 сер.); *Г. Легошина* (с. Знаменка) 110, 118, 119 (3 сер.), 532 (2 сер.); *Я. Полушкина* (с. Знаменка) 39, 113 (3 сер.), 473, 517 (2 сер.), 452 (1 сер.); *А. Дмитриевскаго* (Цивильскъ) 19, 83, 98, 104, 108, 110 (3 сер.); учениковъ 3 класса Цивильскаго уѣздн. учили. 83 (3 сер.); *И. Барковскаго* (Могилевъ) 95, 105, 112, 118 (3 сер.); ученика Кіево-Печерской имп. 81, 82, 83, 85, 105 (3 сер.); *А. Бачинскаго* (Холмъ) 105, 108, 110, 112, 115, 119 (3 сер.); *А. Навамичева* (Ив.-Вознесенскъ) 77, 87, 92, 93, 105, 110, 112, 118 (3 сер.); *Т.—ва* (Тамбовъ) 108 (3 сер.); *Э. Заторскаго* (Могилевъ) 105 (3 сер.); *М. Арханельскаго* (Ловичъ) 108, 112 (3 сер.); *Н. Кузнецова* (Ив.-Вознесенскъ) 35, 81, 82, 83, 85, 98 (3 сер.).



Редакторъ-Издатель Э. К. Шпачинскій.

Дозволено цензурою. Одесса, 22-го Декабря 1894 г.



Фиг. 40.

БІБЛІОГРАФІЧЕСКІЙ ЛИСТОКЪ

НОВѢЙШИХЪ РУССКИХЪ ИЗДАНІИ.

Остроюорскій, А. Н. Среди природы. Рассказы о явленіяхъ природы. Съ рисунками. Изд. 3-е, исправл., книжн. магазина П. Луковникова. Спб.

Фроловъ, А. Приложение алгебры къ геометрии и начала аналитической геометрии на плоскости. Часть II. Начала аналитической геометрии на плоскости. По программѣ кадетскихъ корпусовъ. Изд. 6-е. Спб. 1895. Ц. 1 р. 25 к.

Юревичъ, Г. Я. Курсъ элементарной алгебры и систематической сборникъ алгебраическихъ задачъ. Часть I. Юрьевъ. 1894. Ц. 80 к.

Болла, Р. Страна звѣздъ. Внутреннія планеты. Переводъ съ англійскаго, со множествомъ рисунковъ. Изд. „Народной Библіотеки“ Маракуева. Москва. 1894. Ц. 20 к.

Воздухъ настъ окружающій. Изд. редакціи журнала „Досугъ и Дѣло“. Спб. 1894.

Гольдаммеръ, Д. А. Къ теоріи размѣрности электрическихъ количествъ (Сообщено на IX съездѣ русскихъ естествоиспытателей и врачей). Казань.

Dedekind, Richard, проф. Непрерывность и иррациональныя числа. Съ нѣмецкаго языка перевѣзъ С. Шатуновскій (Отл. отд. изъ журнала: „Вѣстникъ Опытной Физики и Элементарной Математики“). Одесса. 1894.

Ивановъ, Александъ (Стронинъ). Рассказы о землѣ и о небѣ. Съ рис. въ текстѣ (Природа и люди). Изд. 5-е, исправленное, книжн. склада А. Калмыковой. Спб. 1894.

Метеорологическое Обозрѣніе. Труды метеорологической стѣни юго-запада Россіи въ 1893 году. Вып. VI. А. Клоссовскаго Одесса. 1894.

Низшія механико-техническія училища. Спб. 1894.

Николаевскій, Ив. Руководство къ изученію главныхъ основаній педагогики въ учительскихъ семинаріяхъ Министерства Народнаго Просвѣщенія. Дидастическая пропедевтика. Курсъ II класса. Изд. 3-е книжн. магазина М. Наумова Москва. 1894. Ц. 50 к.

Отчетъ и протоколы физико-математического общества при Имп. университете св. Владимира за 1893 годъ (Отт. изъ „Университетскихъ Извѣстій“ за 1894 г.). Кіевъ. 1894.

Рубанцевъ, Н. Рассказы о великихъ и грозныхъ явленіяхъ природы. („Природа и Люди“ № 7). Изд. 2-е книжн. склада А. Калмыковой. Спб. 1894.

Рябковъ, Г. З. Опытъ методики решенія геометрическихъ задачъ на построение. Приложение къ „Сборнику геометрическихъ задачъ на построение“. Пособіе для преподавателя (Съ 280 чертеж. въ текстѣ). Изд. Г. Рябкова. Одесса. 1894.

Рябковъ, Г. З. Сборникъ геометрическихъ задачъ на построение. Для среднихъ учебныхъ заведеній. Изд. Г. Рябкова. Одесса. 1894.

Таблицы для перевода русскихъ мѣръ въ метрическія и обратно. Съ приложениемъ таблицъ математическихъ (Путиловскій заводъ) Спб. 1894.

Фокусы и опыты или замѣчательные явленія, вызываемыя общедоступными средствами. Въ 5-ти отдѣлахъ, съ рисунками. Москва. 1894. Ц. 50 к.

Александровъ, И. Методы решений геометрическихъ задачъ на построение и сборникъ геометрическихъ задачъ съ полными и краткими решениями. Курсъ среднихъ учебныхъ заведеній (для старшихъ классовъ). Изд. 5-е, исправленное, книжн. магазина В. Думнова. Москва. 1894. Ц. 1 р., съ перес. 1 р. 20 к.

Васильевъ-Яковлевъ, Н. П. Коммерческая ариѳметика въ связи съ коммерческою экономіею. Курсъ реальныхъ училищъ. Составл. по программѣ М-ства Народнаго Просвѣщенія. Изд. 3-е. Кіевъ. 1894. Ц. 1 р. 40 к.

Коломійцевъ, Н. Электричество и растенія. Опытъ бібліографіи. Спб. 1894.

Комаровъ, А. Ф. Ариѳметическій задачникъ для начальныхъ городскихъ и сельскихъ училищъ. Вып. I. Задачи, примѣры и вопросы на числа первой сотни. Изд. 3-е книжн. магазина К. Тихомирова. Москва. 1894. Ц. 15 к.

Махъ, Е. Ученіе объ электричествѣ и магнетизмѣ въ элементарномъ изложении. Переводъ съ нѣмецкаго подъ ред. Л. Геймана (Изъ „Почтово-телеграфнаго Журнала“). Спб 1894.

БИБЛІОГРАФІЧЕСКІЙ ЛІСТОКЪ

НОВЪЙШИХЪ НѢМЕЦКИХЪ ИЗДАНИЙ.

М а т е м а т и к а .

Sachs, J., Prof., Dr. Lehrbuch der ebenen Elementargeometrie. (Planimetrie). 6. Tl. Proportionalitt der Strecken. Bearb. nach System Kleyer. gr. 8⁰. (VIII + 175 m. 90 Fig.). Stuttgart. J. Maier. M. 4,00.

Scheffler, Herm., Dr. Beleuchtung und Beweis eines Satzes aus Legendre's Zahlentheorie. gr. 8⁰ (40 S.). Leipzig. F. Foerster. M. 1,00.

Tschumi, Joh. Ein Beitrag zur Geschichte und. Discussion der Cycloiden. Diss. gr. 8⁰ (48 S. m. 1 Taf.). Bern. H. Koerber. M. 1,50.

Heinitz, Geo. Elementare Berechnung der Zahl μ , welche den quadratischen Restcharakter bestimmt. Diss. gr. 8⁰. Göttingen. Vandenhoeck, & Ruprecht. M. 1,00.

Kohn, Gust. Privatdoc., Dr. Ueber eine Eigenschaft der Invarianten von Covarianten. Lex- 8⁰ (13 S.) Wien. F. Tempsky. M. 0,30.

Sobotka, J. Ueber Berührungscurven der Schraubungsregelflchen mit umschriebenen Cylinderflchen. gr. 8⁰ (38 S. m. 2 Taf.) Prag. F. Rivnac. M. 1,20.

Speckmann, G. Beitrage zur Zahlenlehre. gr. 8⁰ (V + 64). Oldenburg, Eschen & Fasting. M. 2,00.

Thompson, Henry Dallas. Hyperelliptische Schnittsysteme und Zusammenordnung der algebraischen und transzendentalen Thetacharakteristiken. Diss. gr. 4⁰. (33 S. m. Fig.). Baltimore, Göttingen.--Vandenhoeck & Ruprecht. M. 2,00.

Weierstrass, K. Formeln und Lehrstze zum Gebrauche der elliptischen Funktionen. Nach Vorlesungen und Aufzeichnungen des Hrn. K. W. bearb. u. hrsg. von H. A. Schwarz. 2. Ausg. 1. Abth. gr. 4⁰. (XII + 96) Berlin. J. Springer. M. 10,00.

Deter, Chr., Joh. Dr. Repetitorium der Differential und Integralrechnung. 3. Aufl. 8⁰ (119 S. m. Fig.) Berlin. M. Rockenstein. M. 2,00.

Thannabaur, Jos., Ob.-Realsch.-Prof. Berechnung von Renten und Lebens-Versicherungen. An der Hand von Beispielen erlautert. gr. 8⁰ (III + 135) Wien.. M. Graeser. M. 3,00.

Dirichlet, P. G. Legeune. Vorlesungen uber Zahlentheorie. Hrsg. und mit. Zuszen versehen von. Prof. R. Dedekind. 4. Aufl. gr. 8⁰ (XVII + 657) Braunschweig. F. Vieweg & Sohn. M. 14,00.

Molenbroek, P., Privatdoc., Dr. Anwendung der Quaternionen auf die Geometrie. gr. 8⁰ (XV + 257 + 8) Leiden. E. J. Brill. M. 7,00.

Cantor, Mor. Vorlesungen uber Geschichte der Mathematik 1. Bd. Von den ltesten Zeiten bis zum J. 1200 n. Chr. 2. Aufl. gr. 8⁰ (VII + 883 m. 114 Fig. u. 1 lith. Taf.) Leipzig. B. G. Teubner. M. 22,00.

Duree, H., Prof. i. R., Dr. Elemente der Theorie der Funktionen einer complexen veranderlichen Grosse. Mit besond. Bercksicht. der Schopfungen Riemann's bearb. 4. Aufl. gr. 8⁰ (X + 300). Leipzig. B. G. Teubner. M. 6,80.

Mitteilungen der mathematischen Gesellschaft in Hamburg. 3 Bd. 4. Hft. Red. v. Jaerisch, Kopcke und Schroder. gr. 8⁰ (S. 167 - 192). Leipzig. B. G. Teubner. M. 1,00.

Schotten, Heur., Dr. Inhalt u. Methode des planimetrischen Unterrichts. Eine vergleich. Planimetrie. 2 Bd. gr. 8⁰ (IV + 410) Leipzig. B. G. Teubner. M. 8,00.

Descartes, Ren . Die Geometrie. Deutsch hrsg. von Ludw. Schlesinger. gr. 8⁰ (XI + 116 m. 2 Taf.) Berlin. Mayer u. Mller. M. 3,60.

Heffter, Lothar, Prof., Dr. Einleitung in die Theorie der linearen Differentialgleichungen mit e. unabhangigen Variabeln. gr. 8⁰ (XIV + 258 m. 3 Fig.) Leipzig. B. G. Teubner. M. 6,00.

Katalog der auf Hamburger Biblioteken vorhandenen Litteratur aus der reinen und angewandten Mathematik und Physik. Hrsg. von der mathemat. Gesellschaft in Hamburg anlsslich ihres 200 jahr. Jubelfestes. 1. Nachtrag. gr. 8⁰ (88). Hamburg. Verlagsanstalt u. Druckerei. M. 2,00.

Приложение къ „Вѣстнику Опытной Физики и Элементарной Математики“.

Таблица нечетныхъ составныхъ чиселъ (отъ 3269 до 3827).

(Продолженіе *).

3269	7.467	3383	17.199	3489	3.1163	3605	5.7.103	3721	61 ²
3273	3.1091	3385	5.677	3493	7.499	3609	3 ² .401	3723	3.17.73
3275	5 ² .131	3387	3.1129	3495	3.5.233	3611	23.157	3725	5 ² .149
3277	29.113	3393	3 ² .13.29	3497	13.269	3615	3.5.241	3729	3.11.113
3279	3.1093	3395	5.7.97	3501	3 ² .389	3619	7.11.47	3731	7.13.41
3281	17.193	3397	43.79	3503	31.113	3621	3.17.71	3735	3 ² .5.83
3283	7 ² .67	3399	3.11.103	3505	5.701	3625	5 ³ .29	3737	37.101
3285	3 ² .5.73	3401	19.179	3507	3.7.167	3627	3 ² .13.31	3741	3.29.43
3287	19.173	3403	41.83	3509	11 ² .29	3629	19.191	3743	19.197
3289	11.13.23	3405	3.5.227	3513	3.1171	3633	3.7.173	3745	5.7.107
3291	3.1097	3409	7.487	3515	5.19.37	3635	5.727	3747	3.1249
3293	37.89	3411	3 ² .379	3519	3 ² .17.23	3639	3.1213	3749	23.163
3295	5.659	3415	5.683	3521	7.503	3641	11.331	3751	11 ² .31
3297	3.7.157	3417	3.17.67	3523	13.271	3645	3 ⁶ .5	3753	3 ³ .139
3303	3 ² .367	3419	13.263	3525	3.5 ² .47	3647	7.521	3755	5.751
3305	5.661	3421	11.311	3531	3.11.107	3649	41.89	3757	13.17 ²
3309	3.1103	3423	3.7.163	3535	5.7.101	3651	3.1217	3759	3.7.179
3311	7.11.43	3425	5 ² .137	3537	3 ³ .131	3653	13.281	3763	53.71
3315	3.5.13.17	3427	23.149	3543	3.1181	3655	5.17.43	3765	3.5.251
3317	31.107	3429	3 ³ .127	3545	5.709	3657	3.23.53	3771	3 ² .419
3321	3 ⁴ .41	3431	47.73	3549	3.7.13 ²	3661	7.523	3773	7 ³ .11
3325	5 ² .7.19	3435	3.5.229	3551	53.67	3663	3 ² .11.37	3775	5 ² .151
3327	3.1109	3437	7.491	3553	11.17.19	3665	5.733	3777	3.1259
3333	3.11.101	3439	19.181	3555	3 ² .5.79	3667	19.193	3781	19.199
3335	5.23.29	3441	3.31.37	3561	3.1187	3669	3.1223	3783	3.13.97
3337	47.71	3443	11.313	3563	7.509	3675	3.5 ² .7 ²	3785	5.757
3339	3 ² .7.53	3445	5.13.53	3565	5.23.31	3679	13.283	3787	7.541
3341	13.257	3447	3 ² .383	3567	3.29.41	3681	3 ² .409	3789	3 ² .421
3345	3.5.223	3451	7.17.29	3569	43.83	3683	29.127	3791	17.223
3349	17.197	3453	3.1151	3573	3 ² .397	3685	5.11.67	3795	3.5.11.23
3351	3.1117	3455	5.691	3575	5 ² .11.13	3687	3.1229	3799	29.131
3353	7.479	3459	3.1153	3577	7 ² .73	3689	7.17.31	3801	3.7.181
3355	5.11.61	3465	3 ² .5.7.11	3579	3.1193	3693	3.1231	3805	5.761
3357	3 ² .373	3471	3.13.89	3585	3.5.239	3695	5.739	3807	3 ⁴ .47
3363	3.19.59	3473	23.151	3587	17.211	3699	3 ³ .137	3809	13.293
3365	5.673	3475	5 ² .139	3589	37.97	3703	7.23 ²	3811	37.103
3367	7.13.37	3477	3.19.61	3591	3 ³ .7.19	3705	3.5.13.19	3813	3.31.41
3369	3.1123	3479	7 ² .71	3595	5.719	3707	11.337	3815	5.7.109
3375	3 ³ .5 ³	3481	59 ²	3597	3.11.109	3711	3.1237	3817	11.347
3377	11.307	3483	3 ⁴ .43	3599	59.61	3713	47.79	3819	3.19.67
3379	31.109	3485	5.17.41	3601	13.277	3715	5.743	3825	3 ² .5 ² .17
3381	3.7 ² .23	3487	11.317	3603	3.1201	3717	3 ² .7.59	3827	43.89

*) См. справ. табл. №№ IV, VII, XIV, XVII, XXII и XXV.

ОБЗОРЪ НАУЧНЫХЪ ЖУРНАЛОВЪ.

МАTHESIS.

1894. — № 6.

Sur l'enveloppe d'une droite de longueur constante dont les extrémités glissent sur les deux côtés d'un angle quelconque. Par. J. M. Пусть прямая $AB = l$ скользить концами А и В по двумъ прямымъ, пересѣкающимся въ О и составляющимъ уголь $= \frac{\pi}{2} - 2\alpha$. Относя эти прямые къ прямоугольнымъ осямъ координатъ Ox и Oy , симметричнымъ относительно биссектрисы составленнаго ими угла, получимъ ихъ ур-нія:

$$y = x \cdot \operatorname{tg} \alpha, \quad y = x \cdot \operatorname{cotg} \alpha. \quad (1)$$

Ур-ніе прямой АВ относительно тѣхъ же осей будетъ:

$$x \sin \varphi + y \cos \varphi = a \sin \varphi \cos \varphi + b, \quad (2)$$

гдѣ $a = \frac{l}{\cos 2\alpha}$, $b = \frac{1}{2} \lg 2\alpha$, и φ уголъ, составляемый прямой АВ съ отрицательнымъ направлениемъ оси Ox . Ур-ніе обвертки прямой АВ получится черезъ исключение φ изъ ур-нія (2) и производнаго отъ него ур-нія

$$x \cos \varphi - y \sin \varphi = a \cos^2 \varphi - a \sin^2 \varphi;$$

ур-нія эти приводятся къ виду:

$$\begin{aligned} x &= a \cos^3 \varphi + b \sin \varphi, \\ y &= a \sin^3 \varphi + b \cos \varphi. \end{aligned} \quad \left. \right\} \quad (M).$$

Положивъ въ этихъ ур-няхъ $b = 0$, получимъ ур-нія

$$x = a \cos^3 \varphi, \quad y = a \sin^3 \varphi \quad (M')$$

гипоциклоиды съ четырьмя точками возврата, происходящей отъ катанія круга радиуса $\frac{1}{2} a$ по окружности радиуса a , или обвертки прямой $= a$, скользящей концами по осямъ Ox и Oy . Изъ сравненія кривыхъ (M) и (M') обнаруживается, что эти кривыя во всѣхъ точкахъ отстоятъ одна отъ другой на разстояніе b ; обѣ эти кривыя имѣютъ общую развертку и разность ихъ радиусовъ кривизны $= \pm b$. Слѣдов. кривая М имѣтъ четыре точки возврата, которыми она дѣлится на 4 части; каждыя двѣ не смежныя изъ этихъ частей равны и симметричны относительно начала координатъ; длина всей кривой М равна длинѣ кривой M'.

Rayon de courbure d'une conique. Par M. A. Gob. Обозначимъ черезъ ρ радиусъ кривизны въ точкѣ М конического сѣченія, описанного около тр-ка ABC. Если x, y, ζ суть разстоянія точки М отъ сторонъ этого тр-ка, а α, β, γ — разстоянія его вершинъ отъ касательной въ М къ коническому сѣченію, то

$$\rho = R \frac{x y z}{\alpha \beta \gamma}, \quad (1)$$

гдѣ R — радиусъ круга описанного около тр-ка ABC.

Доказ. Если ABC и A'B'C' суть два тр-ка, вписанныхъ въ одну окружность, то, выражая площадь тр-ка черезъ произведеніе его сторонъ, дѣленное на двойной диаметръ, получимъ равенство

$$\frac{A'BCB'CA.C'AB}{AB'C'.BC'A'.CA'B'} = \frac{ABC}{A'B'C'} \quad (2)$$

которое остается справедливымъ и для тр-въ, вписанныхъ въ коническое сѣченіе (въ этомъ можно убѣдиться при помощи метода ортогонал. проекцій). Если R и R'

Обложка
ищется

Обложка
ищется