

Обложка
ищется

Обложка
ищется

ВѢСТНИКЪ ОПЫТНОЙ ФИЗИКИ

и

ЭЛЕМЕНТАРНОЙ МАТЕМАТИКИ.

№ 226.

Содержание: Нѣкоторыя примѣненія двучленныхъ уравненій: $z^n - 1 = 0$ и $z^n + 1 = 0$. С. Гирмана. — Изслѣдование о многогранникахъ симметрической формы (переводъ съ французскаго) (окончаніе). А. Бравэ. — Рецензія. „Сборникъ геометрическихъ задачъ съ примѣненіемъ тригонометріи для ихъ рѣшенія“. Н. Сорокина. П. Полистика. — Задачи № 278 — 283. — Рѣшенія задачъ 3-ей сер. №№ 197, 198 и 205. — Полученные рѣшенія задачъ. — Объявленія.

НѢКОТОРЫЯ ПРИМѢНЕНІЯ ДВУЧЛЕННЫХЪ УРАВНЕНИЙ:

$$z^n - 1 = 0 \text{ и } z^n + 1 = 0.$$

§ 1. Корни рѣшенныхъ алгебраически двучленныхъ уравненій:

$$z^n - 1 = 0 \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (1)$$

и

$$z^n + 1 = 0, \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (2)$$

будутъ вообще составныя количества вида:

$$z = x + yi, \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (3)$$

гдѣ x и y количества дѣйствительныя.

Всякое составное количество вида (3) можетъ быть представлено въ видѣ слѣдующаго тригонометрическаго выраженія:

$$z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi),$$

гдѣ r обозначаетъ дѣйствительное положительное количество и называется *модулемъ*, а φ — *аргументомъ* составного количества z .

Для корней уравненій (1) и (2) модули равны единицѣ, т. е. $r = 1$, такъ что тригонометрическія выраженія этихъ корней будутъ имѣть такой болѣе простой видъ:

http://Voropin.ru

$$z = \cos\varphi + i\sin\varphi, \dots \quad (4)$$

и, какъ извѣстно¹⁾, даются для уравненія (1) формулой:

$$z_{k+1} = \cos \frac{2\pi k}{n} + i\sin \frac{2\pi k}{n}, \dots \quad (5)$$

гдѣ

$$k = 0, 1, 2, \dots, n - 1,$$

и для уравненія (2) формулой:

$$z_{k+1} = \cos \frac{\pi(2k+1)}{n} + i\sin \frac{\pi(2k+1)}{n}, \dots \quad (6)$$

гдѣ также

$$k = 0, 1, 2, \dots, n - 1.$$

Рассматривая формулы (5) и (6), легко замѣтить, что аргументы корней каждого изъ соответствующихъ двучленныхъ уравненій (1) и (2) всѣ различны, положительны, меньше 2π и возрастаютъ по величинѣ, когда вмѣсто k подставлять послѣдовательно числа: 0, 1, 2, ..., $n-1$. Слѣдовательно, решивъ алгебраически уравненіе (1) или (2) и желая для каждого изъ полученныхъ такимъ образомъ n корней найти соответствующее тригонометрическое выраженіе, надо только эти n корней расположить въ такомъ порядке, чтобы ихъ аргументы возрастили по величинѣ отъ 0 до 2π , и приравнять соответствующимъ по порядку тригонометрическимъ выраженіямъ, даваемымъ для z_{k+1} при $k=0, 1, 2, \dots, n-1$ соответствующему уравненію формулою (5) или (6).

Чтобы вывести правило: какъ располагать корни уравненія (1) или (2) въ указанномъ порядке, надо разсмотрѣть, какъ измѣняются количества x и y при возрастаніи аргумента φ отъ 0 до 2π ; но по-лагая

$$x + yi = \cos\varphi + i\sin\varphi,$$

получаемъ

$$x = \cos\varphi, \quad y = \sin\varphi;$$

следовательно надо разсмотрѣть, какъ измѣняются $\cos\varphi$ и $\sin\varphi$ при возрастаніи φ отъ 0 до 2π .

Здѣсь представляются слѣдующіе четыре случая:

- 1) Если $\varphi = 0$, то $\sin\varphi = 0$, а $\cos\varphi = 1$.
- 2) Если φ возрастаетъ отъ 0 до π , то $\sin\varphi > 0$, а $\cos\varphi$ убываетъ отъ +1 до -1.
- 3) Если $\varphi = \pi$, то $\sin\varphi = 0$, а $\cos\varphi = -1$.
- 4) Если φ возрастаетъ отъ π до 2π , то $\sin\varphi < 0$, а $\cos\varphi$ возрастаетъ отъ -1 до +1.

¹⁾ Я. Блюмбергъ. Дополнительный статьи алгебры. 4-е издание. СПБ. 1890.
Стран.: 16—17.

Но $\sin\varphi = y$, а $\cos\varphi = x$; поэтому мы получаемъ слѣдующее правило:

Желая п корней одного изъ уравнений:

$$z^n - 1 = 0 \text{ или } z^n + 1 = 0,$$

решенныхъ алгебраически, расположимъ въ такомъ порядке, чтобы ихъ аргументы постепенно возрастили по величинѣ отъ 0 до 2π , разбиваемъ эти корни на четыре группы, при чмъ самыя группы и составляющіе каждую группу корни располагаемъ въ слѣдующемъ порядке:

I группа. Только одинъ корень: $z = 1$, если окажется такой.

II группа. Всѣ корни вида: $z = x + yi$, где $y > 0$; ихъ надо расположить въ такомъ порядке, чтобы ихъ действительная часть x постепенно убывала по величинѣ отъ +1 до -1.

III группа. Только одинъ корень: $z = -1$, если окажется такой.

IV группа. Всѣ остальные корни; это будуть корни вида: $z = x + yi$, где $y < 0$; ихъ надо расположить въ такомъ порядке, чтобы ихъ действительная часть x постепенно возрастила по величинѣ отъ -1 до +1.

Положимъ, что, слѣдя этому правилу, мы расположили n корней въ требуемомъ порядке и перенумеровали ихъ, и пусть корень, стоящій на $(k+1)$ -омъ мѣстѣ, будетъ

$$z_{k+1} = x_{k+1} + iy_{k+1};$$

въ такомъ случаѣ его можно приравнять тригонометрическому выражению, даваемому для z_{k+1} соотвѣтствующемъ изъ формулъ (5) или (6). Такимъ образомъ для уравненія (1) должно быть

$$z_{k+1} = x_{k+1} + iy_{k+1} = \cos \frac{2\pi k}{n} + i \sin \frac{2\pi k}{n}, \quad \dots \quad (7)$$

откуда

$$\cos \frac{2\pi k}{n} = x_{k+1}, \quad \sin \frac{2\pi k}{n} = y_{k+1} \quad \dots \quad (8)$$

при

$$k = 0, 1, 2, \dots, n-1,$$

и для уравненія (2) должно быть

$$z_{k+1} = x_{k+1} + iy_{k+1} = \cos \frac{\pi(2k+1)}{n} + i \sin \frac{\pi(2k+1)}{n}, \quad (9)$$

откуда

$$\cos \frac{\pi(2k+1)}{n} = x_{k+1}, \quad \sin \frac{\pi(2k+1)}{n} = y_{k+1} \quad \dots \quad (10)$$

при


$$k = 0, 1, 2, \dots, n-1.$$

Формулы (7) и (9) даютъ для каждого корня двучленныхъ уравнений (1) и (2) соотвѣтствующее ему искомое тригонометрическое вы-

раженіе; формулы же (8) и (10) даютъ возможность привести къ решенію двучленныхъ уравненій (1) и (2) степени n вычисленіе sinus'овъ и cosinus'овъ дугъ, соизмѣримыхъ съ полуокружностью и имѣющихъ общую мѣрою съ нею $\frac{1}{n}$ часть ея.

§ 2. Положимъ, что окружность радиуса R и центра O (фиг. 64) въ точкахъ A_1, A_2, \dots, A_n раздѣлена на n равныхъ частей, такъ что

$$\widehat{A_1 A_2} = \widehat{A_2 A_3} = \dots = \widehat{A_n A_1}.$$



Фиг. 64.

будетъ выпуклый²⁾, а n -угольники остальныхъ порядковъ звѣздообразные. Вычислимъ $a_n^{(k)}$.

Если a обозначаетъ длину хорды, вписанной въ окружность радиуса R , а φ — величину центрального угла, опирающагося на эту хорду, то, какъ извѣстно,

$$a = 2R \sin \frac{\varphi}{2}. \quad \dots \dots \dots \quad (11)$$

Но

$$\sin \frac{\varphi}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos \varphi}{2}};$$

следовательно

$$a = R \sqrt{2(1 - \cos \varphi)}. \quad \dots \dots \dots \quad (12)$$

Замѣчая, что $\angle A_n O A_k = \frac{2\pi k}{n}$, можемъ на основаніи формулы (11)

и (12) написать:

$$a_n^{(k)} = 2R \sin \frac{\pi k}{n}. \quad \dots \dots \dots \quad (13)$$

и

$$a_n^{(k)} = R \sqrt{2 \left(1 - \cos \frac{2\pi k}{n} \right)}. \quad \dots \dots \dots \quad (14)$$

²⁾ Слѣдовательно обозначеніе: $a_n^{(1)}$, равносильно общепринятому обозначенію: a_n .

Изъ этихъ формулъ вытекаютъ слѣдующія заслуживающія вниманія равенства:

$$a_n^{(k)} = a_n^{(n-k)}, \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (15)$$

$$a_{nm}^{(km)} = a_n^{(k)} \cdot \dots \cdot \dots \cdot \dots \quad (16)$$

При $k = 2m$ изъ формулъ (13) и (8) получаемъ:

$$a_n^{(2m)} = 2Ry_{m+1}, \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (17)$$

если $z_{m+1} = x_{m+1} + iy_{m+1}$ будетъ $(m+1)$ -ый корень уравненія (1).

При $k = 2m+1$ изъ формулъ (13) и (10) получаемъ:

$$a_n^{(2m+1)} = 2Ry_{m+1}, \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (18)$$

если $z_{m+1} = x_{m+1} + iy_{m+1}$ будетъ $(m+1)$ -ый корень уравненія (2).

Наконецъ при $k = 1, 2, 3, \dots, n-1$ изъ формулъ (14) и (8) получаемъ:

$$a_n^{(k)} = R \sqrt{2(1-x_{k+1})}, \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad (19)$$

если $z_{k+1} = x_{k+1} + iy_{k+1}$ будетъ $(k+1)$ -ый корень уравненія (1).

Формулы (17) и (18) проще формулы (19) и могутъ быть съ удобствомъ примѣняемы, если приходится пользоваться только одной изъ нихъ; въ противномъ же случаѣ, чтобы не рѣшать двухъ уравненій (1) и (2), удобнѣе пользоваться формулой (19), которая требуетъ рѣшенія только одного уравненія (1).

Такимъ образомъ мы видимъ, что вычисленіе сторонъ правильныхъ вписанныхъ n -угольниковъ можетъ быть приведено къ алгебраическому рѣшенію двучленныхъ уравненій (1) и (2) степени n и даже къ рѣшенію только одного уравненія (1), и слѣдовательно можетъ быть выполнено всегда, ибо высшая алгебра даетъ возможность рѣшить алгебраически уравненія (1) и (2) при какомъ угодно цѣломъ положительному показателю n .

Построеніе же сторонъ правильныхъ вписанныхъ n -угольниковъ, а слѣдовательно и дѣленіе окружности на n равныхъ частей, можетъ быть выполнено при помощи линейки и циркуля только тогда, когда алгебраическая выражение корней уравненія (1) содержитъ только квадратные радикалы. Но если n число простое, то, какъ показалъ Gauss, уравненіе (1) можетъ быть рѣшено въ квадратныхъ радикалахъ, а слѣдовательно и окружность можетъ быть раздѣлена на простое число n равныхъ частей при помощи линейки и циркуля только, если $n = 2^m + 1$, гдѣ m цѣлое положительное число. Доказательство этого предложенія можно найти въ курсахъ „Высшей алгебры“ J.-A. Serret³), проф. М. Е. Ващенко-Захарченко⁴), г. Д. Селиванова⁵) и др.

³) J.-A. Serret. Cours d'Algèbre supérieure. 5-ème éd. T. II. Paris. 1885.
n^os 542—547, pages: 556—573.

⁴) М. Е. Ващенко-Захарченко. Высшая алгебра. Киевъ. 1890. §§ 158 — 165
стран.: 212—229.

⁵) Д. Селивановъ. Теорія алгебраического рѣшенія уравненій. СПБ. 1885.
§§ 21—40, стран.: 42—92.

§ 3. Чтобы показать примѣненіе правила, выведенаго въ § 1, и формулъ, выведенныхъ въ § 2, я возьму уравненіе:

$$z^8 - 1 = 0. \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (20)$$

Для этого уравненія формула (5) обращается въ слѣдующую:

$$z_{k+1} = \cos \frac{\pi k}{4} + i \sin \frac{\pi k}{4},$$

или

гдѣ

$$z_{k+1} = \cos(45^\circ \cdot k) + i \sin(45^\circ \cdot k), \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (21)$$

$$k = 0, 1, 2, \dots, 7.$$

Замѣчая, что тождественно:

$$z^8 - 1 = (z - 1)(z + 1)(z^2 + 1)(z^4 + 1),$$

легко найдемъ восемь значеній для z :

$$z = \pm 1,$$

$$z = \pm i,$$

$$z = \frac{\sqrt{2}}{2} \pm i \frac{\sqrt{2}}{2},$$

$$z = -\frac{\sqrt{2}}{2} \pm i \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Располагая эти корни согласно правилу, данному въ § 1, и приравнивая ихъ тригонометрическимъ выраженіямъ, даваемымъ формулой (21) для z_{k+1} при $k = 0, 1, 2, \dots, 7$, получаемъ:

$$\text{I группа: } z_1 = x_1 + y_1 i = 1 = \cos 0^\circ + i \sin 0^\circ;$$

$$z_2 = x_2 + y_2 i = \frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} = \cos 45^\circ + i \sin 45^\circ,$$

$$\text{II группа: } \begin{cases} z_3 = x_3 + y_3 i = i = \cos 90^\circ + i \sin 90^\circ, \\ z_4 = x_4 + y_4 i = -\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} = \cos 135^\circ + i \sin 135^\circ; \end{cases}$$

$$\text{III группа: } z_5 = x_5 + y_5 i = -1 = \cos 180^\circ + i \sin 180^\circ;$$

$$z_6 = x_6 + y_6 i = -\frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2} = \cos 225^\circ + i \sin 225^\circ,$$

$$\text{IV группа: } \begin{cases} z_7 = x_7 + y_7 i = -i = \cos 270^\circ + i \sin 270^\circ, \\ z_8 = x_8 + y_8 i = \frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2} = \cos 315^\circ + i \sin 315^\circ; \end{cases}$$

отсюда:

$$\begin{aligned}
 x_1 &= 1 = \cos 0^\circ, & y_1 &= 0 = \sin 0^\circ, \\
 x_2 &= \frac{\sqrt{2}}{2} = \cos 45^\circ, & y_2 &= \frac{\sqrt{2}}{2} = \sin 45^\circ, \\
 x_3 &= 0 = \cos 90^\circ, & y_3 &= 1 = \sin 90^\circ, \\
 x_4 &= -\frac{\sqrt{2}}{2} = \cos 135^\circ, & y_4 &= -\frac{\sqrt{2}}{2} = \sin 135^\circ, \\
 x_5 &= -1 = \cos 180^\circ, & y_5 &= 0 = \sin 180^\circ, \\
 x_6 &= -\frac{\sqrt{2}}{2} = \cos 225^\circ, & y_6 &= -\frac{\sqrt{2}}{2} = \sin 225^\circ, \\
 x_7 &= 0 = \cos 270^\circ, & y_7 &= -1 = \sin 270^\circ, \\
 x_8 &= \frac{\sqrt{2}}{2} = \cos 315^\circ, & y_8 &= -\frac{\sqrt{2}}{2} = \sin 315^\circ.
 \end{aligned}$$

На основании этихъ равенствъ, а также равенствъ (15) и (16) по формулѣ (19) находимъ:

$$\begin{aligned}
 a_8^{(1)} &= a_8^{(7)} = a_8 = R\sqrt{2(1-x_2)} = R\sqrt{2-\sqrt{2}}, \\
 a_8^{(2)} &= a_8^{(6)} = a_4 = R\sqrt{2(1-x_3)} = R\sqrt{2}, \\
 a_8^{(3)} &= a_8^{(5)} = R\sqrt{2(1-x_4)} = R\sqrt{2+\sqrt{2}}, \\
 a_8^{(4)} &= R\sqrt{2(1-x_5)} = 2R.
 \end{aligned}$$

Величины $a_8^{(2)}$, $a_8^{(4)}$ и $a_8^{(6)}$ можно также найти по формулѣ (17) следующимъ образомъ:

$$\begin{aligned}
 a_8^{(2)} &= a_8^{(6)} = a_4 = 2Ry_2 = R\sqrt{2}, \\
 a_8^{(4)} &= 2Ry_3 = 2R.
 \end{aligned}$$

Вычисление же величинъ $a_8^{(1)}$, $a_8^{(3)}$, $a_8^{(5)}$ и $a_8^{(7)}$ по формулѣ (18) потребовало бы рѣшенія уравненія:

$$z^8 + 1 = 0.$$

§ 4. Разсматривая руководства къ „Дополнительнымъ статьямъ алгебры“ гг. Соколова, Блюмберга, Флорова и Киселева, я только въ руководствѣ г. Соколова нашелъ правило: какъ располагать корни рѣшеннаго алгебраически уравненія:

$$x^n - r^n = 0, \quad \dots, \quad \dots, \quad \dots \quad (22)$$

въ такомъ порядке, чтобы ихъ аргументы постепенно возрастили отъ 0 до 2π . Именно, полагая, что эти корни будутъ вида:

$$a_n + b_n i,$$

$$k = 0, 1, 2, 3, \dots, n-1,$$

г. Соколовъ говоритьъ слѣдующее:

„Вещественные члены корней a_0, a_1, a_2, \dots дадутъ намъ косинусы, „а коэффициенты при мнимомъ $i - b_0, b_1, b_2, \dots b_n$, дадутъ синусы угловъ „ $0, \frac{2\pi}{n}, \frac{4\pi}{n}, \frac{6\pi}{n}, \dots$ при чемъ слѣдуетъ имѣть въ виду, что корни должно „расположить въ такомъ порядке, чтобы $a_0, a_1, a_2, \dots a_k, \dots$ убывали „отъ $+1$ до -1 и затѣмъ возрастили опять до $+1$, а $b_0, b_1, b_2, \dots b_k \dots$ „возрастили отъ 0 до $+1$, затѣмъ убывали до -1 и вновь возрастили „до нуля“⁶⁾...

Правило это, во первыхъ, по отношенію къ уравненію (22) имѣеть смыслъ лишь при $r = 1$, о чёмъ г. Соколовъ почему то умалчиваетъ, а во вторыхъ, оно и при сказанномъ условіи весьма не совершенно и не опредѣленно, ибо расположить только $a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$ или только $b_0, b_1, b_2, \dots, b_{n-1}$ въ порядке, указанномъ этимъ правиломъ, это двѣ неопределѣнныя задачи, допускающія множество решений, а какъ согласить эти задачи, какъ решить ихъ совмѣстно, на это никакихъ практическихъ указаний правила г. Соколова не даетъ.

Остальные изъ вышепоименованныхъ авторовъ не только не даютъ никакого общаго сюда относящагося правила, но даже, приравнивая алгебраическія выраженія корней уравненій:

$$z^3 - 1 = 0 \dots \dots \dots \dots \quad (23)$$

и

$$z^5 - 1 = 0 \dots \dots \dots \dots \quad (24)$$

соответствующимъ тригонометрическимъ выраженіямъ этихъ корней, не даютъ никакихъ указаний на то, чѣмъ они руководствуются при этомъ. Все ихъ объясненіе ограничивается такими фразами:

„сравнивъ же эти результаты съ предыдущими, найдемъ, что“⁷⁾...

„сравнивъ же эти результаты съ вышенайденными корнями, получимъ“⁸⁾...

„Теперь мы имѣемъ двѣ формы корней; сопоставляя ихъ, получимъ“⁹⁾...

„Сопоставивъ эту форму корней съ тригонометрической формой и „принявъ во вниманіе теорему о равенствѣ комплексныхъ количествъ, „получимъ“¹⁰⁾...

„Сравнивая два вида корней, находимъ, что“¹¹⁾...

Только относительно корней уравненія (24) г. Киселевъ даетъ нѣкоторое поясненіе:

„Сравнивая два вида корней, замѣчаемъ, что $\cos \frac{2\pi k}{5}$ можетъ рав-

⁶⁾ В. Соколовъ. Дополнительные статьи алгебры. Острровъ. 1892. Стран.: 107.

⁷⁾ Я. Блюмбергъ. Дополнительные статьи алгебры. 4-е издание. СПБ. 1890 Стран.: 18.

⁸⁾ Тамъ же. Стран.: 19.

⁹⁾ П. С. Флоровъ. Курсъ дополнительныхъ статей алгебры. М. 1893. Стран.: 30

¹⁰⁾ Тамъ же. Стран.: 33.

¹¹⁾ А. Киселевъ. Дополнительные статьи алгебры. М. 1893. Стран.: 100.

„нятъся или $\frac{\sqrt{5}-1}{4}$, или $-\frac{\sqrt{5}+1}{4}$; но такъ какъ $\frac{2\pi}{5} < \frac{\pi}{2}$, то $\cos \frac{2\pi}{5} > 0$
 „и потому $\cos \frac{2\pi}{5} = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$ “^{12).}

Что касается вычислениі сторонъ правильныхъ вписаныхъ многоугольниковъ, то, исходя изъ графического изображенія мнимыхъ выраженийъ, г. Соколовъ¹³⁾ выводитъ двѣ формулы, которые, будучи исправлены отъ опечатокъ, имѣютъ слѣдующій видъ:

$$a_n = \sqrt{b_1^2 + (r-a_1)^2}, \dots \quad (25)$$

$$a_n^{(k)} = \sqrt{b_{k+1}^2 + (r-a_{k+1})^2}, \dots \quad (26)$$

гдѣ

$$k = 1, 2, 3, \dots, n-2.$$

Здѣсь $a_n^{(k)}$ обозначаетъ то, что по моему обозначенію должно бы быть изображено черезъ $a_n^{(k+1)}$. Мое обозначеніе, между прочимъ, тѣмъ удобнѣе, что даетъ возможность на основаніи равенства (16) сокращать верхній и нижній индексы символа $a_n^{(k)}$ на ихъ общаго множителя, не нарушая величины символа. Вводя въ формулы (25) и (26) принятые мною въ этой статьѣ обозначенія, можно объ эти формулы соединить въ одну слѣдующую:

$$a_n^{(k)} = R \sqrt{y_{k+1}^2 + (1-x_{k+1})^2}, \dots \quad (27)$$

гдѣ

$$k = 1, 2, 3, \dots, n-1,$$

при чмъ $z_{k+1} = x_{k+1} + iy_{k+1}$ будетъ $(k+1)$ -ый корень уравненія (1).

Формулу же (27) легко вывести и безъ помощи графического изображенія мнимыхъ выраженийъ слѣдующимъ образомъ. Опустимъ изъ точки A_k (фиг. 64) перпендикуляръ A_kB_k на діаметръ, проведенный въ точку A_n ; тогда изъ прямоугольнаго Δ -а $A_nA_kB_k$ будемъ имѣть:

$$\overline{A_nA_k} = \sqrt{\overline{A_kB_k}^2 + \overline{A_nB_k}^2}, \dots \quad (28)$$

Но

$$\overline{A_nA_k} = a_n^{(k)},$$

$$\overline{A_kB_k} = \overline{OA_k} \cdot \sin A_k O B_k = R \sin \left(\pi - \frac{2\pi k}{n} \right) = R \sin \frac{2\pi k}{n} = R y_{k+1},$$

$$\begin{aligned} \overline{A_nB_k} &= \overline{OA_n} + \overline{OB_k} = \overline{OA_n} + \overline{OA_k} \cdot \cos A_k O B_k = R + R \cos \left(\pi - \frac{2\pi k}{n} \right) = \\ &= R - R \cos \frac{2\pi k}{n} = R \left(1 - \cos \frac{2\pi k}{n} \right) = R(1-x_{k+1}); \end{aligned}$$

¹²⁾ Тамъ же. Стран.: 101.

¹³⁾ В. Соколовъ. Дополнительныя статьи алгебры. Островъ. 1892. Стран.: 107–108.

подставляя въ равенство (28) эти значения для $\overline{A_n A_k}$, $\overline{A_k B_k}$ и $\overline{A_n B_k}$, получимъ формулу (27).

Сравненіе формулъ (19) и (27) заставляетъ отдать преимущество формулѣ (19), какъ болѣе простой.

Г. Киселевъ примѣняетъ формулы (8) къ построению нѣкоторыхъ правильныхъ вписанныхъ многоугольниковъ, но сторонъ ихъ не вычисляетъ.

Гр. Блюмбергъ и Флоровъ для вычисленія сторонъ правильныхъ вписанныхъ многоугольниковъ пользуются формулой (13); но способы, которые они употребляютъ для вычисленія $\sin \frac{\pi k}{n}$ въ разматриваемыхъ ими частныхъ случаяхъ, не могутъ быть обобщены.

Формулой (13) пользуется для той же цѣли также и Serret въ своемъ „Traité de Trigonométrie“¹⁴⁾, но для вычисленія $2\sin \frac{\pi k}{n}$ онъ употребляетъ весьма остроумный и оригинальный пріемъ, который не требуетъ примѣненія правила, даннаго въ § 1 этой статьи, а требуетъ вывода другого соответствующаго правила; поэтому этого пріема я и не излагаю здѣсь.

Учит. Варш. реальн. учили. С. Гирманъ.

ИЗСЛѢДОВАНИЕ О МНОГОГРАННИКАХЪ СИММЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ. А. БРАВѢ.

(Переводъ съ французскаго).

(Окончаніе *).

Теорема LIII.—Въ дециметровомъ многограннике имѣется постоянно пятнадцать двойныхъ осей.

Поворотимъ данный многогранникъ на 72^0 вокругъ ОМ, фиг. 36, отъ A_0 къ A_1 , затѣмъ на 120^0 вокругъ OA_1 , по направленію отъ A_2 къ A_0 ; слѣдствіемъ этихъ двухъ поворотовъ будетъ переходъ полюса A_0 въ A_1 и A_1 въ A_0 . Конечный результатъ таковъ же, какъ если бы мы поворотили многогранникъ на 180^0 вокругъ радиуса OG, упирающагося въ средину дуги A_0A_1 . Видимое положеніе угловъ неизмѣнилось; слѣдовательно G есть конечная точка оси четнаго порядка, несомнѣнно второго. Такъ какъ правильный додекаэдръ имѣеть тридцать противолежащихъ попарно реберъ, то общее число двойныхъ осей равно пятнадцати.

¹⁴⁾ J.-A. Serret. Traité de Trigonométrie. 4-ième éd. Paris. 1868. n°s 167—174,
pages: 209—219.

*) См. „В. О. Ф.“ №№ 214, 215, 218, 221, 222 и 225.

Никакой другой диаметръ шара не можетъ быть двойной осью, потому что какое бы положение онъ не занималъ, онъ обусловилъ бы повтореніе тройныхъ осей, и число ихъ было бы больше десяти, что, какъ мы знаемъ, невозможно (теорема XLIII).

Можно было бы также получить пятнадцать двойныхъ осей, соединяя попарно средины противолежащихъ краевъ икосаэдра $MM_0M_1\dots$

Теорема LIV.—Децимтерные многогранники или имѣютъ пятнадцать плоскостей симметрии, соединяющихъ попарно шесть пятерныхъ осей, или совсѣмъ не имѣютъ плоскостей симметрии.

Разсмотримъ плоскость, идущую черезъ центръ шара и черезъ углы M и M_3 , фиг. 36. Эта плоскость будетъ плоскостью симметріи для системы точекъ $(A_0, A_1), (A_4, A_2)\dots, (M_2, M_4), (M_1, M_0)$ и т. д.; такимъ образомъ она не вызываетъ удвоенія числа осей, слѣдовательно ничто не противорѣчить присутствію такой плоскости симметріи.

Плоскость MM_3 расположена перпендикулярно къ прямой KK' , двойной оси системы. Плоскостей, гомологическихъ указанной, имѣется всего пятнадцать, а именно $MM_0, MM_1, MM_2, MM_3, MM_4, M_0M_2, M_1M_3, M_2M_4, M_3M_0, M_4M_1; M_0M_1, M_1M_2, M_2M_3, M_3M_4, M_4M_0$. Очевидно, что это—единственный плоскости симметріи, которые могутъ быть въ многогранникѣ; для всякаго другого положенія плоскости число тройныхъ осей превысило бы 10, что невозможно (теорема XLIII).

На фигурѣ 36 указано расположение шестидесяти гомологичныхъ угловъ S вокругъ полюсовъ A_0, A_1 и т. д. въ томъ случаѣ, когда многогранникъ не имѣть плоскостей симметріи.

Если же существуютъ указанныя выше пятнадцать плоскостей симметріи въ многогранникѣ, то треугольникъ $SS'S''$ замѣнится шестиугольникомъ. Чтобы не зачернить слишкомъ фигуры, мы ограничились изображеніемъ только одного изъ этихъ шестиугольниковъ, расположенного вокругъ полюса B_0 . Система угловъ, гомологичныхъ S , охватываетъ тогда сто двадцать угловъ. Въ извѣстныхъ особыхъ положеніяхъ S число это можетъ быть сведено къ шестидесяти, двадцати, и даже къ двѣнадцати угламъ. Этотъ послѣдній случай имѣеть мѣсто, когда уголъ S находится на концѣ одной изъ пятерныхъ осей системы.

Теорема LV.—Если въ децимтерномъ многограннике имѣются пятнадцать плоскостей симметріи, указанная въ предыдущей теоремѣ, то эти плоскости перпендикулярны къ пятнадцати двойнымъ осямъ, и многогранникъ обладаетъ центромъ симметріи; въ противномъ случаѣ центръ симметріи отсутствуетъ.

Изъ доказательства предыдущей теоремы слѣдуетъ, что двойная ось KOK' , фиг. 36, перпендикулярна къ плоскости M_3GMA_3 . Но эта плоскость есть одна изъ пятнадцати плоскостей симметріи многогранника, слѣдовательно каждая изъ этихъ плоскостей перпендикулярна къ одной изъ пятнадцати осей, и такимъ образомъ многогранникъ обладаетъ центромъ симметріи (теорема XXII). Если же многогранникъ не имѣть плоскостей симметріи, то въ силу существованія въ немъ двойныхъ осей, онъ не можетъ имѣть центра симметріи.

Теорема LVI.—Децимтерные многогранники могутъ быть двухъ раз-

личныхъ родовъ симметріи, въ зависимости отъ присутствія или отсутствія центра симметріи.

Это есть слѣдствіе теоремъ LIV и LV.

Символы этихъ двухъ родовъ симметріи:

$$[6L^5, 10L^3, 15L^2, OC, OP],$$

$$[6L^5, 10L^3, 15L^2, C, 15P^2].$$

Теорема LVII.—*Оси, характеризующія симметрію кватернерныхъ многогранниковъ съ прямоугольными двойными осями, присущіи также симметріи децемтерныхъ многогранниковъ.*

Выберемъ любую точку какой-нибудь тройной оси, напр., A_2 , фиг. 36. Средина G одной изъ двухъ сторонъ A_1A_0 и A_3A_4 , которая въ пятиугольникѣ $A_0A_1A_2A_3A_4$ прилегаютъ къ сторонѣ A_0A_4 , противолежащей углу A_2 , будетъ конечной точкой одной изъ двойныхъ осей (теорема LIII). То же будетъ имѣть мѣсто по отношенію къ точкамъ H и K, которые гомологичны G по отношенію къ тройной оси OA_2 . Въ сферическомъ треугольникѣ HGK три угла H, G и K—прямые; такимъ образомъ стороны HG, KG и HK равны 90° .

Три оси OG, OH и OK, поэтому, суть три прямоугольные тройные оси, и сферический треугольникъ GHK—сферический треугольникъ съ тремя прямыми углами. Уголъ A_2 —центръ этого треугольника. Далѣе, A_4 —центръ треугольника GHK', также содержащаго три прямыхъ угла; B_0 —центръ одинакового треугольника GH'K', при чмъ H'—низшій конецъ оси OH, и B_1 —центръ треугольника KGH' съ тремя прямыми углами.

Четыре тройные оси OA_2 , OA_4 , OB_0 , OB_1 слѣдовательно, сочетаются съ тремя двойными прямоугольными осями въ такомъ же отношеніи, какое характерно для кватернерныхъ многогранниковъ съ двойными прямоугольными осями.

Замѣчаніе.—Вмѣсто комбинаціи OA_2 , OA_4 , OB_0 , OB_1 можно взять одну изъ слѣдующихъ четырехъ комбинацій:

$$[OA_0, OA_3, OB_1, OB_2], \quad [OA_0, OA_2, OB_3, OB_4]$$

$$[OA_1, OA_3, OB_0, OB_4], \quad [OA_1, OA_4, OB_2, OB_3].$$

Теорема LVIII.—*Многогранники $[6L^5, 10L^3, 15L^2, OC, OP]$ обладаютъ всѣми элементами симметріи многогранниковъ $[4L^3, 3L^2, OC, OP]$. Многогранники $[6L^5, 10L^3, 15L^2, C, 15P^2]$ обладаютъ всѣми элементами симметріи многогранниковъ $[4L^3, 3L^2, C, 3P^2]$.*

Часть этой теоремы, относящаяся къ осямъ симметріи, уже доказана въ предыдущей теоремѣ. Изъ этого легко заключить, что многогранники $[6L^5, 10L^3, 15L^2, OC, OP]$ обладаютъ всѣми элементами симметріи многогранниковъ $[4L^3, 3L^2, OC, OP]$.

Если децемтерный многогранникъ имѣеть кромѣ того еще пятнадцать плоскостей симметріи, то плоскости KG, GH, HK, фиг. 36, находящіяся между ними, будуть представлять плоскости $3P^2$ многогранника $[4L^3, 3L^2, C, 3P^2]$. Такъ какъ центръ симметріи C существуетъ въ обоихъ случаяхъ, то очевидно, что симметрія, характеризующаяся посредствомъ $[4L^3, 3L^2, C, 3P^2]$ заключается въ болѣе совершенномъ многогранникѣ $[6L^5, 10L^3, 15L^2, C, 15P^2]$.

Замѣчаніе.—Теоремы LVII и LVIII не имѣютъ прямого значенія для общей теоріи симметрическихъ многогранниковъ. Онѣ приведены здѣсь въ виду того примѣненія, какое онѣ могутъ имѣть въ кристаллографіи, при изученіи правильной системы.

Распредѣленіе многогранниковъ по роду ихъ симметріи съ указаніемъ минимальнаго числа ихъ угловъ.

Многогранники	Символъ симметріи многогранниковъ	Классъ многогранника	Минимальное число угловъ		
			1 рода	2 рода	3 рода
4 рода					
ассиметрич.	$0L, 0C, 0P \dots \dots \dots$	1	1	1	1
безъ осей	$0L, C, OP \dots \dots \dots$	2	2	2	2
	$0L, OC, P \dots \dots \dots$	3	1	1	1
четного по- рядка	$A^{2q}, 0L^2, OC, OP \dots \dots \dots$	4	$2q$	$2q$	
	$A^{2q}, 0L^2, C, \Pi \dots \dots \dots$	5	$2q$	$2q$	
	$A^{2q}, qL^2, qL'^2, OC, OP \dots \dots \dots$	6	$4q$		
	$A^{2q}, 0L^2, OC, qP, qP' \dots \dots \dots$	7	$2q$	1	
	$A^{2q}, qL^2, qL'^2, C, \Pi, qP^2, qP'^2 \dots \dots \dots$	8	$2q$	0 или $2q^*$)	
	$A^{2q}, 2qL^2, OC, 2qP \dots \dots \dots$	9	$4q$		
съ гла в н о ю о с ъ ю	$A^{2q+1}, 0L^2, OC, OP \dots \dots \dots$	10	$2q+1$	$2q+1$	
нечетного по- рядка	$A^{2q+1}, 0L^2, C, OP \dots \dots \dots$	11	$4q+2$	$4q+2$	
	$A^{2q+1}, 0L^2, OC, \Pi \dots \dots \dots$	12	$2q+1$	$2q+1$	
	$A^{2q+1}, (2q+1)L^2, OC, OP \dots \dots \dots$	13	$4q+2$		
	$A^{2q+1}, 0L^2, OC, (2q+1)P \dots \dots \dots$	14	$2q+1$	1	
	$A^{2q+1}, (2q+1)L^2, C, (2q+1)P^2 \dots \dots \dots$	15	$4q+2$		
	$A^{2q+1}, (2q+1)L^2, OC, \Pi(2q+1)P \dots \dots \dots$	16	$2q+1$		
сфероэдрическіе	$4L^3, 3L^2, OC, 0P \dots \dots \dots$	17	12		
квадерные	$4L^3, 3L^2, C, 3P^2 \dots \dots \dots$	18	12		
девем- терные	$4L^3, 3L^2, OC, 6P \dots \dots \dots$	19	4		
	$3L^4, 4L^3, 6L^2, OC, OP \dots \dots \dots$	20	24		
	$3L^4, 4L^3, 6L^2, C, 3P^4, 6P^2 \dots \dots \dots$	21	6		
	$6L^5, 10L^3, 15L^2, OC, OP \dots \dots \dots$	22	60		
	$6L^5, 10L^3, 15L^2, C, 15P^2 \dots \dots \dots$	23	12		

*) Минимальное число угловъ 2-го рода равно $2q$, если $q = 1$, и 0, если $q > 1$.

Приведенная таблица указываетъ распределеніе многогранниковъ въ двадцать три класса, согласно принципамъ, разсмотрѣннымъ въ этомъ изслѣдованіи. Значенія символовъ A , L , L' , C , P , R , R' указаны раньше.

Мы видимъ, что классы 4, 5 до 16 включительно распадаются снова на порядки различного рода, въ зависимости отъ порядка симметріи главной оси.

Желательно, напр., изучить по этой таблицѣ элементы симметріи, присущіе многограннику 7 класса 4 порядка. Символъ его:

$$[A^4, OL^2, OC, 2P, 2P'],$$

откуда мы узнаемъ, что этотъ многогранникъ имѣеть четверную ось и четыре, проходящихъ черезъ эту ось, плоскостей симметріи, которая пересѣкаютъ другъ друга подъ 45° , двѣ плоскости одного рода, взаимно перпендикулярныя, и двѣ, также взаимно перпендикулярныя, плоскости, но уже другого рода сравнительно съ первыми,—двойные оси и центръ симметріи отсутствуютъ.

Четыре послѣднихъ столбца указываютъ наименьшее число угловъ каждого многогранника. Всѣ углы одного рода образуютъ систему гомологичныхъ угловъ, и такихъ гомологичныхъ системъ существуетъ столько, сколько различныхъ родовъ угловъ въ многогранникѣ.

Посредствомъ простого разсужденія легко можно будетъ найти форму, которую долженъ имѣть многогранникъ съ наименьшимъ числомъ угловъ. Такъ, наиболѣе простымъ многогранникомъ будетъ въ 1 классѣ—неправильный тетраэдръ; въ 2 классѣ—неправильный октаэдръ съ параллелограммомъ въ основаніи; въ 3 классѣ—разносторонній треугольникъ; въ 19 классѣ—правильный тетраэдръ; въ 21 классѣ—правильный октаэдръ; въ 23 классѣ—правильный икосаэдръ и т. д.

Як. Самойловъ (Спб.).

РЕЦЕНЗИИ.

„Сборникъ геометрическихъ задачъ съ примѣненіемъ тригонометріи для ихъ рѣшенія. Для учениковъ гимназій и реальныхъ училищъ“.

Сост. Н. Сорокинъ, преподават. Киево-печерской гимназіи. Киевъ, IV изд. 1894 г.

Съ 1891 г. во всѣхъ гимназіяхъ М. Н. Пр., а съ прошлаго 1895 г. и въ реальныхъ училищахъ, правилами, утвержденными М. Н. Пр. отъ 12 мая 1891 г. и 29 апрѣля 1895 г., произведено было коренное преобразованіе въ дѣлѣ преподаванія математики вообще и въ особенности *геометріи* и *тригонометріи*.

Преобразованіе это существеннымъ образомъ измѣняетъ какъ самую постановку преподаванія этихъ важныхъ образовательныхъ предметовъ гимназического

обученія, такъ и методовъ ихъ, ставя каждый изъ сихъ предметовъ не въ обособленныя рамки, какъ это было ранѣе, но въ ближайшее тѣсное общеніе, что и по существу дѣла непремѣнно должно быть таковыемъ. Въ виду такого важнаго преобразованія, примѣнительно къ этому измѣнена была также и самая система письменныхъ испытаний зрѣлости въ гимназіяхъ, (а съ 1895 г. тѣ же требованія примѣнены и для учениковъ реальныхъ училищъ, оканчивающихъ курсъ въ дополнительномъ классѣ), именно:—отъ экзаменующихся требуется умѣніе и достаточный насыщть вводить въ рѣшеніе предложенной геометрической задачи различнаго тригонометрическія функции, которая съ одной стороны упрощаютъ самый ходъ рѣшенія задачи, обобщаютъ выводы; а съ другой—такой методъ рѣшенія геометрической задачи доставляетъ возможность обнаружить степень знанія ученика обоихъ этихъ предметовъ,—его умѣніе пользоваться тригонометрическими формулами, логарифмами и вообще разными видами рѣшенія треугольниковъ.

Для успѣшнаго выполненія такого рода работъ по геометріи, ученики должны имѣть достаточную къ этому подготовку, что можетъ быть достигнуто лишь систематическимъ ихъ упражненіемъ въ рѣшеніи подобнаго рода специальнно составленныхъ геометрическихъ задачъ и примѣровъ. Временемъ для этой подготовки надо бы считать 2-е учебное полугодіе въ курсѣ VII-го класса, когда уже курсъ тригонометріи является почти законченнымъ,—и полный учебный годъ въ курсѣ VIII-го кл., гдѣ еще свободнѣе можно пройти съ учениками повторительные курсы геометріи и тригонометріи въ ихъ взаимной связи, постоянно при этомъ упражняя учениковъ въ рѣшеніи специально составленныхъ для этого задачъ, примѣровъ и упражненій;—но, однако, врядъ ли вездѣ, во всѣхъ гимназіяхъ, можетъ представиться возможность выполнить весь курсъ тригонометріи въ одно только 1-е судебн. полугодіе въ VII классѣ, пользуясь хотя бы и 2-хъ часовымъ недѣльнымъ урокомъ. Вопросъ этотъ слишкомъ сложный уже по самому своему существу, не говоря о побочныхъ условіяхъ, могущихъ еще болѣе, еще сильнѣе стѣснить преподавателя въ ускоренномъ прохожденіи имъ предмета тригонометріи; этими осложняющими условіями въ большинствѣ случаевъ является большое скопленіе учащихся въ этомъ классѣ, доходящее нерѣдко до 40 и болѣе учениковъ (например въ Саратовской гимназіи, гдѣ это число колеблется за послѣдніе 6 лѣтъ въ предѣлахъ 37—46 учениковъ) и, во 2-хъ,—разная степень уровня успѣшности учениковъ, при чемъ даже 10-ти—12-ти процентная неуспѣшность можетъ сильно задерживать преподаваніе. Другое совсѣмъ дѣло, когда число учащихся въ VII классѣ ограничивается 15—20-ю учениками; въ этомъ случаѣ для преподавателя всегда легче уравнять успѣшность класса и, сравнительно, въ болѣе короткое время пройти весь теоретическій курсъ предмета. Принявъ все это къ свѣдѣнію, можно навѣрное, для большинства гимназій, предположить, что теоретическій курсъ тригонометріи оканчивается лишь къ концу 3-й судебн. четверти года и, следовательно, только лишь съ этого времени можно начать систематическое повтореніе курса геометріи въ связи съ тригонометріей. При этомъ преподаваніи вся цѣль преподавателя должна быть направлена къ тому, чтобы объяснить ученикамъ, какую незамѣнную, важную для дѣла оказываетъ услугу тригонометрія въ дѣлѣ рѣшенія различныхъ геометрическихъ вопросовъ, теоремъ и задачъ, которая съ геометрической точки зрѣнія не всегда даже могутъ быть выполнены. Новизна этого дѣла для ученика и значительный его личный интересъ въ рѣшеніи подобнаго рода вопросовъ аналитическимъ методомъ, каковыемъ въ данномъ случаѣ является методъ тригонометріи,—значительно облегчаетъ трудъ преподавателя и дѣло идетъ тѣмъ успѣшнѣе, чѣмъ интереснѣе и удачнѣе составленъ подборъ задачъ и примѣровъ, которыми пользуется

преподаватель. Въ самостоятельномъ рѣшениі этихъ примѣровъ ученики сами, помимо даже ближайшаго руководства преподавателя, время-отъ-времени пріучаются постигать внутреннюю, аналитическую связь, которая въ окончательномъ результатѣ приводитъ ученика къ той или другой удобной формулѣ, пользуясь которой, путемъ подстановокъ, ученикъ самъ уже можетъ получить изъ нея отвѣты на всѣ частные случаи того же главнаго вопроса. Подобного рода занятія ученика являются въ высшей степени благотворными въ дѣлѣ общаго развитія его мыслительныхъ способностей; они пріучаются его къ правильному и разумному анализированію своихъ вычисленій и добытыхъ результатовъ и, непремѣнно,—содѣйствуютъ къ легчайшему запоминанію важнѣйшихъ геометрическихъ и тригонометрическихъ формулъ, вмѣсто обычнаго и не всегда надежнаго способа,—ихъ механическаго заучиванія,—способа, развивающаго скорѣе память ученика, чѣмъ его соображеніе. Починъ въ этомъ дѣлѣ, конечно, долженъ принадлежать прежде всего самому учителю и нельзя сказать, чтобы способъ—довести ученика до яснаго сознанія, какое громадное преимущество имѣеть тригонометрическій методъ рѣшенія многихъ чисто геометрическихъ вопросовъ,—былъ бы очень труденъ: достаточно будетъ указать ученику и сдѣлать сравненіе выводовъ чисто геометрическаго способа рѣшенія задачи съ рѣшеніемъ ея же при помощи тригонометрическаго метода,—на какихъ либо двухъ-трехъ типичныхъ примѣрахъ, каковыми, напримѣръ, могли бы служить: „опредѣленіе сторонъ правильного вписан. и описанн. многоугольниковъ при данномъ радиусѣ круга“.—Задача эта, какъ чисто геометрическая, рѣшается только въ частности для опредѣленного лишь числа сторонъ; тригонометрическій же методъ ея рѣшенія даетъ окончательную общую формулу, для которой уже всѣ геометрические случаи того же характера являются лишь частными случаями и получаются простой подстановкой.—На одномъ этомъ примѣрѣ учителъ долженъ остановиться возможно дольше, чтобы объяснить ученику всю разницу хода этихъ рѣшеній и значительного преимущества аналитического метода передъ чисто геометрическимъ, ибо,—на сколько послѣдній представляетъ много разныхъ своеобразностей, искусственности и даже вычурности, [какъ напр. въ опредѣленіи сторонъ правильного вписаннаго 10, 15-угольниковъ и друг.] и если не представляетъ особенной трудности для вычисленій, по ихъ элементарности, то во всякомъ случаѣ, для запоминанія каждого случая въ отдѣльности—дѣло это весьма не легкое для ученика и требуетъ большого напряженія его памяти, почти не затрагивая соображенія, кромѣ, конечно, самыхъ обыкновенныхъ случаевъ, какъ то a_3 , a_4 , a_6 , a_{10} и соотвѣтственно для b_3 , b_4 , ... Но тотъ же вопросъ, рѣшенный тригонометрическимъ методомъ, приводить только къ двумъ окончательнымъ формуламъ, для которыхъ всѣ частныя положенія являются слѣдствіями. Одинъ уже аналитическій разборъ приведеннаго примѣра, въ связи съ ему подобными, можетъ достаточно обеспечить успѣхъ дѣла и привести самого ученика къ ясному уразумѣнію той незамѣнной и въ высшей степени почтенной роли, какую выполняетъ тригонометрическій методъ рѣшенія многихъ чисто геометрическихъ вопросовъ, и можетъ въ ближайшемъ же будущемъ навести и самого ученика на рядъ подобныхъ же разсужденій и выводовъ. Нужно только стараться время отъ времени поддерживать ученика въ правильномъ руководствѣ и выборѣ выдающихся по своей важности примѣровъ и задачъ, рѣшеніе которыхъ еще болѣе откроетъ предъ ученикомъ замѣчательную внутреннюю связь, существующую между двумя, повидимому, разнородными предметами, какъ геометрія и тригонометрія. Для успѣшнаго достиженія новыхъ цѣлей Министерства въ дѣлѣ рациональной постановки и преподаванія математики въ гимназіяхъ, понадобились и новые, специально для этого составленныя, учебныя пособія, ибо

прежнія руководства, — до реформенныхъ, уже только въ малой вѣсмѣ мѣрѣ могли находить для себя примѣненіе въ новой учебной практикѣ; это-то именно обстоятельство и побудило многихъ изъ гг. составителей учебныхъ пособій этого рода озабочиться составленіемъ „специальныхъ сборниковъ геометрическихъ задачъ и примѣровъ“, рѣшеніе которыхъ основывалось бы на примѣненіи къ нимъ тригонометрическаго метода. Сборниковъ такого рода имѣется въ настоящее время уже около 10, при чёмъ одинъ изъ нихъ „Сборникъ геометрическихъ задачъ для учениковъ гимназій и реальныхъ училищъ“, составленный г. Сорокинъ, — преподавателемъ Кіево-Печерской гимназіи, — отпечатанъ теперь уже 4-мъ изданіемъ въ декабрѣ 1894 г.— Это изданіе, (равно какъ и предыдущее—3-е), получило одобрение Уч. Ком. М. Н. Пр.; оно представляетъ въ своемъ составѣ вѣсмѣ удачно скомбинированные 1:6 номеровъ задачъ на одинъ только отдѣлъ „Планиметріи“ и 164 задачи на „Стереометрію“, не считая цѣлаго ряда отдѣльныхъ упражненій, приложенныхъ къ нѣкоторымъ задачамъ. Всѣ почти задачи этого „Сборника“ распределены въ правильной систематической послѣдовательности по разнымъ отдѣльнымъ ученикамъ изъ всего курса геометріи. Обстоятельство это значительно облегчаетъ трудъ преподавателя и ученика при выборѣ задачъ на извѣстный отдѣлъ. Первое изданіе этого „Сборника“ вышло въ концѣ 1892 года,—а къ концу 1894 года мы уже видимъ 4-е его изданіе,—это обстоятельство уже само по себѣ очень знаменательное и, объясняясь съ одной стороны лестнымъ вниманіемъ многихъ преподавателей къ этому учебному пособію,—съ другой стороны—весмѣ характеризуетъ его со стороны учебной пользы, — чѣмъ единственно и можетъ быть объяснено такое быстрое его распространение. Ознакомившись ближайшимъ образомъ со всѣми качествами, достоинствами и недостатками этого „Сборника“ за все время пользованія имъ, въ связи съ другими сборниками того же рода,—и отдавая полное предпочтеніе именно сборнику г. Сорокина, — мы въ настоящее время желали бы подѣлиться нашимъ мнѣніемъ съ другими преподавателями, особенно интересующимися дѣломъ преподаванія геометріи въ гимназіяхъ и реальныхъ училищахъ. Вдаваться въ подробный сравнительный разборъ всѣхъ вышедшихъ „Сборниковъ“ этого рода мы не имѣемъ никакой возможности, ибо это значительно вывело бы насъ изъ намѣченныхъ рамокъ;—но, съ другой стороны, — слышать также мнѣніе и другихъ преподавателей, близко ознакомившихся съ составомъ прочихъ пособій—было бы очень желательно. Мы задались скромной цѣлью разсмотрѣть именно сборникъ г. Сорокина, такъ какъ, съ одной стороны, онъ, какъ намъ кажется, пользуется большей сравнительно популярностью, а съ другой,—сколько намъ извѣстно, это сочиненіе не подверглось еще ни разу подробному разбору, кромѣ краткой, но весмѣ дѣловитой замѣтки почтенного педагога и преподавателя 1-й Казанской гимназіи — г. Жбиковскаго; — но его замѣтка, какъ имѣвшая въ виду только 1-й выпускъ этого сочиненія, въ настоящее время уже мало можетъ имѣть значенія для настоящаго IV изданія этой книги, сильно разниющейся во всемъ ея составѣ съ I ея изданіемъ.

Не обусловливая выбора учебника или пособія исключительно этикетомъ—„одобрѣніи“,—хотя, впрочемъ, это составляетъ необходимое условіе, чтобы имѣть право ввести данное руководство какъ обязательное,—мы хотимъ высказать наше мнѣніе о сборнике г. Сорокина, — мнѣніе, добѣтое на основаніи пропрѣренного долгаго личнаго опыта, въ связи съ многолѣтней педагогической практикой вообще, въ продолженіе непрерывныхъ двадцати почти лѣтъ.

Мы смѣло, въ виду вышесказанного, можемъ утверждать, что въ рукахъ опытнаго преподавателя-руководителя „Сборникъ геометрическихъ задачъ г. Сорокина“ можетъ явиться могучимъ орудіемъ для цѣлей обученія и развитія учащейся

молодежи. Свѣжесть мысли, оригинальность, своеобразная новизна и серьезный учебный интерес—все это въ общей совокупности нашло для себя мѣсто въ этой книгѣ. Здѣсь, именно, мы наблюдаемъ полную соразмѣрность всего того, что дѣлаетъ данную задачу для ученика весьма интересной. Здѣсь нѣть почти ни одной задачи, представляющей для ученика головоломныя трудности; нѣть бесполезного нагромаждиванія различныхъ данныхъ, выраженныхъ въ запутанныхъ числахъ; нѣть однообразныхъ скучныхъ повтореній и растянутости одной и той же мысли на разные лады, чѣмъ главнымъ образомъ и страдаютъ различные сборники задач; нѣть непреодолимыхъ трудностей въ построеніи;—но за то есть въ каждой почти задачѣ тѣтъ самобытный, внутренний ея интересъ, который ее выдѣляетъ изъ ряда остальныхъ, есть именно то, что дѣлаетъ задачу интересной, остроумной;—соединеніе такихъ достоинствъ нужно признать однимъ изъ самыхъ важныхъ для подобныхъ учебныхъ пособій, такъ какъ ученикъ, пользующійся имъ, быстро входитъ въ интересъ дѣла, отдается ему съ охотой, съ любовью,—а пріохотить ученика къ дѣлу, сдѣлать ему его работу пріятной,—это высшій, кульминаціонный пунктъ всѣхъ желаній и стремленій қаждаго учителя-педагога. Истина эта такъ проста и естественна, что врядъ ли нужно доказывать ея справедливость. Согласны вполнѣ,—что *работа, серьезная, умственная работа*,—не игрушка и потому вовсе не нуждается въ искусственномъ ея украшении, чтобы казаться для ученика интереснѣе, но, однако, и умственная работа, какъ самая серьезная изъ всѣхъ другихъ, можетъ оказаться для учащагося тяжелой, скучной, монотонной, хотя, — очень можетъ быть,—и полезной для ученика, но за то,—прежде чѣмъ обнаружится эта польза,—ученикъ уже пе-реутомился на столько, что ему уже не подъ силу болѣе продолжать работать въ томъ же направленіи и, слѣдовательно,—полезность цѣли подобной работы останется лишь благой мечтой.

Подобной тяжелой работой для қаждаго ученика чаще всего является необходимость что либо заучивать на память, какъ напримѣръ въ математикѣ—и особенно въ геометрии и въ тригонометрии—заучивание наизусть массы разнообразныхъ окончательныхъ формулъ; но если такое заучивание исполняется ученикомъ не механически, а болѣе сознательнымъ, разумнымъ образомъ, — какъ напримѣръ рѣшеніемъ различныхъ задачъ и упражненій,—такое усвоеніе тѣхъ же формулъ во 1-хъ никогда такъ не утомить ученика, ибо оно пріобрѣтается постепенно, путемъ разумного размыщенія;—и во 2-хъ,—такое усвоеніе знаній остается въ памяти ученика закрѣпленнымъ несравненно уже на болѣе долгое время. Сборникъ геометрическихъ задачъ г. Сорокина именно обладаетъ такими несомнѣнными внутренними своими достоинствами, весьма характерными и выдѣляющими его изъ ряда другихъ пособій этого же рода, — именно: большинство его задачъ и примѣровъ подобраны г. составителемъ въ такой интересной комбинаціи различныхъ данныхъ, что ученикъ, рѣшившій 2—3 примѣра изъ этого „Сборника“, тотчасъ же начинаетъ входить все въ большій и большій интересъ; онъ рѣшаетъ еще цѣлый десятокъ задачъ и примѣровъ, пріобрѣтаетъ уже нѣкоторый навыкъ къ дальнѣйшему рѣшенію, и тѣмъ съ большей охотой отдается этому дѣлу, чѣмъ болѣе встрѣчаетъ материалъ, для разработки которого нужно воспользоваться новыми свѣдѣніями. Очевидно,—простое, голословное рѣшеніе задачъ не могло бы заинтересовать ученика, если бы при этой работе онъ не видѣлъ, что чѣмъ глубже онъ входитъ въ интересы этого дѣла, тѣмъ и самое дѣло становится разнообразнѣе, серьезнѣе поучительнѣе.—Лучшимъ поощреніемъ въ своемъ труду онъ видѣтъ то, что работа начинаетъ спориться въ его рукахъ, явился навыкъ за нее браться и довести до конца. Весьма простая, почти незамѣтно проскользнувшая, теоретическая свѣдѣнія изъ

геометрии, также легко усвоемыя, какъ и забываемыя, вдругъ проходять предъ ученикомъ, при решеніи имъ задачъ по этому „Сборнику“, во всемъ ихъ важномъ примѣненіи и значеніи для дѣла. Таковы, напримѣръ, свѣдѣнія: „о свойствѣ 4-хъ замѣчательныхъ точекъ треугольника; о свойствѣ сторонъ и угловъ четыреугольниковъ вписанныхъ и описанныхъ; нѣкоторыя свойства сторонъ трапеціи, когда она является вписанной или описанной; обѣ относительномъ положеніи окружностей; о свойствѣ медіанъ различныхъ фигуръ; разные виды площадей фигуръ, ихъ равновеликость и взаимныя отношенія“. — Равнымъ образомъ и въ отдѣлѣ „Стереометріи“: — „свойство различныхъ съченій тѣль плоскостями; важнѣйшія свойства призмъ и пирамидъ, различные виды угловъ въ пространствѣ, линейные, плоскіе, двугранные и тѣлесные; — ихъ взаимная зависимость“. — Огромный, — сравнительно, отдѣлъ на тѣла вращенія, при чёмъ разобранна масса различныхъ случаевъ при всевозможныхъ положеніяхъ фигуры относительно ея оси вращенія, весьма значительное число задачъ на разные виды пропорциональности во всѣхъ геометрическихъ протяженіяхъ нашли себѣ самое видное мѣсто въ этомъ „Сборнику“. Словомъ, — нѣтъ ни одного сколько нибудь интереснаго геометрическаго ученія, которое не осталось бы не затронутымъ и не выставленнымъ въ типичныхъ задачахъ и примѣрахъ сборника г. Сорокина.

Нѣкоторые изъ отдѣловъ геометріи даже въ учебникахъ признаются частностями, возможными для произвольного сокращенія, хотя въ дѣйствительности эти „частности“ имѣютъ для развитія учениковъ очень важное значеніе, но почему то и учебники и многие сборники задачъ отводятъ имъ мало мѣста, затрагивая только вскользь эти вопросы. Къ нимъ принадлежатъ: „4 замѣчательные точки треугольника; нѣкоторыя важныя свойства вписанныхъ и описанныхъ четыреугольниковъ“. Въ Сборнику же г. Сорокина отведено этимъ отдѣламъ очень почтенное мѣсто, и ученикъ, решая эти задачи, невольно заинтересовывается и этими частностями, усматривая въ нихъ также важное значеніе для дѣла. — Весь составъ „Сборника“ такъ удачно скомпанованъ, что, пользуясь имъ, является полная возможность пополнить отрывочныя свѣдѣнія учениковъ даже и по тѣмъ отдѣламъ и вопросамъ, которые слабо затронуты въ учебникахъ и, безъ сомнѣнія, что эти вопросы, послѣ ряда упражнений по сборнику г. Сорокина, будутъ легко усвоены учениками и это непремѣнно расширитъ ихъ кругозоръ и будетъ имѣть для нихъ большое развивающее значеніе.

Преобладающимъ характеромъ въ составѣ задачъ Сборника является характеръ геометрическій, какъ и должно быть по существу самого дѣла, но при этомъ тригонометрическій методъ ихъ решенія входитъ въ столь разнообразныхъ формахъ, что ученикъ, продѣлавъ самостоятельно хотя бы 3—4 десятка задачъ по этому „Сборнику“, можетъ почти съ уверенностью сказать, что онъ, вмѣстѣ съ курсомъ геометріи, основательно повторилъ и курсъ тригонометріи и, несомнѣнно, такое повтореніе даетъ ученику лучшую возможность освоиться съ курсомъ и пополнить свѣдѣнія, въ которыхъ или имѣлись пробѣлы, или они были усвоены ученикомъ поверхностно.

Мы сказали выше, что задачи „Сборника“ распределены на отдѣлы, но все же намъ кажется, что полезно было бы въ послѣдующихъ изданіяхъ выдѣлить въ особые отдѣлы 1) задачи на пропорциональность вообще и 2) задачи обѣ окружностяхъ и площадяхъ, ограниченныхъ этими кривыми. Кромѣ того, въ заключеніе уже, слѣдовало бы прибавить такія задачи, въ которыхъ введены разнообразныя зависимости между входящими данными, требующими уже общаго знакомства съ курсомъ. — Этотъ послѣдній отдѣлъ, — „повторительный“ — могъ бы выйти весьма ин-

тереснымъ для дѣла, и можно надѣяться, что талантливый составитель, — г. Сорокинъ, могъ бы выполнить эту работу съ большимъ искусствомъ, и тѣмъ болѣе, что здѣсь ему представлялось бы уже широкое поле для всевозможныхъ характерныхъ комбинацій данныхъ, затрагивая какія угодно геометрическія ученія, безразлично,— на плоскости или въ пространствѣ. Къ сожалѣнію такой важный отдѣлъ задачъ не вошелъ даже въ IV изданіе сборника, отличающагося отъ всѣхъ прочихъ весьма значительными достоинствами.—Замѣтительно при этомъ, что г. Сорокинъ выпустилъ свое IV изданіе съ добавленіемъ 55 номеровъ новыхъ задачъ противъ III-го изданія, но вся эта масса задачъ относится исключительно на вычисленіе объемовъ и поверхностей тѣлъ вращенія, т. е. именно на тотъ отдѣлъ, который и въ предыдущихъ 3-хъ изданіяхъ занималъ довольно видное мѣсто, въ настоящемъ же IV изданіи этому отдѣлу г. составителемъ посвящено 85 очень серьезно составленныхъ задачъ, тогда какъ на всѣ прочіе отдѣлы протяженій въ пространствѣ выдѣлено лишь 78 задачъ. Полагаемъ, что на эту очевидную несоразмѣрность г. Сорокинъ въ слѣдующихъ изданіяхъ своего „Сборника“ также обратить вниманіе и уравновѣсить интересы всѣхъ ученій о пространствѣ; тогда достоинства этого сочиненія выйдутъ еще болѣе значительными и важными для дѣла учебной практики.

Какъ бы тамъ ни было, но все же самъ по себѣ отдѣлъ задачъ на „тѣла вращенія“ составленъ г. Сорокинымъ весьма обстоятельно. Кромѣ большого числа (85) задачъ, отнесенныхъ на этотъ отдѣлъ, авторъ въ заключеніе приложилъ еще большую теоретическую статью, озаглавивъ ее: „о тѣлахъ вращенія“, въ которой обстоятельно разбирается всѣ основныя положенія этого вопроса, исчерпывая его во всѣхъ интересныхъ его подробностяхъ, съ той точностью и послѣдовательностью, которая присущи всему этому „Сборнику“, выдвигая его далеко изъ ряда всѣхъ прочихъ пособій того же рода, дѣляя его при этомъ самымъ необходимымъ и полезнымъ въ учебной практикѣ.

Для большаго удобства чтенія и пониманія своей статьи „О тѣлахъ вращенія“, г. авторъ обставилъ ее 16-ю прекрасно гравированными чертежами въ самомъ текстѣ, выдѣливъ эту статью совершенно въ отдѣльное ученіе, съ цѣлью выпустить ее отдѣльнымъ оттискомъ, что именно и было имъ исполнено, дабы избавить лицъ, имѣвшихъ уже 3-е изданіе этого „Сборника“, куда эта статья не входила, отъ необходимости пріобрѣтать вновь все IV-е изданіе. Статья эта „О тѣлахъ вращенія“ въ отдѣльномъ оттискѣ стоить только 15 копѣекъ, между тѣмъ какъ все IV изданіе „Сборника“, не смотря на свои значительные добавленія въ числѣ задачъ, улучшенія въ системѣ и, наконецъ, въ добавленіи этой большой статьи,—все же оставлено было г. авторомъ при той же оцѣнкѣ, какъ и III-е изданіе, именно 50 коп. съ пересылкой;—это обстоятельство также весьма характеристично. Весь объемъ этого „Сборника“ въ IV его изданіи увеличенъ на 2 листа компактной весьма печати противъ объема III-го изданія той же книги, и все же цѣна ея осталась не повышенной ни на 1 копѣйку.—Не ясно ли въ такомъ случаѣ, что выпуская это новое изданіе, авторомъ преувеличивалась исключительно только одна симпатичная и весьма похвалная цѣль—быть полезнымъ для дѣла,—а отнюдь не матеріальная сторона,—цѣль наживы; здѣсь для этого нѣтъ и тѣни. Вотъ почему эта книга на долго останется лучшимъ и полезнымъ ученымъ другому какъ въ рукахъ педагога-практика, такъ и для массы любознательной молодежи. Отдаваясь ея руководству, ученикъ, одновременно, входитъ во внутренній интересъ дѣла, начинаетъ любить это дѣло и, такимъ образомъ, незамѣтно для самого себя, постепенно совершенствуется и развивается. Пользу эту трудно оцѣнить словами, ее нельзя также подмѣтить изъ одного только поверхно-

стнаго разсмотрѣнія этой книги, — но она становится весьма очевидной при самой педагогической практикѣ, непрерывной, многолѣтней.

Взвѣшивая все сказанное объ этомъ весьма полезномъ „Сборникѣ“ г. Сорокина, мы желаемъ этому почтенному труду полнаго процвѣтанія въ настоящемъ, совершенствованія и расширенія въ будущемъ для той пользы, которую онъ можетъ принести нашей учащейся молодежи въ гимназіяхъ и реальныхъ училищахъ, при повтореніи курсовъ геометріи и тригонометріи.

Преподаватель Симбирской гимназіи

П. Полетика (Симбирскъ).

ЗАДАЧИ.

№ 278. Крестьяне нѣкоторыхъ мѣстностей пользуются слѣдующимъ способомъ умноженія цѣлыхъ чиселъ: пишутъ рядомъ оба сомножителя и одинъ изъ нихъ дѣлятъ, а другой умножаютъ на два и подписываютъ какъ частное, такъ и произведеніе подъ соответствующими множителями. Затѣмъ полученное частное снова дѣлятъ, а произведеніе умножаютъ на два, подписывая новое частное и произведеніе подъ прежними, и продолжаютъ это до тѣхъ поръ, пока въ частномъ не получится единица. Всѣ числа въ столбцѣ произведеній, стоящія противъ нечетныхъ чиселъ въ столбцѣ частныхъ, отмѣчаются чертой и затѣмъ складываются. Сумма и будетъ искомымъ произведеніемъ. Такъ, напр., при умноженіи 35 на 42, дѣйствие распологается слѣдующимъ образомъ:

35	42 —
17	84 —
8	168
4	336
2	672
1	1344 —

$$42 + 84 + 1344 = 1470 = 35 \times 42.$$

Требуется объяснить этотъ способъ умноженія.

Я. Полушкинъ (с. Знаменка).

№ 279. Найти трехзначное число по слѣдующимъ условіямъ: разность между искомымъ числомъ и его обращеннымъ, есть двузначное число, а разность квадратовъ искомаго числа и его обращенного есть произведеніе нѣкотораго двузначнаго числа на 949.

Е. Заусцинский (Пинскъ).

№ 280. Две окружности пересѣкаются въ точкахъ *A* и *B*. Къ нимъ проведена общая касательная. Черезъ точки прикосновенія *C* и

D проведена окружность, которая также проходитъ черезъ точку *B*. Показать, что діаметръ этой окружности есть средня пропорціональна между діаметрами данныхъ окружностей.

П. Свѣшиниковъ (Троицкъ).

№ 281. Даны четыре точки *A*, *B*, *C* и *D* на одной прямой при извѣстныхъ разстояніяхъ $AB = m$ и $CD = n$; провести черезъ нихъ двѣ параллельныхъ линій такъ, чтобы въ пересѣченіи получился квадратъ. Указать, возможно ли при томъ же условіи построеніе ромба съ даннымъ угломъ.

(Заемств.) В. Евгновъ (Бѣлгородъ).

№ 282. Сумма кубовъ, пятыхъ и седьмыхъ степеней n первыхъ чиселъ натурального ряда равна 740301728400. Сколько чиселъ было взято?

(Заемств.) В. Г. (Одесса).

№ 283. На плоскости дана точка *A* и на нѣкоторомъ разстояніи отъ нея проведена прямая, перпендикулярная къ плоскости. По прямой движется свѣтящаяся точка *S*. Определить уголъ, составленный лучомъ *SA* съ плоскостью, при которомъ сила свѣта въ точкѣ *A* есть наибольшая. (Задача Ламберта).

Ученики Кіево-Печерской гімназіи Л. и Р.

РѢШЕНІЯ ЗАДАЧЪ.

№ 197 (3 сер.). Въ данный треугольникъ *ABC* вписанъ треугольникъ *MNP* такъ, что $PN \parallel BC$, а MN и MP соответственно перпендикулярны къ AC и AB . По даннымъ сторонамъ треугольника *ABC* вычислить стороны треугольника *MNP*.

Чтобы вписать треугольникъ *MNP* въ треугольникъ *ABC*, проводимъ изъ *A* діаметръ описанной окружности, пересѣкающій BC въ точкѣ *M*, а окружность—въ точкѣ *K*. Опустивъ изъ *M* перпендикуляры MP на AB и MN на AC , получимъ требуемый $\triangle MNP$.

Пусть $AB = c$, $AC = b$, $BC = a$ и $\Delta =$ площасти ABC . Легко найдемъ:

$$BK = \sqrt{4R^2 - c^2} = \frac{c}{2\Delta} \sqrt{a^2b^2 - 4\Delta^2} = \frac{c(a^2 + b^2 - c^2)}{4\Delta},$$

$$CK = \sqrt{4R^2 - b^2} = \frac{b}{2\Delta} \sqrt{a^2c^2 - 4\Delta^2} = \frac{b(a^2 + c^2 - b^2)}{4\Delta},$$

гдѣ R есть радиусъ описанной окружности. Пусть *O*—центръ этой окружности, а OQ —разстояніе отъ *O* до BC . Тогда

$$OQ = \frac{1}{2} \sqrt{4R^2 - a^2} = \frac{a}{4\Delta} \sqrt{b^2c^2 - 4\Delta^2} = \frac{a(b^2 + c^2 - a^2)}{8\Delta}.$$

Опустимъ изъ вершины A перпендикуляръ AS на BC . Тогда

$$\frac{AM}{MO} = \frac{AS}{OQ} \text{ или } \frac{AM}{AO} = \frac{AS}{AS-OQ},$$

откуда

$$AM = \frac{AO \cdot AS}{AS - OQ} = \frac{4abc \cdot \Delta}{a^2(b^2 + c^2) - (b^2 - c^2)^2}.$$

Зная BK , CK и AM , легко найдемъ

$$MP = \frac{BK \cdot AM}{AK} = \frac{2\Delta c(a^2 + b^2 - c^2)}{a^2(b^2 + c^2) - (b^2 - c^2)^2};$$

$$MN = \frac{CK \cdot AM}{AK} = \frac{2\Delta b(a^2 + c^2 - b^2)}{a^2(b^2 + c^2) - (b^2 - c^2)^2};$$

$$PN = \frac{BC \cdot AM}{AK} = \frac{8a\Delta^2}{a^2(b^2 + c^2) - (b^2 - c^2)^2}.$$

А. Бачинскій (с. Любень); ученики Кіево-Печерской гімназії Л. и Р.; Я. Попушикін (с. Знаменка); Э. Заторскій (Слб.).

№ 198 (3 сер.). Опредѣлить величину a , при которой выражение

$$\frac{x^2 + 2ax + 3}{x^2 + 2x + 2}$$

не можетъ быть больше 2.

Такъ какъ $x^2 + 2x + 2 = (x + 1)^2 + 1$, то неравенство

$$\frac{x^2 + 2ax + 3}{x^2 + 2x + 2} \leqslant 2$$

можно представить въ видѣ

$$x^2 + 2ax + 3 \leqslant 2(x^2 + 2x + 2),$$

или

$$2ax \leqslant x^2 + 4x + 1,$$

откуда при x положительномъ

$$a \leqslant \frac{x^2 + 4x + 1}{2x},$$

а при x отрицательномъ

$$a \geqslant \frac{x^2 + 4x + 1}{2x}.$$

А. Бачинскій (с. Любень); ученики Кіево-Печерской гімназії Л. и Р.; Я. Попушикін (с. Знаменка); Э. Заторскій (Слб.).

№ 205 (3 сер.). Показать, что если l и l' суть внутренній и внѣшній биссекторы угла треугольника, заключенного между сторонами a и b , S —площадь треугольника, а r —радиусъ круга описанного, то

$$l'^2 + l^2 = \frac{64r^2S^2}{(a^2 - b^2)^2}.$$

Пусть въ треугольникѣ ABC внутренній биссекторъ угла C есть CD , а внѣшній— CD' . Извѣстно, что

$$\frac{AD'}{BD'} = \frac{AD}{BD}, \text{ откуда } \frac{AD' + AD}{AD} = \frac{BD' + BD}{BD}. \quad . \quad (1)$$

Но $AD' + AD = DD' + 2AD = \sqrt{l^2 + l'^2} + 2AD$, $BD' + BD = DD'$,

$$AD = \frac{cb}{a+b}, \quad BD = \frac{ac}{a+b}.$$

Подставляя эти значенія въ равенство (1), найдемъ

$$DD' = \sqrt{l^2 + l'^2} = \frac{2abc}{a^2 - b^2} = \frac{8rS}{a^2 - b^2}.$$

A. Шаптиль, Э. Заторскій (Спб.); М. Зиминъ (Орелъ); П. Бѣловъ (с. Знаменка); ученики Кіево-Печерской гімназіи Л. и Р. Д. Цельмеръ (Тамбовъ).

ПОЛУЧЕНЫ РѢШЕНИЯ ЗАДАЧЪ отъ слѣдующихъ лицъ: С. Григорьевъ (Самара) 222, 235, 240, 244, 249, 250 (3 сер.); А. Бюро (Самара) 317 (2 сер.); В. Позднякова (Самара) 56, 66, 219, 222, 257 (3 сер.), 317, 422 (2 сер.); Я. Теплякова (Радомысьль) 262, 263 (3 сер.); учениковъ Кіево-Печерской гімназіи Л. и Р. 180, 191, 224, 227, 228, 230, 232, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 250, 252, 254, 255, 256, 257, 259 (3 сер.); С. Соколова (Тамбовъ) 249, 256 (3 сер.); С. Адамовича (Двинскъ) 211, 217, 222, 235, 238, 239, 240 (3 сер.); Е. Заусинская (Пинскъ) 227, 230, 237, 240, 244 (3 сер.); А. П-тина (Оренбургъ) 243, 244, 245, 249 (3 сер.); В. Евгенова (Бѣлогородъ) 237, 244, 249 (3 сер.); Ю. Идельсона (Одесса) 262 (3 сер.); учениковъ Рижского реальн. училища Императора Петра I Р. З. и И. Л. 227, 237, 239 (3 сер.); Лежебока (Иваново-Вознесенскъ) 237, 239, 240, 244, 263 (3 сер.); Б. Е. (Тамбовъ) 204, 239, 249, 256 (3 сер.); Дм. Цельмера (Тамбовъ) 202, 204, 205, 209, 210, 212, 221, 244, 246, 256 (3 сер.); В. Соколова (Кіевъ) 207, 220, 221, 222, 249, 256 (3 сер.); П. Бѣлова (с. Знаменка) 249 (3 сер.); Г. Летишина (с. Знаменка) 256, 260, 262 (3 сер.), 499 (2 сер.); Я. Полушкина (с. Знаменка) 255 (3 сер.), 220, 483 (2 сер.), 188, 359 (1 сер.); Э. Заторскало (Вильно) 194, 208, 217, 232, 243, 244, 245, 247, 249, 252, 255, 256, 257, 263, 264 (3 сер.).



Редакторъ-Издатель Э. К. Шпачинскій.

Дозволено цензурою. Одесса, 25-го Января 1896 г.

„Центральная типо-литографія“, уг. Авчинникова пер. и Почтовой ул., д. № 29.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1896 ГОДЪ

НА

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ТЕХНИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ

„ЗАПИСКИ“

Императорскаго Русскаго Техническаго Общества

(тридцатый годъ изданія).

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:

Дѣятельность Общества: Журналы засѣданій общихъ собраний и Совѣта Общества. Журналы засѣданій Отдѣловъ: I (Химическаго), II (Механическаго), III (Строительного), IV (Военно-морскаго), V (Фотографическаго), VI (Электротехническаго), VII (Воздухоплавательного), VIII (Желѣзнодорожнаго), IX (По Техническому образованію). Труды Общества: Доклады, читанные въ засѣданіяхъ Общества и работы его членовъ. **Техническая Литература:** статьи по всѣмъ отраслямъ техники. **Техническое Обозрѣніе:** новости по различнымъ техническимъ производствамъ. **Библиографія.** Правительственные распоряженія, имѣющія отношеніе къ техникѣ и технической промышленности. „**Привилегіи**, выдаваемыя по Департаменту Торговли и Мануфактуръ“ — полное описание съ чертежами всѣхъ выдаваемыхъ въ Россіи привилегій на изобрѣтенія, касающіяся технической промышленности (Помѣщается исключительно при „Запискахъ“).

Подписная цѣна Журнала «ЗАПИСКИ»

	съ пересылкой и доставкой	съ пересылкой за границу
на годъ	12 руб.	16 руб.
на полгода	7 „	9 „

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ:

Разовая за 1 стр. 4 р., за $\frac{1}{2}$ страницы 3 р. Годовая со всякаго срока на обложкѣ за 1 стр. 50 р. Впереди текста за $\frac{1}{2}$ стр. 20 р., за одну стр. 35 р., за 2 стр. 50 р. Вкладная за 1000 шт. (до 1 л. вѣса) 10 руб.

Подписка принимается въ редакціи. С.-Петербургъ, Пантелеймонская, 2 и у книгопродавцевъ. Гг. иногородніе благоволять обращаться преимущественно въ редакцію.

„Записки“ Императорскаго Русскаго Техническаго Общества за прежніе года можно приобрѣсть въ Редакціи. Съ 1867 по 1889 г. по 4 р. за годъ и 1 руб. за отдельный выпускъ, за 1890—94 г. 8 р. за годъ и 2 руб. за отдельный выпускъ. При приобрѣтеніи „Записокъ“ за 19 лѣтъ цѣна въ сложности опредѣлена въ 70 руб. съ доставкой и пересылкой, а для школьніхъ, общественныхъ и частныхъ библиотекъ, согласно постановленію Совѣта Императорскаго Русскаго Техническаго Общества — 40 руб. За года 1868, 1884, 1885 и 1888 „Записки“ всѣ разошлись.

Специальный редакторъ А. Сигуновъ.

Отвѣтственный редакторъ Е. С. Федоровъ.

Редакція „Записокъ“ И. Р. Т. О. имѣеть честь сообщить, что число нумеровъ „Записокъ“ въ предстоящемъ году можетъ быть будущъ сокращено, но не въ ущербъ числу статей и количеству печатныхъ листовъ, которое въ общемъ итогѣ будетъ то же самое. 3—2

6-й
ГОДЪ
издания.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1896 ГОДЪ
НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ

6-й
ГОДЪ
издания.

литературный и научно-популярный иллюстрированный журналъ

„ПО МОРЮ И СУШЬ“

издаваемый въ Одессѣ по слѣдующей программѣ:

- 1) Хроника столичной, мѣстной, провинціальной и иностранной жизни; 2) Популярно-научные статьи и замѣтки по всѣмъ отраслямъ знанія; 3) Романы, повѣсти, рассказы путешествія и стихотворенія; 4) Обзоры новостей литературы и искусства; 5) Письма, вѣсти и слухи отовсюду; 6) Статьи и извѣстія по морскому и желѣзодорожному дѣлу, 7) Фельетонъ; 8) Справочный отдѣлъ; 9) Отвѣты редакціи и 10) Объявленія

Въ 1895 году помѣщены между прочимъ:

„О Гоголѣ“ проф. А. И. Маркевича; „Пушкинъ на Югѣ Россіи“ В. Н. Ястребова; „Шевченко — другъ семьи“ А. Каневскаго; „Костомаровъ“ А. С-наго; „О Шафарайкѣ“ Е. В.; „Вольта“; По поводу юбилеевъ проф. А. И. Маркевича и проф. В. А. Антоновича А. С-наго; „О Грибоѣдовѣ“, „О Гравновскомъ“ Н. А. Шрама; „Воспоминанія Пастера“, „О Пастерѣ“ Г. С-ва; „О Котляревскомъ“, „О Гулакѣ-Артемовскомъ“ М. Комарова, „Малоруссія“ стихотвор. Кольцова“ его-же и проч. Очерки Кореи, Абиссиніи, Придунайской Бессарабіи, „О Болградѣ и его окрестностяхъ“ А. П. Углича; „Какъ сдѣлать Россію проѣзжей“; „О предсказаніи погоды“ П. И. Злотина; Пѣвзда

на могилу Т. Г. Шевченко, С. Е. Письма: изъ Бессараії Радова; изъ Аданьевскаго уѣзда Чикаленко; съ береговъ Темзы Бичъ-Богуславскаго, изъ Черногоріи Стиверскаго, изъ Елисаветграда Ас-на, „Съ Далекаго запада“ Л. Богатаго; „О Сельскохозяйственномъ кризисѣ въ Англіи“ Бичъ-Богуславскаго. „Выжил“ повѣсть П. Остаповскаго; „Изъ жизни сельскихъ школьниковъ“ его-же; „Русскій Фра-Дьяволъ“ Николаева; „Дезертиръ“ его-же; „Сирота Захарко“ А. Крымскаго; „Танцовальный вечеръ“ Олени Пчелки; „Золотая писанка“ ея-же; „Въ Одесскомъ Подземельѣ“ П. Вл-но; „Кошка помѣшала“ Д. Романовой; „Изъ исторіи нашихъ степей“ В. Я.

Текстъ иллюстрируется портретами и др. рисунками. — При журналь даны будутъ 4 книжки приложений.

Въ будущемъ 1896 г. читатели журнала „По Морю и Сушѣ“ получать 52 №№ журнала, въ объемѣ неменьшемъ, чѣмъ въ нынѣшнемъ году, и 4 книжки приложений, выпускаемыхъ каждые 3 мѣсяца по одному.

Подписная цѣна на журналъ „По Морю и Сушѣ“ съ приложеніями (съ пересылкой и доставкой)

На годъ 4 руб.; на полгода 2 руб.; на 3 мѣсяца 1 руб.; на 1 мѣсяцъ 35 коп. почтовыми марками.

Для учителей народныхъ училищъ на годъ 3 руб., на полгода 1 руб. 50 коп.

Приложения разсылаются всѣмъ подписчикамъ, исключая подписавшихся на 1 мѣсяцъ. Подписавшіеся на журналъ до Нового года получать БЕЗПЛАТНО всѣ №№, имѣющіе выйти до конца 1895 г.

Отдѣльные №№ продаются по 10 коп.

Подписька принимается въ Одессѣ, въ Редакціи журнала „По Морю и Сушѣ“ (Софіевская, д. № 18, кв. № 25) и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ Россіи, а въ г. Елисаветградѣ — въ отдѣленіи конторы журнала (Дворцовая ул., д. Гольденберга).

Редакторъ Л. Л. Михневичъ.

3—2

Издатель А. И. Погибка.


ОБЗОРЪ НАУЧНЫХЪ ЖУРНАЛОВЪ

Bulletin de la Société Astronomique de France.

10. - 1895.

Visibilité de l'hémisphère obscur de Vénus. C. Flammarion.—Во время последнего соединения Венеры особенное внимание обсерватории Juvisy было обращено на необъясненное до сихъ поръ явление — видимость неосвещенной части Венеры. Это явление было замѣчено еще въ началѣ прошлого столѣтія англійскимъ пасторомъ Derham, въ сочиненіи котораго есть замѣчаніе, что во время, когда Венера и Луна имѣютъ видъ тонкихъ серповъ, видна и неосвещенная часть ихъ, имѣющая темно-ржавый цветъ (dull and rusty colour). Можно ли объяснить это явленіе такъ же, какъ и непельный цветъ луны? По вычисленіямъ Фламмаріона свѣтъ земли для Венеры въ 12000 разъ слабѣе, чѣмъ для луны и въ 888 разъ слабѣе свѣта полной луны (для земли); такого слабаго освѣщенія, по мнѣнію Фламмаріона, недостаточно для полнаго объясненія рассматриваемаго явленія. Такъ какъ темная часть Венеры кажется темнѣе фона неба и имѣетъ фиолетовый оттѣнокъ, то Фламмаріону кажется вѣроятнымъ такое объясненіе: темный дискъ Венеры проектируется на болѣе светлый фонъ неба, освѣщенный зодіакальнымъ свѣтомъ *) и свѣтомъ высшихъ слоевъ солнечной атмосферы; дискъ Венеры не совсѣмъ теменъ, но слабо освѣщенъ солнечными лучами, преломленными ея атмосферой и имѣющими, вѣроятно, какъ и на землѣ, красноватый цветъ; фиолетовый оттѣнокъ можетъ имѣть и другія причины, напр., фосфоресценцію облаковъ, отраженіе земного свѣта, хроматизмъ объектива.

Coelostat. Appareil à miroir donnant une image du ciel immobile par rapport à la Terre. G. Lippmann.—Приборъ Lippmann'a, дающій неподвижное изображеніе неба, состоитъ изъ плоскаго зеркала, вращающагося со скоростью одного оборота въ 48 звѣздныхъ часовъ около оси, параллельной оси міра и параллельной плоскости зеркала. Можно доказать, что изображеніе любой звѣзды въ этомъ зеркальѣ будетъ неподвижнымъ.



Фиг. 72.

Пусть EO (фиг. 72) падающій лучъ, OE' — продолженіе отраженного; такъ какъ плоскость зеркала дѣлить пополамъ уголъ EOE', то она будетъ плоскостью симметрии и слѣд. для любого направления OP $\angle EOP = \angle E'OP$; если OP параллельно оси міра, то $\angle EOP$ — полярное разстояніе свѣтила — величина, отъ времени не зависящая, а потому и $E'OP$ величина постоянная. Пусть AB (фиг. 73) — слѣдъ зеркала и P — проекція OP на плоскость экватора, PE и PE' — слѣды плоскостей EOP и E'OP; когда зеркало повернется на $\angle BVP' = \beta$, то EP вслѣдствіе суточного движения небес-

*) Во время послѣдняго соединенія Венера была видна въ $7\frac{1}{2}^{\circ}$ отъ солнца, а такъ какъ зодіакальный свѣтъ замѣтенъ на нѣсколько десятковъ градусовъ отъ солнца, то онъ долженъ быть очень яркимъ въ $7-8^{\circ}$.

наго свода повернется на угол $\text{EPF} = \alpha$ и РЕ' займет положение PF' ; согласно высказанныму $\angle \text{EPB} = \angle \text{BPE}'$ и $\angle \text{FPB}' = \angle \text{B}'\text{PF}'$ или

$$\angle \text{EPB}' + \beta = \angle \text{BPF}' + \angle \text{F}'\text{PE}'$$

$$\alpha + \angle \text{EPB}' = \beta + \angle \text{BPF}';$$


послѣ вычитанія получаемъ:

$$\beta - \alpha = \text{F}'\text{PE}' - \beta \text{ или } \text{F}'\text{PE}' = 2\beta - \alpha,$$

но такъ какъ $\beta = \frac{1}{2}\alpha$ согласно устройству прибора, то $\text{F}'\text{PE}' = 0$, т. е. плоскость Е'OP осталась на мѣстѣ, если же плоскость Е'OP неподвижна и $\angle \text{E}'\text{OP}$ постоянъ, то слѣд. и направление ОЕ' неизмѣнно; неподвижное изображеніе свѣтила останется неподвижнымъ и въ фокусѣ оптической трубы, направленной на зеркало.

Преимущество coelostat'a предъ сидеростатомъ состоить въ томъ, что по слѣдній даетъ неподвижное изображеніе только одной звѣзды; сравнительно съ экваториаломъ преимущество то, что coelostat, благодаря простотѣ устройства и своей легкости, можетъ быть устроено гораздо точнѣе.

Atmosphère et rivières lunaires. W. Pickering.—Въ статьѣ приводятся нѣкоторые факты, позволяющіе усомниться въ истинности тѣхъ доводовъ, которые выставляются въ пользу ходячаго мнѣнія о лунѣ, какъ планетѣ, лишенной атмосферы и воды. Главные доводы въ пользу этого мнѣнія сводятся къ отсутствію рефракціи при покрытии звѣздъ луной, рѣзкости тѣней и отсутствію на лунѣ полуутѣнѣй и сумерокъ. Еще въ 1864 году наблюденія въ Гринвичѣ показали, что при покрытии звѣздъ луною замѣчается рефракція около $2''$ (если принять вѣрную величину лунаго диаметра). Въ обсерваторіи на Ареипіѣ нѣрѣдко были наблюданы полуутѣнѣя и даже настолько слабыя, что можно было разглядѣть въ нихъ нѣкоторая подробности лунной поверхности. При фотографированіи Юпитера непосредственно до и послѣ момента покрытия, т. е. въ моменты соприкосновенія получался около него ореолъ. Непосредственнымъ наблюденіемъ и при фотографированіи въ такихъ случаяхъ замѣчали на Юпитерѣ темную полосу перпендикулярную его экваторіальнымъ полосамъ и касательную къ краю луны; нельзѧ объяснить послѣднѣя явленія предположениемъ лунной атмосферы, такъ какъ она должна бы быть слишкомъ плотной (плотнѣе земной) для того, чтобы произвести такое сильное поглощеніе лучей; при томъ полоса наблюдается только около свѣтлаго края луны; быть можетъ поглощающее дѣйствіе производятъ водяные пары, поднятые дѣйствіемъ солнечныхъ лучей на нѣкоторую небольшую высоту. Хотя обыкновенные доводы въ пользу отсутствія воды на лунѣ и резонны, но есть факты, говорящіе въ пользу того, что въ небольшомъ хотя бы количествѣ вода на лунѣ, если не теперь, то хоть прежде была. При внимательномъ изслѣдованіи различныхъ трещинъ, бороздокъ, зигзаговъ замѣчается двоякаго рода впадины: однѣ направлены ко дну кратера (напр. на Hyginus) или къ морю и кажутся какъ бы обвалами; другія, своей формой сильно напоминающія наши рѣки, постепенно расширяются и оканчиваются грушевиднымъ устьемъ, расположеннымъ всегда выше болѣе узкаго конца; если ихъ считать ложами существующихъ или высохшихъ рѣкъ, то вода должна была вытекать изъ озера и, спускаясь внизъ и быстро испаряясь, постепенно теряться въ пустыняхъ (что подобное встрѣчается въ Западной части южной Америки); вода въ этихъ озерахъ могла появиться благодаря вулканической дѣятельности. Наиболѣе характерное ложе рѣки начинается съ горы Hadley; изъ 26 рѣкъ—19 текутъ къ сѣверу. Внутри многихъ кратеровъ, а также внутри почти всѣхъ морей, замѣчены темные пятна, измѣняющіяся по виду и размѣрамъ въ теченіи мѣсяца, а иногда и совсѣмъ исчезающія. Наиболѣе изучены они на Alphonsus, Atlas и Hansteen; оказывается, что они кажутся наиболѣе темными дни черезъ два послѣ прохожденія солнца черезъ ихъ меридианъ и перестаютъ быть видимыми при очень косомъ освещеніи, изъ чего приходится заключить, что здѣсь происходитъ какое то измѣненіе въ самихъ свойствахъ отражающихъ поверхностей; Maedler и Neison склонны объяснить эти явленія различными фазами растительности. Точно также при сравненіи оттѣнковъ морей попарно (напр. Mare Feconditatis и Mare Crisium, M. Nectaris и M. Serenitatis и



Фиг. 73.

Обложка
ищется

Обложка
ищется